

شكراً لتحميلك هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية



حل تجميعة أسئلة وفق الهيكل الوزاري

[موقع المناهج](#) ← [المناهج الإماراتية](#) ← [الصف العاشر العام](#) ← [رياضيات](#) ← [الفصل الثاني](#) ← [الملف](#)

تاريخ نشر الملف على موقع المناهج: 09:34:48 2024-02-23

التواصل الاجتماعي بحسب الصف العاشر العام



روابط مواد الصف العاشر العام على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف العاشر العام والمادة رياضيات في الفصل الثاني

[تجميعة أسئلة وفق الهيكل الوزاري ريفيل](#)

1

[نموذج الهيكل الوزاري ريفيل المسار العام](#)

2

[نموذج الهيكل الوزاري بريدج المسار العام](#)

3

[كتاب الطالب كامل \(على شكل أجزاء\)](#)

4

[كتاب الطالب ريفيل](#)

5

نواتج التعلم

1- تحديد أجزاء الدوائر واستخدامها.

2- حل المسائل التي تشتمل على محيط دائرة.

الدائرة هي المحل الهندسي لمجموعة من جميع نقاط المستوى متساوية البعد عن نقطة ثابتة تدعى **مركز** الدائرة.

القطع الخاصة في دائرة


إن **نصف القطر** (جمعها أنصاف الأقطار) قطعة مستقيمة تقع إحدى نقطاتها الطرفين في المركز والأخرى على الدائرة.
الوتر قطعة مستقيمة تقع نقطاتها الطرفين على الدائرة.

القطر في دائرة هو وتر يمر من المركز ويتكون من نصفي قطرين يقعان على استقامة واحدة.

قانون القطر $d = 2r$ قانون نصف القطر $r = \frac{d}{2}$ أو $r = \frac{1}{2}d$

أزواج الدوائر


الدوائر متحدة المركز هي دوائر متحدة المستوى لها المركز نفسه.



كل الدوائر متشابهة.




تتطابق دائرتان حصراً إذا كانتا نصفيان نصفين قطريين متطابقين.



يمكن لدائرتين أن تتقاطعا بطريقتين مختلفتين اثنتين.

٧ نقاط تقاطع



نقطة تقاطع واحدة



نقطتا تقاطع




إن **محيط** الدائرة هو المسافة حول الدائرة. وبالتعريف، فإن النسبة $\frac{C}{d}$ هي عدد غير نسبي يدعى **باي** (π). ويمكن اشتقاق قانونين لحساب المحيط عبر استخدام التعريف.

$$C = \pi d$$

$$C = 2\pi r$$

يكون المضلع **محاطاً** بدائرة إذا كانت جميع رؤوسه تقع على الدائرة.
وتعدّ الدائرة **محيطاً** للمضلع إذا كانت تضمّ رؤوس المضلع جميعها.

عد إلى الدائرة $\odot R$.



سم مركز الدائرة. R

حدّد وترًا لا يعدّ قطرًا في الدائرة. \overline{SU}


هل \overline{UV} نصف قطر؟ اشرح. لا. لأنه عند نقطة ليقع في مركزها على المركز.

إذا كان طول $SU = 16.2$ cm. فما طول RT ؟ 8.1 لأن RT نصف قطر.

5) أكسب جميع أضلاع الأضلاع المرسومة في الشكل. $\overline{RT}, \overline{RS}, \overline{RU}$

عد إلى الدائرة $\odot F$.

حدّد وترًا لا يعدّ قطرًا في الدائرة. $\overline{DE}, \overline{AE}$




إذا كان $CF = 14$ cm. فما هو قطر الدائرة؟ 28 cm

هل $\overline{AF} \cong \overline{EF}$ ؟ اشرح. نعم، لأنهما أضلاع أضلاع.

إذا كان طول $DA = 7.4$ cm. فما هو طول EF ؟ 3.7

البيتزا جـد نصف القطر والمحيط لقطعة البيتزا الموضحة. وقرب إلى أقرب جزء من مئة عند الضرورة.



$$r = 26 \div 2 = 13 \text{ cm}$$

طريقة 1

$$\begin{aligned} C &= \pi d \\ &= \pi (26) \\ &= 26\pi \\ &= 81.68 \text{ cm} \end{aligned}$$

طريقة 2

$$\begin{aligned} C &= 2\pi r \\ &= 2\pi (13) \\ &= 26\pi \\ &= 81.68 \text{ cm} \end{aligned}$$

الدراجات قطرًا عجلة إحدى الدراجات بساويان 26 cm. جـد نصف قطر العجلة ومحيطها. وقرب إلى أقرب جزء من المئة عند الضرورة.

$$r = 26 \div 2 = 13 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} C &= \pi d \\ &= \pi (26) = 81.68 \text{ cm} \end{aligned}$$

جد قطر الدائرة ذات المحيط المعطى ونصف قطرها. وقرب إلى أقرب مئة.

$$C = 18 \text{ cm}$$

$$C = \pi d$$

$$18 = \pi d$$

$$\Rightarrow d = \frac{18}{\pi} = 5.73 \text{ cm}$$

$$r = \frac{5.73}{2}$$

$$= 2.86 \text{ cm}$$

$$C = 375.3 \text{ cm}$$

$$C = \pi d$$

$$375.3 = \pi d$$

$$\Rightarrow d = \frac{375.3}{\pi} = 119.46 \text{ cm}$$

$$r = \frac{119.46}{2}$$

$$= 59.73 \text{ cm}$$

أوجد قطر الدائرة ذات المحيط المعطى ونصف قطرها. وقرب إلى أقرب مئة.


24. $C = 18$ cm
5.73 cm, 2.86 cm

25. $C = 124$ m
39.47 m, 19.74 m

26. $C = 375.3$ cm
119.46 cm, 59.73 cm

27. $C = 2608.25$ m
830.23 m, 415.12 m

الاستنتاج المنطقي جد المحيط الدقيق لكل دائرة باستخدام المضلع المحيط لها أو المحاط بها.



$$d = \sqrt{5^2 + 9^2} = \sqrt{106}$$


نظرية فيثاغورس

$$C = \pi d$$

$$= \pi (\sqrt{106})$$

$$= \boxed{32.34}$$

cm



$$d = \sqrt{8^2 + 15^2} = 17$$


نظرية فيثاغورس

$$C = \pi d$$

$$= \pi (17)$$

$$= \boxed{53.41}$$

cm



$$d = \sqrt{(6\sqrt{2})^2 + (6\sqrt{2})^2}$$


$$= 12$$

نظرية فيثاغورس

$$C = \pi d$$

$$= \pi (12)$$

$$= \boxed{37.70} \text{ m}$$



$$d = 25$$





$$C = \pi d$$

$$= \pi (25)$$

$$= \boxed{78.54}$$

mm

الاستنتاج المنطقي أوجد المحيط الدقيق لكل دائرة باستخدام المضلع المحيط لها أو المحاط بها.



نواتج التعلم

- 1- تحديد الزوايا المركزية والأقواس الكبرى والأقواس الصغرى والمسافات المتزاوية وإيجاد قياساتها.
2- إيجاد أطوال الأقواس.

* إن **الزاوية المركزية** في دائرة هي زاوية يقع رأسها عند مركز الدائرة. وهي تضم نصفي قطر في الدائرة.

* **القوس** هو جزء من دائرة يحدّه بنقطتي طرفيه. وعند رسم زاوية مركزية. تنقسم الدائرة إلى قوسين. يرتبط قياس كلٍ منهما بقياس الزاوية المركزية المقابلة له.

* مجموع قياس الزوايا المركزية في دائرة دون وجود نقاط داخلية مشاركة يساوي 360° .

مفاهيم أساسية	
الأقواس وقياسها	
قياسه	القوس
 <p>يقال لقياس القوس الأصغر عن 180° ويساوي قياس الزاوية المركزية المتقابلة له.</p> $m\widehat{AB} = m\angle ACB = x^\circ$	<p>القوس الأصغر هو القوس الأقصر الذي يصل بين النقطتين على الدائرة.</p>
 <p>يزيد قياس القوس الأكبر عن 180° ويساوي 360° مطروحاً منه قياس القوس الأصغر الذي يصل بين النقطتين نفسيهما.</p> $m\widehat{AB} = 360^\circ - m\angle ACB = 360^\circ - x^\circ$	<p>القوس الأكبر هو القوس الأطول الذي يصل بين النقطتين على الدائرة.</p>
 <p>قياس نصف الدائرة يساوي 180°</p> $m\widehat{AB} = 180^\circ$	<p>نصف الدائرة هي قوس تقع بنقطتي طرفيه على قطر الدائرة.</p>

* **الأقواس المتطابقة** هي الأقواس التي تقع في الدائرة نفسها، أو في دائرتين متطابقتين. ويكون لها القياس نفسه.

* في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون القوسان متطابقين إذا ولقط إذا كانت زاويتاهما المركزيتان متطابقتين.


* **الأقواس المتجاورة** هي أقواس في الدائرة تشترك مع بعضهما في نقطة واحدة فقط.

* **طول القوس** هو المسافة على الدائرة بين نقطتي طرفيه. ويقاس بوحدات الطول. وبما أن القوس جزء من الدائرة، فإن طوله جزء من محيطها.


* إن قياس قوس مشكّل من قوسين متجاورين هو مجموع قياس القوسين.

نسبة **طول قوس l** إلى **محيط** دائرة يساوي نسبة **قياس القوس بالدرجات** إلى **360**

$$l = \frac{s}{360} \cdot 2\pi r \quad \text{أو} \quad \frac{l}{2\pi r} = \frac{s}{360}$$



\overline{RT} قطر في $\odot P$ ، أوجد طول كل قوس متبأني مقربًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.



\overline{RS} ، إذا كان نصف القطر يساوي 2 in

$$\frac{360^\circ}{2\pi r} = \frac{130^\circ}{x} \Rightarrow x = \frac{2\pi(2) \times 130}{360} = \boxed{4.54} \text{ in}$$

\overline{QT} ، إذا كان القطر يساوي 9 cm

$$\frac{360}{2\pi r} = \frac{112^\circ}{x} \Rightarrow x = \frac{2\pi(4.5) \times 112}{360} = \boxed{8.80} \text{ cm}$$

\overline{QRS} ، إذا كان $RT = 11$ ft

$m\angle QPR = 180 - 112 = 68^\circ \Rightarrow m\angle QPS = 130 + 68 = 198^\circ$

$$\frac{360}{2\pi r} = \frac{198}{x} \Rightarrow x = \frac{2\pi(5.5)(198)}{360} = \boxed{19.01} \text{ ft}$$


$m\angle RPS = 360 - 130 = 230^\circ$

$$\frac{360}{2\pi r} = \frac{230}{x} \Rightarrow x = \frac{2\pi(3)(230)}{360} = \boxed{12.04} \text{ m}$$

\overline{RTS} ، إذا كان $PQ = 3$ m

مثال 5

استخدم الدائرة $\odot P$ لإيجاد طول كل قوس. قرب إلى أقرب جزء من مئة.



- 36. \overline{RS} ، إذا كان طول نصف القطر 2 cm **4.54 cm**
- 37. \overline{QT} ، إذا كان طول قطر الدائرة 9 cm **8.80 cm**
- 38. \overline{QR} ، إذا كان $PS = 4$ mm **4.75 mm**
- 39. \overline{RS} ، إذا كان $RT = 15$ cm **17.02 cm**
- 40. \overline{QRS} ، إذا كان $RT = 11$ m **19.01 m**
- 41. \overline{RTS} ، إذا كان $PQ = 3$ m **12.04 m**


نواتج التعلم

1- التعرف على العلاقات بين الأقواس والأوتار واستخدامها. 2- التعرف على العلاقات بين الأقواس والأوتار والأقطار واستخدامها.

نظرية

أضف إلى

مطويتك




التعبير اللفظي، في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون القوسان الأصغران متطابقين، إذا وفقط إذا كان الوتران المناظران لهما متطابقين.

مثال، $\overline{FG} \cong \overline{HJ}$ ، إذا وفقط إذا كان $\widehat{FG} \cong \widehat{HJ}$.

نظريات


أضف إلى

مطويتك



إذا كان قطر (أو نصف قطر) الدائرة عمودياً على وتر فيها، فإنه يُنصف ذلك الوتر، ويُنصف قوسه.

مثال، إذا كان القطر \overline{AB} عمودياً على \overline{XY} في النقطة Z ، فإن: $\overline{XZ} \cong \overline{YZ}$, $\widehat{XB} \cong \widehat{BY}$.




العمود المنصف لوتر في الدائرة هو قطر (أو نصف قطر) لها.

مثال، إذا كان \overline{AB} عموداً منصفاً للوتر \overline{XY} ، فإن \overline{AB} قطر في $\odot C$.

نظرية

أضف إلى

مطويتك



التعبير اللفظي، في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون الوتران متطابقين إذا وفقط إذا كان بُعداهما عن مركز الدائرة متساويين.

مثال، $\overline{FG} \cong \overline{HJ}$ ، إذا وفقط إذا كان $LX = LY$.

توابع التعلم


1- إيجاد قياسات الزوايا المحيطية.

2- إيجاد قياسات المضلعات المحاطة بدائرة.

الزاوية المحيطية هي زاوية يقع رأسها على الدائرة، ويحتوي ضلعها على وترين في الدائرة.

القوس المقابل للزاوية المحيطية هو قوس يقع داخل الزاوية المحيطية، ويقع طرفاه على ضلعيها.

$\angle DEF$ هي زاوية محيطية.



\widehat{DF} هو القوس الذي تحدده الزاوية المحيطية $\angle DEF$.


الوتر \overline{DF} هو الوتر الذي تحدده الزاوية المحيطية.

توجد ثلاث حالات للزاوية المحيطية في الدائرة:

الحالة الأولى	الحالة الثانية	الحالة الثالثة
يقع مركز الدائرة P خارج الزاوية المحيطية.	يقع مركز الدائرة P داخل الزاوية المحيطية.	يقع مركز الدائرة P على أحد ضلعي الزاوية المحيطية.

مبرهنة

مبرهنة الزاوية المحيطية



قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس الذي تحدده على الدائرة.

$$m\angle BAC = \frac{1}{2} m\widehat{BC}$$

مبرهنة

الزوايا المحيطية المتشابهة في قوس تكون متشابهة.

$\angle AEB$ و $\angle ACB$ و $\angle ADB$ متشابهة في \widehat{AB} .



مبرهنة

تكون زاوية محيطية زاوية قائمة إذا و فقط إذا كان قوس الذي تحدده نصف الدائرة.



مبرهنة

إذا كان رباعي مُحاطًا بدائرة فإن مجموع قياسي كل زاويتين متقابلتين من زواياه هو 180° .

$$m\angle A + m\angle C = 180^\circ$$

$$m\angle B + m\angle D = 180^\circ$$




التمرين

شرح


تصور زاوية محيطية في مثلث مثل $\triangle ABC$ أو نصف دائرة إذا و فقط إذا كانت الزاوية زاوية قائمة.

مثال


إذا كانت $\widehat{FAH} = 90^\circ$ نصف دائرة، فإن $m\angle G = 90^\circ$ وإذا كانت $m\angle G = 90^\circ$ ، فإن \widehat{FAH} نصف دائرة و \widehat{FH} قطب في الدائرة.




14. $m\widehat{AC}$ 48



15. $m\widehat{GH}$ 140




16. $m\angle S$ 66




17. $m\angle R$ 32

18. $m\angle S$ 34



19. $m\angle A$ 20

20. $m\angle C$ 47



جرباً أوجد كل من القياسات.

مثال 2

مفردات إذا كانت A و B و C ثلاث نقاط على دائرة، فإن $\angle ABC$ زاوية محيطة (مركزية أو محيطية).

أوجد كل قياس مما يأتي:

$m\widehat{DH}$

القوس = ضعف الزاوية المحيطة
المحيطة = نصف القوس

$$m\widehat{HD} = 81 \times 2 = 162^\circ$$

$m\angle K$

الزاوية المحيطة = نصف القوس

$$m\angle K = 92 \times \frac{1}{2} = 46^\circ$$

$m\angle P$

$$m\widehat{NQ} = 360 - 100 - 120 = 140^\circ$$

$$m\angle P = 140 \times \frac{1}{2} = 70^\circ$$

$m\widehat{AC}$

$$m\widehat{AC} = 24 \times 2 = 48^\circ$$

$m\widehat{GH}$

$$m\widehat{HT} = 20 \times 2 = 40^\circ$$

$$m\widehat{GH} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$$

$m\angle S$

$$m\widehat{RT} = 180 - 48 = 132^\circ$$

$$m\angle S = \frac{1}{2} \times 132 = 66^\circ$$

جرباً أوجد كل قياس مما يأتي:

$m\angle R$
 $m\angle S$

يتكوّنان في نفس القوس

$$m\angle R = m\angle Q = 32^\circ$$

يتكوّنان في نفس القوس

$$m\angle S = m\angle T$$

$$5x + 4 = 6x - 2$$

$$4 + 2 = 6x - 5x$$

$$6 = x$$

$$m\angle S = 5x + 4 = 5(6) + 4 = 34^\circ$$

$m\angle A$
 $m\angle C$

$$m\angle A = m\angle B$$

$$5x = 7x - 8$$

$$8 = 7x - 5x$$

$$x = \frac{8}{2} = 4$$

$$m\angle A = 5(4) = 20^\circ$$

$$m\angle C = m\angle D$$

$$5y - 3 = 4y + 7$$

$$5y - 4y = 7 + 3$$


$$y = 10$$

$$m\angle C = 5(10) - 3 = 47^\circ$$

21. فقرة برهان

معطى: $m\angle T = \frac{1}{2}m\angle S$

المطلوب إثباته: $m\widehat{TUR} = 2m\widehat{URS}$



21. البرهان: بما أن $m\angle T = \frac{1}{2}m\angle S$. فذلك يعني $m\angle S = 2m\angle T$.

بما أن $m\angle S = \frac{1}{2}m\widehat{TUR}$ و $m\angle T = \frac{1}{2}m\widehat{URS}$. تصبح


المعادلة $\frac{1}{2}m\widehat{TUR} = 2\left(\frac{1}{2}m\widehat{URS}\right)$. ضرب طرفي المعادلة في 2

ينتج عنه $m\widehat{TUR} = 2m\widehat{URS}$.

22. برهان مكوّن من عمودين

معطى: $\odot C$

المطلوب إثباته: $\triangle KML \sim \triangle JMH$




22. العبارات (المبررات)

1. $\odot C$ (معطى)

2. $\angle H \cong \angle L$ (المحيطة التي تحصر القوس نفسه تكون \cong).


3. $\angle KML \cong \angle JMH$ (المتقابلة بالرأس تكون \cong).

4. $\triangle KML \sim \triangle JMH$ (تشابه زاويتين)



برهان: اكتب برهاناً ذا عمودين.
 معطى: $\odot C$
 المطلوب إثباته: $\Delta KML \sim \Delta JMH$

المبررات	العبارات
التقابل بالزوايا	$\angle JMH \cong \angle KML$
زاويتان محيطيتان	$\angle J \cong \angle K$
تصيران نفس القوس \widehat{HL}	
نظرية (AA) في تشابه المثلثات	$\Delta KML \sim \Delta JMH$



برهان: فقرة برهان
 المعطيات: $m\angle T = \frac{1}{2} m\angle S$
 المطلوب: $m\widehat{TUR} = 2m\widehat{US}$

(معطى) $m\angle T = \frac{1}{2} m\angle S$ *

(الزوايا = ضعف المحيطية) $m\widehat{TUR} = 2m\angle S$ I *

(القوس = ضعف المحيطية) $m\widehat{US} = 2m\angle T$ *


(ضرب المعادلة في 2) $2m\widehat{US} = 4m\angle T$ *

(المعطى ضرب في 2) $2m\widehat{US} = 4(\frac{1}{2} m\angle S)$ *

(تبسيط) $2m\widehat{US} = 2m\angle S$ II *

(القوس = ضعف المحيطية I و II) $m\widehat{TUR} = 2m\widehat{US}$ *

وهو المطلوب! إثباته



$m\angle D = 90^\circ$ (الزاوية المرسومة على القطر)

$m\angle D + m\angle C + m\angle E = 180$

$90 + 5x - 12 + 3x = 180$


$8x = 180 + 12 - 90$

$x = \frac{102}{8}$

$x = 12.75$

$m\angle C = 5(12.75) - 12$

$= 51.75^\circ$



جبر، أوجد قيمة كل متباين:

$m\angle S = 90$ (زاوية محيطية مرسومة على القطر)

$m\angle S + m\angle R + m\angle T = 180$


$90 + x + 2x = 180$

$3x = 180 - 90$

$x = \frac{90}{3}$

$x = 30$

$m\angle T = 2(30) = 60^\circ$



الشكل الرباعي الدائري
 مجموع كل زاويتين متقابلتين $180 =$

$m\angle R + m\angle Z = 180$


$4x + 2x + 30 = 180$

$6x = 180 - 30$

$x = \frac{150}{6} = 25$

$m\angle T = 180 - 45 = 135^\circ$

$m\angle Z = 2(25) + 30 = 80^\circ$



جبر، أوجد كل قياس متباين:

$m\angle H (3y+9)$

$m\angle G (x+21)$

$2x + x + 21 = 180$

$3x = 180 - 21$

$x = \frac{180 - 21}{3} = 53$

$m\angle H = 2(53) = 106^\circ$

$m\angle G = 4(53) - 11 = 93^\circ$


$3y + 9 + 4y - 11 = 180$

$7y = 180 + 11 - 9$

$y = \frac{182}{7} = 26$

31. البرهان اكتب فقرة برهان للنظرية 5.9.

نظرية 5.9




الشرح إذا أحيط متوازي أضلاعٍ بدائرة، فإن كل زاويتين متقابلتين فيه متكاملتان.

مثال إذا أحيط الشكل الرباعي $KLMN$ بالدائرة $\odot A$ ، فإن $\angle L$ و $\angle N$ زاويتان متكاملتان و $\angle K$ و $\angle M$ زاويتان متكاملتان.

31. المعطيات: شكل رباعي $ABCD$ محاط بـ $\odot O$.

المطلوب إثباته: $\angle A$ و $\angle C$ متكاملتان. $\angle B$ و $\angle D$ متكاملتان.



البرهان: بحسب جمع الأقواس وتعريف قياس القوس ومجموع الزوايا المركزية. $m\widehat{DCB} + m\widehat{DAB} = 360$.

بما أن - بحسب النظرية $m\angle C = \frac{1}{2}m\widehat{DAB}$ و $10.6 - m\angle C$

$m\angle C + m\angle A = \frac{1}{2}(m\widehat{DCB} + m\widehat{DAB})$ ، فإن $m\angle C + m\angle A = \frac{1}{2}m\widehat{DCB} + \frac{1}{2}m\widehat{DAB}$

ولكن $m\angle C + m\angle A = 180$ ، إذ $m\angle C + m\angle A = \frac{1}{2}(360)$

لأن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل الرباعي يساوي 360 ، $m\angle A + m\angle C + m\angle B + m\angle D = 360$

لكن $m\angle D = 180$ ، $m\angle A + m\angle C = 180$ ، إذا $m\angle B + m\angle D = 180$ ، إذا $m\angle B + m\angle D = 180$ ما يجعلها متكاملتين أيضًا.

ورقة عمل الصف العاشر


5-5 المماسات

الاسم:

نواتج التعلم



1- استخدام خواص المماسات.

2- حل مسائل تتضمن مضلعاتٍ محيطةً بدوائر.



المماسات: **المماس** هو مستقيم يقع في المستوى نفسه الذي تقع فيه الدائرة ويقطعها في نقطة واحدة فقط، تُسمى **نقطة التماس**. \overline{AB} مماس لـ $\odot C$ عند النقطة A ، ويُسمى كلٌّ من \overline{AB} ، \overline{AB} مماسًا للدائرة أيضًا.

المماس المشترك هو مستقيم أو نصف مستقيم أو قطعة مستقيمة تمس الدائرتين في المستوى نفسه، وفي الشكلين أدناه المستقيم ℓ مماس مشترك للدائرتين F ، G .




أضف إلى

مطوية

النظرية

التعبير اللفظي: يكون المستقيم مماسًا لدائرة في المستوى نفسه، إذا وفقط إذا كان عموديًا على نصف القطر عند نقطة التماس.



مثال: يكون المستقيم ℓ مماسًا لـ $\odot S$ ، إذا وفقط إذا كان $\ell \perp ST$.

أضف إلى

مطوية

نظرية

التعبير اللفظي: إذا رُسمت قطعتان مستقيمتان مماستان لدائرة من نقطة خارجها فإنهما متطابقتان.



مثال: إذا كان \overline{AB} ، \overline{CB} مماسان لـ $\odot D$ ، فإن $\overline{AB} \cong \overline{CB}$.

المضلعات المحيطة بدائرة: يُحيط المضلع بالدائرة، إذا كان كل ضلع من أضلاعه مماسًا للدائرة.


مضلعات ليست محيطة بدائرة



مضلعات محيطة بدائرة




إذا كان المضلع يحيط بالدائرة، فأوجد قيمة x ، ثم أوجد محيط المضلع في كل من السؤالين الآتيين:




$$\begin{aligned} QT &= QU \\ 2x &= 14 \\ x &= \frac{14}{2} \\ x &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{المحيط} &= RS + SQ + QR \\ &= 27 + 31 + 24 \\ &= 82 \text{ in} \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} x &= MB = MB = 13 - AM = 13 - 5 = 8 \\ \text{المحيط} &= AB + BC + CD + DA \\ &= 13 + 15 + 13 + 11 = 52 \text{ cm} \end{aligned}$$

أوجد قيمة x في كل من السؤالين الآتيين، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلاً، وقرب إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.



$$\begin{aligned} TQ &= TR \\ TR &= TS \\ \Rightarrow TQ &= TS \\ 3x - 8 &= x + 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x - x &= 10 + 8 \\ 2x &= 18 \\ x &= \frac{18}{2} \\ x &= 9 \end{aligned}$$



نصائح: أقطار

$$4 = QT = QR = QV$$

$$QS = 5 + 4 = 9$$

مثلث متساوية الساقين

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{9^2 - 4^2} \\ &= \sqrt{65} \\ &= 8.06 \end{aligned}$$


18

اكتب النوع المحدد من البراهين.

28. البرهان المكوّن من عمودين للنظرية 5.11

المعطيات: \overline{AC} مماس للدائرة $\odot H$ عند C . \overline{AB} مماس للدائرة $\odot H$ عند B .

المطلوب إثباته: $\overline{AC} \cong \overline{AB}$



28. البرهان:


العبارات (المبررات)

1. \overline{AC} مماس لـ $\odot H$ عند C ، \overline{AB} مماس لـ $\odot H$ عند B . (معطى)
2. ارسم \overline{AH} و \overline{BH} و \overline{CH} . (بمستقيم واحد فقط من أي نقطتين.)
3. $\overline{AC} \perp \overline{CH}$ ، $\overline{AB} \perp \overline{BH}$ (المستقيم المماس لدائرة يكون \perp على نصف القطر عند نقطة التماس.)
4. $\angle ABH$ و $\angle ACH$ زاويتان قائمتان. (تعريف المستقيمتان \perp .)
5. $\overline{CH} \cong \overline{BH}$ (جميع أنصاف أقطار دائرة تكون \cong .)
6. $\overline{AH} \cong \overline{AH}$ (خاصية الانعكاس.)
7. $\triangle ACH \cong \triangle ABH$ (وتر وضع قائمة)
8. $\overline{AC} \cong \overline{AB}$ (نطاق الأجزاء المتناظرة في المثلثات المتطابقة)

29. البرهان المكوّن من عمودين

المعطى: شكل رباعي $ABCD$ محيطة بالدائرة $\odot P$.


المطلوب إثباته: $AB + CD = AD + BC$



29. العبارات (المبررات)

1. الشكل الرباعي $ABCD$ محيطة بالدائرة $\odot P$. (معطى)
2. الأضلاع \overline{AB} و \overline{BC} و \overline{CD} و \overline{DA} مماسة لـ $\odot P$ عند النقاط H و G و F و E على التوالي. (تعريف المضلع المحاط)
3. $\overline{EA} \cong \overline{AH}$ ، $\overline{HB} \cong \overline{BG}$ ، $\overline{GC} \cong \overline{CF}$ ، $\overline{FD} \cong \overline{DE}$ (المماسات لدائرة من النقطة الخارجية نفسها تكونان \cong .)
4. $AB = AH + HB$ ، $BC = BG + GC$ ، $CD = CF + FD$ ، $DA = DE + EA$ (جمع القطع المستقيمة)
5. $AB + CD = AH + HB + CF + FD$ ، $DA + BC = DE + EA + BG + GC$ (بالتعويض)
6. $AB + CD = AH + BG + GC + FD$ ، $DA + BC = FD + AH + BG + GC$ (بالتعويض)
7. $AB + CD = FD + AH + BG + GC$ (خاصية التبديل في الجمع)
8. $AB + CD = DA + BC$ (بالتعويض)


أوجد قيمة x في كلٍّ مما يأتي:



$$125 + 155 + x = 360$$

$$280 + x = 360$$


$$x = 360 - 280 = 80^\circ$$



$$65 + 70 + x = 360$$

$$135 + x = 360$$


$$x = 360 - 135 = 225^\circ$$



$$150 + 85 + x + 90 = 360$$

$$325 + x = 360$$

$$x = 360 - 325 = 35^\circ$$



$$145 + 135 + x + x = 360$$

$$280 + 2x = 360$$


$$2x = 360 - 280$$

$$2x = 80$$

$$x = \frac{80}{2}$$

$$x = 40^\circ$$

حدد ما إذا كان كل قوسٍ مما يأتي قوسًا أكبر أو أصغر أو نصف دائرة، ثم أوجد قياسه.



$m\widehat{CD}$	55°	$m\widehat{AC}$	$180 - 55 = 125^\circ$	$m\widehat{CFG}$	180°
	قوس أصغر		قوس أصغر		نصف دائرة
$m\widehat{CGD}$	$360 - 55 = 305^\circ$	$m\widehat{GCF}$	$360 - 35 = 325^\circ$	$m\widehat{ACD}$	180°
	قوس أكبر		قوس أكبر		نصف دائرة

تسوق: يعرض الشكل المجاور نتائج استطلاع حول المكان المفضل لشراء الملابس، شمل مجموعة من الشباب.

النسبة \times الكلي =

(a) ما قياس القوس المقابل لفئة التسوق في كلٍّ من المجمعات التجارية والمحلات المتخصصة؟

$$\rightarrow \text{قوس المجمعات التجارية} \quad 76\% \times 360 = 273.6^\circ$$

$$\rightarrow \text{قوس المحلات المتخصصة} \quad 4\% \times 360 = 14.4^\circ$$

(b) صف نوع القوس المقابل لفئة المجمعات التجارية وفئة الأسواق الشعبية.

قوس أكبر \leftarrow المجمعات التجارية

قوس أصغر \leftarrow الأسواق الشعبية

(c) هل توجد أقواس متطابقة في هذا الشكل؟ وضح إجابتك.

نعم، قوس (فئة هذه الأماكن) وقوس (عبر الإنترنت)

النسبة متساوية = 9%

أفضل الأماكن لشراء الملابس




1- التعرف على العلاقات بين الأقواس والأوتار واستخدامها. 2- التعرف على العلاقات بين الأقواس والأوتار والأقطار واستخدامها.

نظرية

أضف إلى

مطويتك



التعبير اللفظي: في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون القوسان الأصغران متطابقين، إذا فقط إذا كان الوتران المناظران لهما متطابقين.


$$\overline{FG} \cong \overline{HJ}, \text{ إذا فقط إذا كان } \widehat{FG} \cong \widehat{HJ}.$$

مثال:

نظريات


أضف إلى

مطويتك



إذا كان قطر (أو نصف قطر) الدائرة عمودياً على وتر فيها، فإنه يُنصّف ذلك الوتر، ويُنصّف قوسه.

مثال: إذا كان القطر \overline{AB} عمودياً على \overline{XY} في النقطة Z ، فإن: $\overline{XZ} \cong \overline{ZY}$, $\widehat{XB} \cong \widehat{BY}$.




العمود المنصف لوتر في الدائرة هو قطر (أو نصف قطر) لها.

مثال: إذا كان \overline{AB} عموداً منصفاً للوتر \overline{XY} ، فإن \overline{AB} قطر في $\odot C$.

نظرية

أضف إلى

مطويتك




التعبير اللفظي: في الدائرة نفسها أو في دائرتين متطابقتين، يكون الوتران متطابقين إذا فقط إذا كان بُعدهما عن مركز الدائرة متساويين.

$$\overline{FG} \cong \overline{HJ} \text{ إذا فقط إذا كان } LX = LY.$$

مثال:


إذا كان طول قطر $\odot H$ يساوي 18 و $LM = 12$ و $m\widehat{LM} = 84^\circ$ ، فأوجد القياسين الآتين مقرباً إجابتك إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.



$$\odot m\widehat{LK} = 84 \div 2 = \boxed{42^\circ}$$


$$\begin{aligned} \underline{HE} &= \sqrt{9^2 - 6^2} \\ &= 3\sqrt{5} \\ &= \boxed{6.71} \end{aligned}$$

إذا كان طول نصف قطر $\odot A$ يساوي 14 و $CD = 22$ ، فأوجد القياسين الآتين مقرباً إجابتك إلى أقرب جزء من مئة، إذا لزم ذلك.



$$\odot \underline{CE} = \frac{1}{2} CD = \frac{1}{2} (22) = \boxed{11}$$

$$\begin{aligned} \underline{EB}, \underline{AE} &= \sqrt{14^2 - 11^2} \rightarrow \underline{EB} = 14 - 8.66 \\ &= 5\sqrt{3} \\ &= \boxed{8.66} \end{aligned} \quad \rightarrow \underline{EB} = 14 - 8.66 = \boxed{5.34}$$




تزلج: سكة التزلج في الشكل المجاور تأخذ شكل قوس من دائرة، حيث \widehat{BD} جزء من قوسها. إذا كان قياس \widehat{ABC} يساوي 32% من الدائرة الكاملة، فأوجد $m\widehat{AB}$ ؟

$$m\widehat{AB} = 16 \cdot \left(\frac{360^\circ}{360} \right)$$

$$= \boxed{57.6^\circ}$$

جبر: في $\odot S$ ، إذا كان: $LM = 16$, $PN = 4x$ ، فأوجد قيمة x .



$$PN = LM$$


$$4x = 16$$

$$\Rightarrow x = \frac{16}{4}$$

$$\boxed{x = 4}$$

جبر: في $\odot F$ ، إذا كان: $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ ، فأوجد قيمة x .

$DF = 3x - 7$, $FE = x + 9$



$$\underline{DE} = EF$$

$$3x - 7 = x + 9$$

$$3x - x = 9 + 7$$

$$2x = 16$$

$$x = \frac{16}{2}$$

$$\boxed{x = 8}$$


- 1- إيجاد قياسات الزوايا التي تشكلها مستقيمتان تتقاطعان على محيط دائرة أو بداخلها .
2- إيجاد قياسات الزوايا التي تشكلها مستقيمتان تتقاطعان خارج الدائرة .

نظرية

أضف إلى

مطوياتك

التعبير اللفظي: إذا تقاطعت قاطعتان أو وتران داخل دائرة، فإن قياس الزاوية المتكونة من التقاطع يساوي نصف مجموع قياسي القوس المقابل لهذه الزاوية والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس.



$$m\angle 2 = \frac{1}{2} (m\widehat{DA} + m\widehat{BC}) \text{ و } m\angle 1 = \frac{1}{2} (m\widehat{AB} + m\widehat{CD})$$

مثال:


نظرية

أضف إلى

مطوياتك

نظرية الزاوية المماسية

التعبير اللفظي: إذا تقاطعت مماس وقاطع عند نقطة التماس، فإن قياس كل زاوية متكونة من التقاطع يساوي نصف قياس القوس المقابل لها.



$$m\angle 2 = \frac{1}{2} m\widehat{ACB} \text{ و } m\angle 1 = \frac{1}{2} m\widehat{AB}$$

مثال:


نظرية

أضف إلى


مطوياتك

التعبير اللفظي: إذا تقاطعت قاطعتان أو قاطع ومماس أو مماسان في نقطة خارج دائرة، فإن قياس الزاوية المتكونة يساوي نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين المقابلين لها.


أمثلة:



قاطعتان






قاطع ومماس




مماسان

$$m\angle A = \frac{1}{2} (m\widehat{DE} - m\widehat{BC}) \quad m\angle A = \frac{1}{2} (m\widehat{DC} - m\widehat{BC}) \quad m\angle A = \frac{1}{2} (m\widehat{BDC} - m\widehat{BC})$$

قياس الزاوية	نماذج	موقع رأس الزاوية
نصف قياس القوس المقابل $m\angle 1 = \frac{1}{2} x^\circ$		على الدائرة
نصف مجموع قياس القوس المقابل للزاوية، والقوس المقابل للزاوية التي تقابلها بالرأس. $m\angle 1 = \frac{1}{2} (x^\circ + y^\circ)$		داخل الدائرة
نصف الفرق الموجب بين قياسي القوسين المقابلين لها $m\angle 1 = \frac{1}{2} (x^\circ - y^\circ)$		خارج الدائرة


جد كل قياس، بفرض أن القطع المستقيمة التي يبدو أنها مماسات هي مماسات بالفعل.

 $m\angle 3$ 

(مجموع القوسين) $= 74 + \frac{1}{2} = 74.5$ قياس الزاوية


$$m\angle 3 = \frac{1}{2} (74 + 90)$$

$$= \boxed{82^\circ}$$

 $m\angle 4$ 


$$m\angle 4 = \frac{1}{2} (92 + 51)$$

$$= \boxed{71.5^\circ}$$

 $m\angle JMK$ 

$$m\angle LMK = \frac{1}{2} (77 + 79) = 78^\circ$$

$$\Rightarrow m\angle JMK = 180 - 78 = \boxed{102^\circ}$$


 $m\widehat{RQ} = x$ 

$$m\angle NMP = \frac{1}{2} (74 + x)$$

$$51 = \frac{1}{2} (74 + x)$$

$$2(51) = 74 + x$$


$$\Rightarrow x = 2(51) - 74 = \boxed{28^\circ}$$

 $m\angle K$ 

$$m\angle k = \frac{1}{2} m \widehat{JK}$$

$$= \frac{1}{2} (194)$$

$$= \boxed{97^\circ}$$


 $m\widehat{PM}$ 

$$m\angle M = \frac{1}{2} m \widehat{PM}$$

$$72 = \frac{1}{2} m \widehat{PM}$$

$$\Rightarrow m \widehat{PM} = 2(72) = \boxed{144^\circ}$$

نسبة أطوال ثلاثة أضلاع في مثلث هي 2 : 5 : 4. ومحيطه يساوي 165 وحدة. جد طول كل ضلع من أضلاع المثلث.



$$2x + 5x + 4x = 165$$


$$11x = 165 \Rightarrow x = 15$$

$$\text{الضلع الأول} \Rightarrow 2(15) = 30$$

$$\text{الضلع الثاني} \Rightarrow 5(15) = 75$$

$$\text{الضلع الثالث} \Rightarrow 4(15) = 60$$

نسبة قياسات ثلاث زوايا في مثلث هي 4 : 6 : 8. جد قياس كل زاوية من زوايا المثلث.



$$\text{مجموع زوايا المثلث} = 4x + 6x + 8x$$

$$180 = 18x$$

$$\frac{180}{18} = x \Rightarrow x = 10$$

$$\text{الزاوية الأولى} \Rightarrow 4(10) = 40$$

$$\text{الزاوية الثانية} \Rightarrow 6(10) = 60$$

$$\text{الزاوية الثالثة} \Rightarrow 8(10) = 80$$

6-2 المضلعات المتشابهة

ورقة عمل الصف العاشر


2- حل المسائل باستخدام خواص المضلعات المتشابهة.

1- استخدام التناسبات لتحديد المضلعات المتشابهة.

نواتج التعلم

أدرج قائمة بكل أزواج الزوايا المتطابقة، واكتب تناسباتًا مرتبطة بالأضلاع المتناظرة لكل زوج من المضلعات المتشابهة.

$$\triangle DFG \sim \triangle KMJ$$




$$\angle D \cong \angle K, \angle F \cong \angle M$$

$$\angle G \cong \angle J$$

$$\frac{DF}{KM} = \frac{FG}{MJ} = \frac{DG}{KJ}$$

$$JHFM \sim PQST$$





$$\angle M \cong \angle T, \angle J \cong \angle P$$

$$\angle H \cong \angle Q, \angle F \cong \angle S$$

$$\frac{JH}{PQ} = \frac{HF}{QS} = \frac{FM}{ST} = \frac{JM}{PT}$$

فرضيات حدد ما إذا كان كل زوجين من الأشكال متشابهين. فإن كانا كذلك، اكتب عبارة التشابه ومعامل المقياس. وإن لم يكونا متشابهين، فاشرح استنتاجك.



نلاحظ أن الزوايا المتناظرة ليست متناسبة.
في المثلثين.
وبالتالي المثلثين غير متشابهين.

الزوايا المتناظرة ليست متناسبة.
وبالتالي المثلثين غير متشابهين.

ولكن $\frac{8}{6} \neq \frac{6}{4}$
نلاحظ أن الأضلاع المتناظرة ليست متناسبة.
وبالتالي المثلثين غير متشابهين.

ورقة عمل الصف العاشر 6-3 المثلثات المتشابهة الاسم: _____ الشعبة: _____

- 1- تحديد المثلثات المتشابهة باستخدام مسلمة تشابه مثلثين من خلال تساوي زاويتين متناظرتين فيهما ونظرية التشابه (ضلع - ضلع - ضلع) نظرية التشابه (ضلع - زاوية - ضلع) .
2- استخدام المثلثات المتشابهة لحل المسائل.

نواتج التعلم

مسئمة تشابه زاوية-زاوية (AA)

إذا تطابقت زاويتان في أحد المثلثات مع زاويتين في مثلث آخر، فإذًا يكون المثلثان متشابهين.
مثال إذا كان $\angle A \equiv \angle F$ و $\angle B \equiv \angle G$. فإذًا $\triangle ABC \sim \triangle FGH$.

نظرية تشابه المثلثات

تشابه ضلع-ضلع-ضلع (SSS)

إذا كانت أطوال الأضلاع المتناظرة في مثلثين متناسبة، فإذًا المثلثان متشابهان.
مثال إذا كان $\frac{JK}{MP} = \frac{KL}{PQ} = \frac{LJ}{QM}$. فإن $\triangle JKL \sim \triangle MPQ$.

تشابه ضلع-زاوية-ضلع (SAS)

إذا كانت أطوال ضلعين في مثلث متناسبة مع أطوال الضلعين المتناظرين في مثلث آخر والزاويتين المحصورة بينهما متطابقتان، فإن المثلثات تكون متشابهة.
مثال إذا كان $\angle S \equiv \angle Y$ و $\frac{RS}{XY} = \frac{ST}{YZ}$. فإن $\triangle RST \sim \triangle XYZ$.

نظرية خواص التشابه

خاصية انعكاس التشابه
خاصية تناظر التشابه
خاصية التعدي في التشابه

$\triangle ABC \sim \triangle ABC$
إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ فإن $\triangle DEF \sim \triangle ABC$
إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ و $\triangle DEF \sim \triangle XYZ$ فإن $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$

ملخص المسائل تشابه المثلثات

نظرية التشابه SAS

إذا كان $\frac{AB}{XY} = \frac{AC}{XZ}$ و $\angle A \equiv \angle X$ فإن $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$


نظرية التشابه SSS

إذا كان $\frac{AB}{XY} = \frac{AC}{XZ} = \frac{BC}{YZ}$ فإن $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$

مسئمة التشابه AA

إذا كان $\angle A \equiv \angle X$ و $\angle C \equiv \angle Z$ فإن $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$

الجبر حدد المثلثات المتشابهة. ثم جد جميع القياسات.



$\angle J \cong \angle P$ (معلوم)
 $\angle JLK \cong \angle PLM$
 (مقابل بالرأس)


المثلثين متشابهين حسب نظرية AA

$\Rightarrow \Delta JLK \sim \Delta PLM$

$\Rightarrow \frac{4}{6} = \frac{x}{12} \Rightarrow 4(12) = 6x$

$\Rightarrow x = \frac{4(12)}{6} = 8 = JK$

WZ, UZ



$WU = \sqrt{40^2 - 32^2} = 24$

$\Delta WUZ \sim \Delta YUW$


$\Rightarrow \frac{WU}{YU} = \frac{WZ}{YW}$

$\Rightarrow \frac{24}{32} = \frac{3x-6}{40} \Rightarrow 32(3x-6) = 24(40)$

$\Rightarrow 96x - 192 = 960 \Rightarrow x = \frac{960+192}{96} = 12$

$\Rightarrow WZ = 3(12) - 6 = 30$ / $UZ = (12) + 6 = 18$

HJ, HK



$\Delta JHK \sim \Delta QNP$

$\frac{JH}{QN} = \frac{HK}{NP} = \frac{JK}{QP}$



$\frac{4x+7}{12} = \frac{6x-2}{8} = \frac{25}{20}$

$20(6x-2) = 8(25) \mid HJ = 4(2) + 7 = 15$

$120x - 40 = 200 \mid HK = 6(2) - 2 = 10$

$\Rightarrow x = \frac{200+40}{120} = 2$

ST



$\Delta QRS \sim \Delta QPT \Rightarrow \frac{QR}{QP} = \frac{RS}{PT} = \frac{QS}{QT}$

$\frac{QR}{QP} = \frac{12}{16} = \frac{x}{20} \Rightarrow 16x = 12(20)$

$\Rightarrow x = \frac{240}{16} = 15 \Rightarrow ST = 20 - 15 = 5$

تصايل تنصف ريبام بجوار شمال في الحديقة. فإذا كان طول ريبام 5 ft وظلها 3 ft وظل الشمال $10\frac{1}{2}$ ft فما هو طول الشمال؟



المثلثين متشابهين

لأنهما يشتركان في الزاوية المقابلة للزاوية القائمة



$\frac{5}{x} = \frac{3}{10.5}$

$\Rightarrow x = \frac{5(10.5)}{3}$

$x = \text{طول الشمال} = 17.5 \text{ ft}$


24. إدارة الغابات يمكن استخدام مقياس الارتفاع هذا الموضح أمامك في تقدير ارتفاع الأشجار. نظر عمرو عبر قصبة الجهاز إلى قمة الشجرة ودون قراءة الجهاز. جد ارتفاع الشجرة.

مقياس الارتفاع



$$\frac{x}{15} = \frac{6}{10} \Rightarrow x = \frac{6(15)}{10} = 9$$

$$\begin{aligned} \text{ارتفاع الشجرة} &= 9 + 1.75 \\ &= \boxed{10.75} \text{ m} \end{aligned}$$



البرهان اكتب برهاناً من عمودين.


25. النظرية 6.3

6.3 تشابه ضلع-زاوية-ضلع (SAS)

إذا كانت أطوال ضلعين في مثلث متناسبة مع أطوال الضلعين المتناظرين في مثلث آخر والزائويتين المحصورة بينهما متطابقة، فإن المثلثات تكون متشابهة.

مثال إذا كان $\frac{RS}{XY} = \frac{ST}{YZ}$ و $\angle S \cong \angle Y$. فإن

$$\triangle RST \sim \triangle XYZ$$



14. $\angle C \cong \angle F$ (خاصية. التعدي)

15. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ (تشابه زاوية-زاوية)

4. $\triangle ABC \sim \triangle AQP$ (تشابه زاوية-زاوية)

$$5. \frac{AB}{AQ} = \frac{BC}{QP} \text{ (تعريف } \sim \text{)}$$

$$6. AB \times QP = AQ \times BC;$$

$$AB \times EF = DE \times BC$$

(بالضرب التقاطعي)

$$7. QP = EF \text{ (تعريف القطع)}$$

(المستقيمة المتناظرة \cong)

$$8. AB \times EF = AQ \times BC \text{ (بالتعويض)}$$

$$9. AQ \times BC = DE \times BC \text{ (بالتعويض)}$$

$$10. AQ = DE \text{ (خاصية القسمة)}$$

$$11. \overline{AQ} \cong \overline{DE} \text{ (تعريف القطع)}$$

(المستقيمة المتناظرة \cong)

$$12. \triangle AQP \cong \triangle DEF \text{ (تشابه ضلع-زاوية-ضلع)}$$

$$13. \angle AQP \cong \angle F \text{ (الأجزاء المتناظرة)}$$

من مثلثين متطابقين متطابقين

إجابات إضافية

25. المعطيات: $\angle B \cong \angle E$, $\overline{QP} \parallel \overline{BC}$

$$\overline{QP} \cong \overline{EF}, \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$$

المطلوب: $\triangle ABC \sim \triangle DEF$



البرهان:

العبارات (المبررات)

$$1. \angle B \cong \angle E, \overline{QP} \parallel \overline{BC}, \overline{QP} \cong \overline{EF}.$$

$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} \text{ (معطى)}$$

$$2. \angle AQP \cong \angle C, \angle AQP \cong \angle B$$

(مستقيمة \triangle للتشابه)

$$3. \angle AQP \cong \angle E \text{ (خاصية. التعدي)}$$

نظرية 6.4 خواص التشابه

$$\triangle ABC \sim \triangle ABC$$

خاصية انعكاس التشابه

إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ فإن $\triangle DEF \sim \triangle ABC$.


خاصية تناظر التشابه

إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ و $\triangle DEF \sim \triangle XYZ$.

خاصية التعدي في التشابه

فإن $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$.

26.

الخاصية العكسية في التشابهالمعطيات: $\triangle ABC$ المطلوب: $\triangle ABC \sim \triangle ABC$

البرهان:

العبارات (المبررات)1. $\triangle ABC$ (معطى)2. $\angle A \cong \angle A, \angle B \cong \angle B$

(الخاصية العكسية)

3. $\triangle ABC \sim \triangle ABC$ (تشابه زاوية-زاوية)خاصية التعدي في التشابهالمعطيات: $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ و $\triangle DEF \sim \triangle GHI$ المطلوب: $\triangle ABC \sim \triangle GHI$ العبارات (المبررات)1. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ و $\triangle DEF \sim \triangle GHI$ (معطى)2. $\angle E \cong \angle H, \angle D \cong \angle G, \angle B \cong \angle E, \angle A \cong \angle D$

(تعريف المضلعات - المتشابهة تقريباً)


3. $\angle B \cong \angle H$ و $\angle A \cong \angle G$ (خاصية التعدي)4. $\triangle ABC \sim \triangle GHI$ (تشابه زاوية-زاوية)خاصية التناظر في التشابهالمعطيات: $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ المطلوب: $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ العبارات (المبررات)1. $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ (معطى)2. $\angle B \cong \angle E$ و $\angle A \cong \angle D$

(تعريف المضلعات - المتشابهة تقريباً)

3. $\angle E \cong \angle B$ و $\angle D \cong \angle A$ (خاصية التناظر)4. $\triangle DEF \sim \triangle ABC$ (تشابه زاوية-زاوية)

1- استخدام الأجزاء المتناسبة داخل المثلثات. 2- استخدام الأجزاء المتناسبة مع المستقيمت المتوازية.


نظرية نظرية تناسب المثلثات



إذا توازي مستقيم مع أحد أضلاع المثلث وكان **مترافعا** **مترافعا** الضلعين الآخرين، فإنه يقسم هذين الضلعين إلى قطع مستقيمة أطوالها متناسبة.

مثال إذا كان $\overline{BE} \parallel \overline{AC}$ فإن $\frac{AB}{BC} = \frac{AE}{ED}$


النظرية معكوس نظرية تناسب المثلثات



إذا قطع مستقيم ضلعين في مثلث وقسم الضلعين إلى قطع مستقيمة متناظرة متناسبة، فإن هذا المستقيم يكون موازيا للضلع الثالث في المثلث.

مثال إذا كان $\frac{AE}{EB} = \frac{CD}{DB}$ فإن $\overline{AC} \parallel \overline{ED}$


نظرية نظرية منصفات المثلث



يكون منصف المثلث موازيا لأحد أضلاع المثلث، ويبلغ طوله نصف طول هذا الضلع.

مثال إذا كان J و K هما نقطتا المنصف للضلعين \overline{FH} و \overline{GH} ، على الترتيب، فإن $\overline{JK} \parallel \overline{FG}$ وكذلك $JK = \frac{1}{2}FG$.


النتيجة الأجزاء المتناسبة للمستقيمت المتوازية



عند تقاطع ثلاثة مستقيمت متوازية أو أكثر مع قاطعين فإنها تقسم القاطعين إلى أجزاء متناسبة.

مثال إذا كان $\overline{AE} \parallel \overline{BF} \parallel \overline{CG}$ فإن $\frac{AB}{BC} = \frac{EF}{FG}$

النتيجة الأجزاء المتطابقة للمستقيمت المتوازية



إذا أحدثت ثلاثة مستقيمت متوازية أو أكثر قطعا مستقيمة متطابقة على قاطع ما، فإنها تحدث قطعا مستقيمة متطابقة على كل القواطع.

مثال إذا كان $\overline{AE} \parallel \overline{BF} \parallel \overline{CG}$ وكان $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ فإن $\overline{EF} \cong \overline{FG}$


10



استخدام النماذج في تشارلستون بولاية كارولينا

الجنوبية، يتوازي شارع لوجان ستريت مع كل من شارع كينج ستريت وشارع سميث ستريت بين شارع بايوفين ستريت وشارع كوين ستريت. ما المسافة من سميث إلى لوجان مرورا بشارع بيوفين؟ قُرب إلى أقرب قدم.

$$\frac{839}{733} = \frac{x}{778} \Rightarrow x = \frac{778(839)}{733} \approx \boxed{891} \text{ ft}$$



$$y = \frac{3}{5}y + 2$$

$$y - \frac{3}{5}y = 2$$

$$\frac{2}{5}y = 2$$


$$y = 2 \left(\frac{5}{2}\right) = \boxed{5}$$

$$20 - 5x = 2x + 6$$

$$20 - 6 = 2x + 5x$$

$$14 = 7x$$

$$\boxed{2 = x}$$



$$\frac{1}{3}x + 2 = \frac{2}{3}x - 4$$

$$2 + 4 = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}x$$

$$6 = \frac{1}{3}x$$

$$6(3) = x$$

$$\boxed{18 = x}$$

$$5y = \frac{7}{3}y + 8$$

$$5y - \frac{7}{3}y = 8$$

$$\frac{8}{3}y = 8$$

$$y = 8 \left(\frac{3}{8}\right)$$

$$\boxed{y = 3}$$

الاسم:


6-5 أجزاء المثلثات المتشابهة

ورقة عمل الصف العاشر


- 1- التعرف على علاقات التناسب بين منصفات الزوايا والارتفاعات والمتوسطات المتناظرة في المثلثات المتشابهة واستخدامها.
- 2- استخدام نظرية منصفات المثلث.

نواتج التعلم


نظريات قطع مستقيمة خاصة بالمثلثات المتشابهة



إذا كان هناك مثلثان متشابهان، فإن أطوال الارتفاعات المتناظرة تكون متناسبة مع أطوال الأضلاع المتناظرة.
الاختصار ΔS - به ارتفاعات متناظرة متناسبة مع أضلاع متناظرة.
مثال إذا كان $\Delta ABC \sim \Delta FGH$ ، فإذا $\frac{AD}{FJ} = \frac{AB}{FG}$




إذا كان هناك مثلثان متشابهان، فإن أطوال منصفات الزوايا المتناظرة تكون متناسبة مع أطوال الأضلاع المتناظرة.
الاختصار ΔS - به منصفات \angle متناظرة متناسبة مع الأضلاع المتناظرة.
مثال إذا كان $\Delta KLM \sim \Delta QRS$ ، فإذا $\frac{LP}{RT} = \frac{LM}{RS}$







إذا كان هناك مثلثان متشابهان، فإن أطوال المتوسطات المتناظرة تكون متناسبة مع أطوال الأضلاع المتناظرة.
الاختصار ΔS - به متوسطات متناظرة متناسبة مع أضلاع متناظرة.
مثال إذا كان $\Delta ABC \sim \Delta WXY$ ، فإن $\frac{CD}{WZ} = \frac{AB}{WX}$

النظرية منصف زاوية المثلث



يعمل منصف الزاوية في المثلث على تقسيم الضلع المقابل إلى قطعتين مستقيمتين متناسبتين مع أطوال الضلعين الآخرين.
مثال إذا كان JM منصف زاوية في المثلث ΔJKL
إذا $\frac{KM}{LM} = \frac{KJ}{LJ}$ ← قطعتان مستقيمتان رأسهما K
 $\frac{LM}{KM} = \frac{LJ}{KJ}$ ← قطعتان مستقيمتان رأسهما L




الطرق ينتج عن تقاطع الطريقتين الموضحين مثلثان متشابهان. إذا كان AC يبلغ 382 ft و MP يبلغ 248 ft وتقع محطة الوقود على بعد 50 ft من التقاطع. فكم يبعد المصرف عن التقاطع؟




$\frac{x}{50} = \frac{382}{248} \Rightarrow x = \frac{50(382)}{248} = 77$ ft

الانتظام كل زوجين من المضلعات متشابهان. فجد قيمة x.




بما أن المضلعين متشابهين
فلا بد أن يكون الأضلاع المتناظرة متناسبة.
 $\frac{x+5}{15} = \frac{4}{5} \Rightarrow x+5 = \frac{4(15)}{5}$
 $5(x+5) = 4(15) \Rightarrow x = \frac{4(15)}{5} - 5 = 7$



بما أن المضلعين متشابهين ← الأضلاع المتناظرة متناسبة
 $\frac{2}{3} = \frac{x+3}{2x+2} \Rightarrow 4x - 3x = 9 - 4$
 $2(2x+2) = 3(x+3) \Rightarrow x = 5$
 $4x + 4 = 3x + 9$

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ إذا كان $\triangle DEF$
AC = 7 و BC = 6 و AB = 5 و
DE = 3 و




$\frac{5}{3} = \frac{6}{y} = \frac{7}{x}$
 $y = \frac{6(3)}{5} = 3.6 \quad x = \frac{7(3)}{5} = 4.2$

المحيط = 3.6 + 4.2 + 3 = 10.8

جد محيط المثلث الموضح أمامك.

$\triangle WZX \sim \triangle SRT$ إذا كان $\triangle WZX$
و WX = 5 و ST = 6 و
 $\triangle SRT = 15$



لأن المثلثين متشابهين فإن محيطهما متناسبان
مع أضلعهما


$\frac{WX}{ST} = \frac{\text{محيط } \triangle WZX}{\text{محيط } \triangle SRT}$
 $\frac{5}{6} = \frac{\text{محيط } \triangle WZX}{15}$
 $\Rightarrow \text{محيط } \triangle WZX = \frac{5(15)}{6} = 12.5$



العاب أبعاد ملعب الهوكي هي 160 ft في 200 ft. هل ملعب الهوكي وطاولة الهوكي الهوائي الموضحة في الشكل متشابهان؟ اشرح استنتاجك.

نختبر تناسب الأضلاع المتناظرة ← $\frac{98}{200} \neq \frac{49}{160}$

فلا هذا أن تناسب الطاولة والملاعب غير متشابهين.



يحدث تغيير الأبعاد حول نقطة ثابتة تُسمى **مركز تغيير الأبعاد (التمدد)**.


يصف **معامل مقياس تغيير الأبعاد (التمدد)** مدى تغيير الأبعاد. معامل المقياس هو نسبة الطول الموجود بالصورة إلى الطول الموجود بالشكل الأصلي.

$\triangle ABC$ هو تغيير أبعاد للمثلث $\triangle JKL$


مركز تغيير الأبعاد: $(0, 0)$

$$\text{معامل المقياس} = \frac{\text{صورة}}{\text{الأصل}} = \frac{JK}{AB}$$

حدد ما إذا كان تغيير الأبعاد (التمدد) من A إلى B هو تكبير أم تصغير. ثم جد معامل التمدد.




تغيير
تم تكبير الشكل A الأصلي
إلى الشكل B الصورة
معامل التمدد = $\frac{\text{صورة}}{\text{الأصل}} = \frac{8}{4}$
معامل التمدد = $[2]$




تصغير
تم تصغير الشكل A الأصلي
إلى الشكل B الصورة
معامل التمدد = $\frac{\text{صورة}}{\text{الأصل}} = \frac{2}{4}$
معامل التمدد = $\frac{1}{2}$

الفرضيات تحقق من أن تغيير الأبعاد (التمدد) هو تحويل تشابه.



$(BC) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ميل
 $(DE) = \frac{1}{4}$ ميل
 $\Rightarrow \overline{BC} \parallel \overline{DE}$
 $\Rightarrow \angle B \cong \angle D$ متناظرة
 $\Rightarrow \angle C \cong \angle E$ متناظرة
الثلثين متشابهين حسب نظرية [AA]



$$\text{ميل } (KL) = \frac{4}{4} = 1$$

$$\text{ميل } (RS) = \frac{2}{2} = 1$$

$$\Rightarrow \overline{KL} \parallel \overline{RS}$$

$$\Rightarrow \angle L \cong \angle S \rightarrow \text{متناظرة}$$

$$\Rightarrow \angle K \cong \angle R \rightarrow \text{متناظرة}$$

$$\Rightarrow \triangle LKJ \sim \triangle SRT$$

حسب نظرية [AA]

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$$

$$AB = \sqrt{(0-(-4))^2 + (0-(-4))^2} = \sqrt{32}$$

$$AD = \sqrt{(0-(-2))^2 + (0-(-2))^2} = \sqrt{8}$$

$$AC = \sqrt{(0-4)^2 + (0-(-2))^2} = \sqrt{20}$$

$$AE = \sqrt{(0-2)^2 + (0-(-1))^2} = \sqrt{5}$$

$$BC = \sqrt{(4-(-4))^2 + (-2-(-4))^2} = \sqrt{68}$$

$$DE = \sqrt{(2-(-2))^2 + (-1-(-2))^2} = \sqrt{17}$$

$$\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{68}}{\sqrt{17}}$$

$$2 = 2 = 2$$

لأن الأضلاع المتناظرة متناسبة

فإنه المثلثان متشابهان


1- إيجاد الوسط الهندسي بين عددين. 2- حل مسائل تتضمن علاقات بين أجزاء مثلث قائم الزاوية وبين الارتفاع المنشأ من وتره.

المفهوم الأساسي الوسط الهندسي للعددين a و b

الشرح الوسط الهندسي لعددين موجبين a و b هو العدد x مثل $\frac{a}{x} = \frac{x}{b}$.
إذا، $\sqrt{ab} = x$ و $ba = x^2$


مثال الوسط الهندسي لكل من $a = 4$, $b = 9$ هو 6 لأن $6 = \sqrt{9 \times 4}$

النظرية 1




إذا رسمنا ارتفاعاً يمتد إلى وتر مثلث قائم الزاوية، فسيكون المثلثان المنشكلان مشابهين للمثلث الأصلي ولبعضهما البعض.

النظريات نظريات الوسط الهندسي للمثلثات قائمة الزاوية



2 **نظرية الوسط الهندسي (الارتفاع)** يفصل الارتفاع الممتد إلى وتر المثلث قائم الزاوية الوتر إلى قطعتين مستقيمتين. ويساوي طول هذا الارتفاع الوسط الهندسي بين أطوال هذين الجزأين.

المثال إذا كان \overline{CD} يمثل الارتفاع للوتر \overline{AB} بالمثلث قائم الزاوية $\triangle ABC$ ، فإن $h = \sqrt{xy}$ أو $\frac{x}{h} = \frac{h}{y}$



3 **نظرية الوسط الهندسي (الساق)** يفصل الارتفاع الممتد إلى وتر المثلث قائم الزاوية الوتر إلى قطعتين مستقيمتين. وطول أحد ساقي هذا المثلث يُمثل الوسط الهندسي بين طول الوتر والقطعة المستقيمة الموجودة على الوتر المجاور لتلك الساق.

المثال إذا كان \overline{CD} هو الارتفاع للوتر \overline{AB} بالمثلث قائم الزاوية $\triangle ABC$ فإن $\frac{c}{a} = \frac{b}{x}$ أو $\frac{c}{a} = \frac{b}{\sqrt{xc}}$
 $a = \sqrt{yc}$

Find the geometric mean between each pair of numbers.

جد الوسط الهندسي بين كل زوج من الأعداد.

20 and 25

$$x = \sqrt{20(25)} = 10\sqrt{5}$$

25 and 16


$$x = \sqrt{25(16)} = 20$$

81 and 4

$$x = \sqrt{81(4)} = 18$$

اكتب عبارة تهاثل لتوضيح المثلثات الثلاثة المتماثلة في الشكل.


Write a similarity statement identifying the three similar triangles in the figure.



$$\triangle MNO \sim \triangle MNL$$

$$\triangle MNO \sim \triangle NLO$$


$$\triangle MNL \sim \triangle NLO$$



$$\triangle WXY \sim \triangle XZY$$

$$\triangle WXY \sim \triangle WZX$$

$$\triangle XZY \sim \triangle WZX$$




$$\triangle QRS \sim \triangle QTR$$

$$\triangle QRS \sim \triangle RTS$$

$$\triangle QTR \sim \triangle RTS$$

Find x , y , and z .



$$z^2 = 4(13) = 52 \Rightarrow z = \sqrt{52} = 7.2$$

$$y^2 = 9(13) = 117 \Rightarrow y = \sqrt{117} = 10.8$$


$$z^2 = 4(9) = 36 \Rightarrow z = \sqrt{36} = 6$$

$$z^2 = (y-6)(y)$$

$$z^2 = (54.2 - 6)(54.2)$$

$$z = \sqrt{(54.2 - 6)(54.2)}$$

$$= 51.1$$



$$17^2 = 6(y-6)$$

$$289 = y - 6$$

$$\frac{289}{6} + 6 = y$$


$$54.2 = y$$

$$z^2 = 6y$$

$$z^2 = 6(54.2)$$

$$z = \sqrt{6(54.2)} = 18$$

جد z و y و x



$$z^2 = 4(6) = 24$$

$$\Rightarrow z = \sqrt{24} = 4.9$$


$$y^2 = 4(z)$$

$$\Rightarrow y = \sqrt{4(4.9)} = 4.9$$

$$z^2 = 6(10) = 60$$

$$\Rightarrow z = \sqrt{60} = 7.7$$

النظرية 4 نظرية فيثاغورس




الشرح
في مثلث قائم الزاوية، يكون مجموع مربعات أطوال ساقي المثلث مساويًا لمربع طول الوتر.

الرموز
إذا كان $\triangle ABC$ مثلثًا قائم الزاوية والزاوية القائمة به هي C . فإن $a^2 + b^2 = c^2$.

المفهوم الأساسي ثلاثيات فيثاغورس الشائعة

3, 4, 5	5, 12, 13	8, 15, 17	7, 24, 25
6, 8, 10	10, 24, 26	16, 30, 34	14, 48, 50
9, 12, 15	15, 36, 39	24, 45, 51	21, 72, 75
$3x, 4x, 5x$	$5x, 12x, 13x$	$8x, 15x, 17x$	$7x, 24x, 25x$


النظرية 5 عكس نظرية فيثاغورس



الشرح
إذا كان مجموع مربعات أطوال الضلعين الأقصر لأحد المثلثات مساويًا لمربع طول الضلع الأطول، فإن المثلث يكون قائم الزاوية.


الرموز
إذا كان $a^2 + b^2 = c^2$. فإن $\triangle ABC$ مثلث قائم الزاوية.

نظريات متباينات فيثاغورس



6
إذا كان مربع طول الضلع الأطول في أحد المثلثات أقل من مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، فإن المثلث يكون حاد الزاوية.


الرموز إذا كانت $c^2 < a^2 + b^2$. فإن $\triangle ABC$ يكون حاد الزاوية.



7
إذا كان مربع طول الضلع الأطول في أحد المثلثات أكبر من مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، فإن المثلث يكون منفرج الزاوية.

الرموز إذا كان $c^2 > a^2 + b^2$. فإن $\triangle ABC$ منفرج الزاوية.

Find x .




$$x^2 = 12^2 + 16^2$$

$$x = \sqrt{12^2 + 16^2}$$

$$= \boxed{20}$$


جد x .



$$x^2 = 15^2 - 9^2$$

$$x = \sqrt{15^2 - 9^2}$$

$$= \boxed{12}$$




$$x^2 = 5^2 - 2^2$$

$$x = \sqrt{5^2 - 2^2}$$

$$= \sqrt{21} = \boxed{4.6}$$

المثابرة استخدم ثلاثية فيثاغورس لإيجاد قيمة x . **PERSEVERANCE** Use a Pythagorean Triple to find x .




8, 15, 17

$$x \div 2 = 17$$

$$x = 17(2)$$

$$\boxed{x = 34}$$




7, 24, 25

$$\frac{x}{2} = 25$$

$$x = 2(25)$$

$$\boxed{x = 50}$$



7, 24, 25


$$\frac{x}{6} = 5$$

$$x = 6(5)$$

$$\boxed{x = 30}$$

BASKETBALL The support for a basketball net forms a right triangle as shown. What is the length x of the horizontal portion of the support?

كرة السلة الجزء الذي يدعم مرمى كرة السلة بشكل زاوية قائمة كما هو موضح. فما طول x من الطرف الأفقي من ذلك الجزء الداعم؟



$$x^2 = 1^2 - 0.45^2$$

$$x = \sqrt{1^2 - 0.45^2}$$

$$x = 0.89 \text{ m}$$

6



20. **قيادة المركبات** الشارع الذي تسلكه خديجة عادة للذهاب إلى المدرسة قيد الإنشاء. لذا، اتخذت تحويلة الطريق الموضحة. إذا بدأت منطقة الإنشاءات عند نقطة مغادرة خديجة للطريق الاعتيادي وانتهت عند نقطة دخولها مجددًا في هذا الطريق. فما مقدار المسافة الممتدة للطريق قيد الإنشاء؟

نواتج التعلم 1- استخدام خصائص المثلثات بزوايا 45° و 45° و 90° . 2- استخدام خصائص المثلثات بزوايا 30° و 60° و 90° .


نظرية 8 نظرية المثلثات بزوايا قياساتها 45° و 45° و 90°



في مثلث بزوايا قياساتها 45° و 45° و 90° . يكون الساقان l متطابقين وطول الوتر h يساوي $\sqrt{2}$ ضعف طول أحد الساقين.

الرموز في المثلث بزوايا قياساتها 45° و 45° و 90° . يكون $h = l\sqrt{2}$ و $l = l$.

نظرية 9 نظرية المثلثات بزوايا قياساتها 30° و 60° و 90°







في مثلث بزوايا قياساتها 30° و 60° و 90° . طول الوتر h يساوي ضعف طول الساق الأقصر s . وطول الساق الأطول l يساوي $\sqrt{3}$ ضعف طول الساق الأقصر.

الرموز في مثلث بزوايا قياساتها 30° و 60° و 90° . فإن $h = 2s$ و $l = s\sqrt{3}$.

في المثلث القائم الذي يتبين سببي طول الضلع المقابل للزاوية 30° يساوي نصف طول الوتر.

SENSE-MAKING Find x.

التفكير المنطقي جد x.



$\sqrt{2}$ الساق = الوتر
 $16 = x\sqrt{2}$
 $\frac{16}{\sqrt{2}} = x$
 $11.3 = x$

$\sqrt{2}$ الساق = الوتر
 $15 = l\sqrt{2}$
 $\frac{15}{\sqrt{2}} = l$
 $10.6 = l$

$\sqrt{2}$ الساق = الوتر
 $x = (17\sqrt{2})\sqrt{2}$
 $x = 34$

$\sqrt{2}$ الساق = الوتر
 $x = (18\sqrt{3})\sqrt{2}$
 $x = 18\sqrt{6}$
 $x = 44.1$

إذا كان مثلث بزوايا 45° و 45° و 90° به وتر بطول 9. فجد طول الساق l . (10.6)

If a 45° - 45° - 90° triangle has a hypotenuse length of 9. find the leg length.





$\sqrt{2}$ الساق = الوتر
 $9 = x\sqrt{2}$
 $x = \frac{9}{\sqrt{2}} \approx 6.4$

7-4 حساب المثلثات

ورقة عمل الصف العاشر

نواتج التعلم 1- إيجاد النسب المثلثية باستخدام مثلثات قائمة الزاوية. 2- استخدام النسب المثلثية لإيجاد قياسات زوايا في مثلثات قائمة الزاوية.

Sine جيب
 Cosine جيب التمام
 Tangent ظل




Sine $\theta = \frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}}$

Cosine $\theta = \frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}}$

Tangent $\theta = \frac{\text{مقابل}}{\text{مجاور}}$




TOOLS Use a calculator to find the measure of $\angle T$ to the nearest tenth.



$$\tan T = \frac{8}{12}$$

$$T = \tan^{-1}\left(\frac{8}{12}\right)$$


$$T = \boxed{33.7^\circ}$$



$$\cos T = \frac{11}{23}$$

$$T = \cos^{-1}\left(\frac{11}{23}\right)$$


$$T = \boxed{61.4^\circ}$$



$$\sin T = \frac{25}{30}$$

$$T = \sin^{-1}\left(\frac{25}{30}\right)$$

$$T = \boxed{56.4^\circ}$$




$$\tan T = \frac{4\sqrt{3}}{10\sqrt{3}}$$

$$T = \tan^{-1}\left(\frac{4\sqrt{3}}{10\sqrt{3}}\right)$$

$$T = \boxed{21.8^\circ}$$

حل كل مثلث قائم الزاوية. قرب قياسات الأضلاع إلى أقرب جزء من عشرة وقياسات الزوايا إلى أقرب درجة.




$$m\angle G = 180 - 90 - 32 = \boxed{58^\circ}$$

$$\cos 58 = \frac{11}{HG}$$

$$HG = \frac{1 \times 11}{\cos 58} = \boxed{20.8}$$

$$\sin 58 = \frac{HF}{20.8}$$

$$HF = 20.8 \sin 58 = \boxed{17.6}$$




$$m\angle W = 180 - 90 - 57 = \boxed{33^\circ}$$

$$\sin 33 = \frac{XZ}{18}$$

$$XZ = 18 \sin 33 = \boxed{9.8}$$

$$\sin 57 = \frac{XW}{18}$$

$$XW = 18 \sin 57 = \boxed{15.1}$$



$$k = \sqrt{22^2 - 8^2} = \boxed{20.5}$$

$$\cos J = \frac{8}{22}$$

$$J = \cos^{-1} \frac{8}{22} = \boxed{69^\circ}$$

$$\sin k = \frac{8}{22}$$

$$k = \sin^{-1} \frac{8}{22} = \boxed{21^\circ}$$

الاسم:

7-2 نظرية فيثاغورس وعكسها


ورقة عمل الصف العاشر

2- استخدام معكوس نظرية فيثاغورس.

1- استخدام نظرية فيثاغورس.

نواتج التعلم

النظرية 4 نظرية فيثاغورس



الشرح في مثلث قائم الزاوية، يكون مجموع مربعات أطوال ساقي المثلث مساوياً لمربع طول الوتر.

الرموز إذا كان $\triangle ABC$ مثلثاً قائم الزاوية والزاوية القائمة به هي C ، فإن $a^2 + b^2 = c^2$.

المشهور الأساسي ثلاثيات فيثاغورس الشائعة

3, 4, 5	5, 12, 13	8, 15, 17	7, 24, 25
6, 8, 10	10, 24, 26	16, 30, 34	14, 48, 50
9, 12, 15	15, 36, 39	24, 45, 51	21, 72, 75
$3x, 4x, 5x$	$5x, 12x, 13x$	$8x, 15x, 17x$	$7x, 24x, 25x$

النظرية 5 عكس نظرية فيثاغورس



الشرح إذا كان مجموع مربعات أطوال الضلعين الأقصر لأحد المثلثات مساوياً لمربع طول الضلع الأطول، فإن المثلث يكون قائم الزاوية.

الرموز إذا كان $a^2 + b^2 = c^2$ فإن $\triangle ABC$ مثلث قائم الزاوية.

نظريات نظريات متباينات فيثاغورس



6 إذا كان مربع طول الضلع الأطول في أحد المثلثات أقل من مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، فإن المثلث يكون حاد الزاوية.

الرموز إذا كانت $c^2 < a^2 + b^2$ ، فإن $\triangle ABC$ يكون حاد الزاوية.



7 إذا كان مربع طول الضلع الأطول في أحد المثلثات أكبر من مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، فإن المثلث يكون منفرج الزاوية.

الرموز إذا كان $c^2 > a^2 + b^2$ ، فإن $\triangle ABC$ منفرج الزاوية.

حدد ما إذا كانت أي مجموعة أعداد من المجموعات التالية يمكن أن تكون قياسات لأضلاع مثلث. إذا كان الأمر كذلك، فصنف المثلث على أنه حاد أو منفرج أو قائم الزاوية. علق إجابتك.

Determine whether each set of numbers can be the measures of the sides of a triangle. If so, classify the triangle as acute, obtuse, or right. Justify your answer.

15, 36, 39

$$39^2 = 15^2 + 36^2$$

$$1521 = 1521$$

لأن مربع طول الضلع الأكبر يساوي مجموع مربعي طول الضلعين الآخرين، فإن المثلث قائم الزاوية.

16, 18, 26

$$26^2 = 16^2 + 18^2$$

$$676 > 580$$

لأن مربع الضلع الأكبر أكبر من مجموع مربعي الضلعين الآخرين، فإن المثلث منفرج الزاوية.

15, 20, 24

$$24^2 = 15^2 + 20^2$$

$$576 < 625$$

لأن مربع الضلع الأكبر أصغر من مجموع مربعي الضلعين الآخرين، فإن المثلث حاد الزاوية.

10, 12, 23

$$23^2 = 10^2 + 12^2$$

$$529 > 244$$

لأن مربع الضلع الأكبر أكبر من مجموع مربعي الضلعين الآخرين، فإن المثلث منفرج الزاوية.

الهندسة الإحداثية حدد ما إذا كان $\triangle XYZ$ هو مثلث حاد أم قائم أم منفرج الزاوية بالنسبة للرؤوس المعطاة. اشرح.

COORDINATE GEOMETRY Determine whether $\triangle XYZ$ is an acute, right, or obtuse triangle for the given vertices. Explain.

$X(-3, -2), Y(-1, 0), Z(0, -1)$

$$XY = \sqrt{(-3 - (-1))^2 + (-2 - 0)^2} = 2\sqrt{2}$$

$$XZ = \sqrt{(-3 - 0)^2 + (-2 - (-1))^2} = \sqrt{10}$$

$$YZ = \sqrt{(-1 - 0)^2 + (0 - (-1))^2} = \sqrt{2}$$


$$\sqrt{10}^2 = (2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2$$

$$10 = 10$$

لأن مربع الضلع الأكبر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين، فإن المثلث قائم الزاوية عند Y .

35. البرهان اكتب فقرة إثبات للنظرية 7.5.

النظرية 7.5 عكس نظرية فيثاغورس



إذا كان مجموع مربعات أطوال الضلعين الأقصر لأحد المثلثات مساوياً لمربع طول الضلع الأطول، فإن المثلث يكون قائم الزاوية.

إذا كان $a^2 + b^2 = c^2$ ، فإن $\triangle ABC$ مثلث قائم الزاوية.



الشرح

الرموز

الإثبات: ارسم القطعة \overline{DE} على المستقيم ℓ بحيث يساوي a . وعند D ، ارسم المستقيم $\overline{DE} \perp \ell$. حدد موضع النقطة F على ℓ بحيث يكون $DF = b$. ارسم القطعة المستقيمة \overline{FE} وسم قياسها x . نظراً إلى أن المثلث $\triangle FED$ قائم الزاوية، فيكون $a^2 + b^2 = x^2$. ولكن $a^2 + b^2 = c^2$ ، إذاً $x^2 = c^2$ أو $x = c$. وهكذا، $\triangle ABC \cong \triangle FED$ حسب التطابق (ضلع-ضلع-ضلع). وهذا يعني أن $\angle C \cong \angle D$ ولذلك، يجب أن تكون الزاوية $\angle C$ قائمة، وذلك يجعل المثلث $\triangle ABC$ قائماً.

35. المعطيات: $\triangle ABC$ مثلث قياسات أضلعه a و b و c . حيث $c^2 = a^2 + b^2$

المطلوب: $\triangle ABC$ هو مثلث قائم الزاوية.




البرهان اكتب فقرة إثبات من عمودين لكل نظرية.

36. النظرية 7.6

7.6 إذا كان مربع طول الضلع الأطول في أحد المثلثات أقل من مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، فإن المثلث يكون حاد الزاوية.

الرموز إذا كانت $c^2 < a^2 + b^2$ فإن $\triangle ABC$ يكون حاد الزاوية.





الإثبات:

العبارات (المبررات)

1. في المثلث $\triangle ABC$. $c^2 < a^2 + b^2$ حيث c طول الضلع الأطول. في المثلث $\triangle PQR$. $\angle R$ زاوية قائمة. (المعطيات)
2. $a^2 + b^2 = x^2$ (نظرية فيثاغورس)
3. $c^2 < x^2$ (خاصية التعويض)
4. $c < x$ (من خواص الجذور المربعة)
5. $m\angle R = 90^\circ$ (تعريف الزاوية القائمة)
6. $m\angle C < m\angle R$ (عكس نظرية المفضلّة)
7. $m\angle C < 90^\circ$ (خاصية التعويض)
8. $\angle C$ زاوية حادة. (تعريف الزاوية الحادة)
9. $\triangle ABC$ مثلث حادّ. (تعريف المثلث الحادّ)

36. المعطيات: في المثلث $\triangle ABC$. $c^2 < a^2 + b^2$ حيث c طول الضلع الأطول. في المثلث $\triangle PQR$. $\angle R$ زاوية قائمة.


المطلوب: $\triangle ABC$ مثلث حادّ.



37. النظرية 7.7

7.7 إذا كان مربع طول الضلع الأطول في أحد المثلثات أكبر من مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، فإن المثلث يكون منفرج الزاوية.

الرموز إذا كان $c^2 > a^2 + b^2$ فإن $\triangle ABC$ منفرج الزاوية.



الإثبات:

العبارات (المبررات)

1. في المثلث $\triangle ABC$. $c^2 > a^2 + b^2$ حيث c طول الضلع الأطول. في المثلث $\triangle PQR$. $\angle R$ زاوية قائمة. (المعطيات)
2. $a^2 + b^2 = x^2$ (نظرية فيثاغورس)
3. $c^2 > x^2$ (خاصية التعويض)
4. $c > x$ (من خواص الجذور المربعة)
5. $m\angle R = 90^\circ$ (تعريف الزاوية القائمة)
6. $m\angle C > m\angle R$ (عكس نظرية المفضلّة)
7. $m\angle C > 90^\circ$ (خاصية التعويض في المساواة)
8. $\angle C$ زاوية منفرجة. (تعريف الزاوية المنفرجة)
9. $\triangle ABC$ مثلث منفرج الزاوية. (تعريف المثلث منفرج الزاوية)

37. المعطيات: في المثلث $\triangle ABC$. $c^2 > a^2 + b^2$ حيث c طول الضلع الأطول.

المطلوب: $\triangle ABC$ مثلث منفرج الزاوية.

