

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الإماراتية

* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر المتقدم اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/13>

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر المتقدم في مادة كيمياء ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/13chemistry>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر المتقدم في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/13chemistry1>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف العاشر المتقدم اضغط هنا

<https://almanahj.com/ae/grade13>

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

https://t.me/UAElinks_bot

كراسة الملاحظات التفاعلية

الصف الثاني الثانوي

قسم العلوم الطبيعية



نسخة المعلم

Glencoe Science
SCIENCE NOTEBOOK
Chemistry

الكيمياء - الصف الثاني الثانوي

كتاب الملاحظات التفاعلية
نسخة المعلم

أعد النسخة العربية: شركة العبيكان للتعليم

www.oibeikaneducation.com



English Edition Copyright © the McGraw-Hill Companies, Inc.
All rights reserved.

Arabic Edition is published by Obeikan under agreement with
The McGraw-Hill Companies, Inc. © 2008.

حقوق الطبعية الإنجليزية محفوظة لشركة ماجروهل®.

الطبعة العربية: مجموعة العبيكان للاستثمار
وفقاً لاتفاقيتها مع شركة ماجروهل® ٢٠٠٨ / م ١٤٢٩ هـ.



لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواءً أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوكوبى»، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع،
دون إذن خطى من الناشر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قائمة المحتويات

vi	إلى المعلم
viii	إرشادات لتدوين الملاحظات
الفصل 1 الإلكترونيات في الذرات	
1	الفصل 1 قبل أن تقرأ
2	1-1 الضوء وطاقة الكم
6	1-2 نظرية الكم والذرة
9	1-3 التوزيع الإلكتروني
12	الفصل 1 ملخص الفصل
الفصل 2 الجدول الدوري والتدرج في خواص العناصر	
13	الفصل 2 قبل أن تقرأ
14	2-1 تطور الجدول الدوري الحديث
18	2-2 تصنيف العناصر
21	2-3 تدرج خواص العناصر
24	الفصل 2 ملخص الفصل
الفصل 3 المركبات الأيونية والفلزات	
25	الفصل 3 قبل أن تقرأ
26	3-1 تكون الأيون
29	3-2 الروابط والمركبات الأيونية
32	3-3 صيغ المركبات الأيونية وأسماؤها
35	3-4 الروابط الفلزية وخواص الفلزات
38	الفصل 3 ملخص الفصل
الفصل 4 الروابط التساهمية	
39	الفصل 4 قبل أن تقرأ
40	4-1 الرابطة التساهمية
43	4-2 تسمية الجزيئات
46	4-3 التراكيب الجزيئية
50	4-4 أشكال الجزيئات
53	4-5 الكهروسالبية والقطبية
56	الفصل 4 ملخص الفصل

قائمة المحتويات

الفصل 5 الحسابات الكيميائية

57	قبل أن تقرأ
58	5-1 المقصود بالحسابات الكيميائية
61	5-2 الحسابات الكيميائية والمعادلات الكيميائية
66	5-3 المادة المحددة للتفاعل
69	5-4 نسبة المردود المئوية
72	الفصل 5 ملخص الفصل

الفصل 6 حالات المادة

73	قبل أن تقرأ
74	6-1 الغازات
77	6-2 قوى التجاذب
79	6-3 المواد السائلة والمواد الصلبة
84	6-4 تغيرات الحالة الفيزيائية
86	الفصل 6 ملخص الفصل

الفصل 7 الغازات

87	قبل أن تقرأ
88	7-1 قوانين الغازات
94	7-2 قانون الغاز المثالي
98	7-3 الحسابات المتعلقة بالغازات
100	الفصل 7 ملخص الفصل

الفصل 8 الهيدروكربونات

101	قبل أن تقرأ
102	8-1 مقدمة إلى الهيدروكربونات
106	8-2 الألكانات
110	8-3 الألكينات والألكاينات
113	8-4 متسلّلات الهيدروكربونات
116	8-5 الهيدروكربونات الأرomaticية
118	الفصل 8 ملخص الفصل

إلى المعلم

عزيزي معلم الكيمياء

إن أكبر التحديات التي ستواجهها مع بداية كل عام دراسي جديد، هي حث الطلاب على قراءة كتبهم الدراسية. وعادة ما تقلّق هذه الكتب الطلاب؛ مما يجعلهم أقل رغبة في القراءة، وأكثر لامبالاة بالتعلم؛ لذا فإن الهدف من هذه الكراسة مساعدتهم على استعمال كتبهم بفاعلية أكثر، وهم على أبواب تعلم علم الكيمياء.

وهذا النظام يُحسن القدرة على الفهم، إضافة إلى دوره في زيادة درجات الاختبار.

فالعمود الذي في يمين الصفحة، يُيزِّ الأفكار الرئيسية ومفردات الدرس. وهو يساعد الطلاب على إيجاد المعلومات، وتحديد المراجع في كتبهم بسهولة. كما يستطيع الطالب استعمال هذا العمود لإعداد الرسوم التي تساعدهم على تذكُّر معلومات الدرس بصرياً. أمّا العمود الذي في يسار الصفحة، فيستطيع الطالب استعماله لكتابه الملاحظات التفصيلية عن الأفكار الرئيسية ومفرداتها. وتساعدهم هذه الملاحظات في التركيز على المعلومات المهمة في الدرس. وحين يشعر الطالب بالارتياح تجاه استعمال هذا النظام، فإنه من المؤكد أنهم سيجدونه أداة مهمة تساعدهم على تنظيم المعلومات.

أهمية المنظمات التخطيطية

ثانيًا، تحتوي كراسة الملاحظات التفاعلية على كثير من المنظمات التخطيطية التي تساعد الطلاب على رؤية المعلومات المهمة بصرياً. كما تساعدهم على تلخيص المعلومات، ومن ثم تذكُّر المحتوى.

آمل - عزيزي المعلم - أن تشجّع الطلاب على استعمال المنظمات التخطيطية؛ لأنّها ستساعدهم على فهم ما يقرؤون.

تدوين الملاحظات ونجاح الطالب

ثُالثة أدلة بحثية كثيرة تتناول كيفية فهم الطلاب المفاهيم والمحتوى في المدارس. وقد طَورَت (Glencoe / McGraw Hill) كراسة الملاحظات التفاعلية لطلاب العلوم بناءً على هذه الأبحاث. وتشير الدلائل إلى أنّ الطلاب يحتاجون إلى معرفة كيفية أخذ الملاحظات، وكيفية استعمال المنظمات التخطيطية، وتعلم المفردات، وتطوير مهارات التفكير بالكتابة وصولاً إلى تحقيق التفوق الأكاديمي.

إن قدرة الطلاب على تدوين الملاحظات وتنظيمها يدلّ على مدى تقدّمهم في المدرسة؛ فقد أظهر كل من بيفريلي وبروبست وجراهام وشو (2003م) أنّ استفادة الطلاب من خلفيّتهم المعرفية وكيفية تدوينهم الملاحظات، يجعل أداءهم في الامتحانات أفضل. لقد لاحظ بوك (1974م) أنّ تدوين الملاحظات تُعدّ مهارة مهمة للنجاح في المعاهد. إذ تعمل الملاحظات عمل المستودع الخارجي لفهم، وفهم المحتوى (غانسك، 1981م). وهذا الكتاب هو أداة يستطيع الطلاب استعمالها للوصول إلى هذا النجاح. كما أودّ - عزيزي المعلم - إطلاعك على بعض مميزات كراسة الملاحظات التفاعلية قبل أن تبدأ في التعليم.

نظام كورنل لتدوين الملاحظات

أولاً، تُلاحظ أنّ كراسة الملاحظات التفاعلية تُرتّب المعلومات في عمودين؛ مما يساعد الطلاب على تنظيم أفكارهم. ونظام العمودين مبنيٌ على نظام كورنل لتدوين الملاحظات، وقد طُور هذا النظام في جامعة كورنيل على يد كلٍّ من فاير، وموريس، وليريمن (2000م).

أخيراً، تحتوي هذه الكراسة على أنواع عدّة من التمارين الكتابية وهي أداة مفيدة تساعدهم على فهم المعلومات المقدمة. كما تساعدهم على تقويم ما تعلموه. وتلاحظ - عزيزي المعلم - أن العديد من التمارين الكتابية تحتاج من الطلاب إلى التدرب على المهارات التي يمتلكها القراء الجيدين. فالقراء الجيدين هم الذين يربطون بين حياتهم والكتاب، ويتوّقعون ما سيحدث فيما سيقرؤون لاحقاً. فهم يتذرون نقاشاً حول كلٍ من: المعلومات، والمؤلف، والكتاب. ويستوضّحون عن المعلومات والأفكار، ويتبصّرون فيما يقوله الكتاب. أضف إلى ذلك، أن القراء الجيدين يلخّصون المعلومات المقدمة، ويربطونها بغيرها، ويستخلصون النتائج من الحقائق والأفكار.

لقد صُمِّمت هذه الكراسة لمساعدة الطلاب على فهم المعلومات في حصة الكيمياء. كما ستكون أداة قيمة تزودهم بالمهارات التي يستطيعون استخدامها في حياتهم العملية. مع تمنياتي لكم بعام دراسيٍّ موفقٍ.

المؤلف

دوغلاس فيشر

ثالثاً، تُلاحظ أن هناك تركيزاً على عرض المفردات، والتدرّب عليها في كلّ موضع من مواضع هذه الكراسة. وحين يعرف الطالب معاني المفردات المستخدمة في مناقشة المعلومات، تصبح قدرتهم على فهم هذه المعلومات أفضل. كما أن امتلاكهم مخزوناً جيّداً من المفردات يزيد من فرص نجاحهم في المدرسة. لقد وجد الباحثان مارتينو وهوفمان (2002م) في أثناء بحوثهما عن الطلاب المتفوقين أن قدرة الطلاب على التعلم تتحسّن عندما تكون مفرداتهم جيّدة.

تُركّز هذه الكراسة على تعليم الكلمات التي يتطلّبها فهم محتوى الكتاب المدرسي. كما أنه يُرِز المفردات الأكاديمية العامة التي يحتاج إليها الطالب ليكونوا قادرين على فهم مضمون أيّ كتاب، علمًا أن هذه الكلمات والمفردات مبنية على قائمة المفردات الأكاديمية التي طورها أفيرل كوكس هييد. وتتضمن هذه القائمة 570 كلمة، هي أكثر الكلمات شيوعاً واستخداماً في الكتب الأكاديمية، إضافة إلى 2000 كلمة أخرى شائعة في اللغة. وُتبيّن الأبحاث أن درجات الطلاب الذين يتقنون استخدام هذه القائمة من المفردات تكون ممتازة في الاختبارات المُقْنَنة.

إرشادات لتدوين الملاحظات

إن ملاحظاتك هي تذكير لما تعلّمته داخل الصف. ويساعدك تدوين الملاحظات على النجاح في فهم مادة الكيمياء. وفيما يأتي قائمة بالإرشادات التي ستتساعدك على تدوين الملاحظات الصافية بصورة أفضل:

- أسأل عن الموضوع الذي سيقوم المعلم بشرحه في الصف قبل الدخول، وراجع – ذهنياً – ما تعرفه مسبقاً عن هذا الموضوع.
- كن مستمعاً نشطاً، ورُكِّز على ما يقوله المعلم، واستمع إلى المفاهيم العامة، وانتبه جيداً للكلمات والأمثلة والرسوم التي يُركِّز عليها المعلم.
- دون ملاحظاتك على نحوٍ مرَّكَزٌ واضحٌ قدر الإمكان، علماً أن الرموز والاصطلاحات التالية تساعدك على تقصي الملاحظات وتدوينها:

رمز الاختصار	الكلمة أو التركيب	رمز الاختصار	الكلمة أو التركيب
+	و	إلخ	وغيرها
≈	تقريباً	≠	لا يساوي
≡	يُطابق	≤	أكبر من أو يساوي
Δ	تغيير	≥	أصغر من أو يساوي

- استعمل النجمة ★ أو العلامة * للدلالة على المفاهيم المهمة.
- ضع علامة سؤال (?) بجانب أي شيء ترغب في السؤال عنه.
- شارك في المناقشات الصافية، واطرح الأسئلة.
- صمم رسوماً أو صوراً قد تساعدك على استيعاب المفاهيم.
- عند حل أي مثال، اكتب بجانب كل خطوة، ما تحتاج إليه في حل المسألة، مستعملاً كلماتك الخاصة.
- راجع ملاحظاتك في أقرب وقت بعد انتهاء الدرس، ثم نظم المفاهيم الجديدة ولحصها، مستوضحاً عن الغامض منها.

محاذير تدوين الملاحظات

- لا تكتب كل كلمة كيفما شاء، بل رُكِّز على الأفكار والمفاهيم الرئيسة.
- لا تستخدم ملاحظات غيرك؛ فقد لا تكون مناسبة لك.
- لا تعبث، فذلك يُشتت ذهنك عن الإنصات بعناية للشرح.
- لا تفقد التركيز، وإلا ستفقد القدرة على تدوين الملاحظات الصحيحة.

الإلكترونات في الذرات

قبل أن تقرأ


راجع تركيب الذرة، بإكمال الجدول الآتي:

الوصف	مكونات الذرة
جسيم في النواة يحمل شحنة موجبة.	البروتون
مركز الذرة الذي يحوي البروتونات والنيوترونات.	النواة
جسيم من الذرة يحمل شحنة سلبية.	الإلكترون
جسيم عديم الشحنة يوجد في <u>النواة</u> .	النيوترون

الفصل 3

الصف الأول الثانوي

ارسم نموذجاً للذرة، ثم اكتب عليها أسماء مكوناتها.



اذكر ثلاث حقائق تتعلق بالإلكترونات.

مثال: تُعد الإلكترونات جزءاً من مكونات الذرة.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

تتضمن الإجابات المحتملة:

1. يتآلف معظم حجم الذرة من الإلكترونات.

2. كتلة الإلكترون متناهية في الصغر.

3. تعادل شحنة الإلكترونات السالبة شحنة النواة الموجبة.

الإلكترونات في الذرات

١ - ١ الضوء وطاقة الكم

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم ١ من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات الآتية:

- اقرأ عنوانين لهذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍ بارز.
- اقرأ الجداول كلّها، ثمْ أمعن النظر في الرسوم البيانية.
- انظر إلى الصور جميعها، ثمْ اقرأ التعليقات الخاصة بها.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها عن الضوء.

١. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

٢.

٣.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يأتي:

المفردات الجديدة

الإشعاع الكهرومغناطيسي

الطول الموجي

التردد

سعة الموجة

الطيف الكهرومغناطيسي

الكم

ثابت بلانك

التأثير الكهروضوئي

الفوتون

طيف الأبعاد الذري

شكل من أشكال الطاقة يُظهر السلوك الموجي في أثناء انتقاله عبر الفضاء.

أقصى مسافة بين نقطتين (قمتين، أو قاعين) متمااثلين على موجة مستمرة.

عدد الموجات التي تَعْبُر نقطة واحدة خلال الثانية.

المسافة بين الخط الأفقي لسير الموجة وارتفاع قمتها أو انخفاض قاعها.

يشتمل على أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي كلّها.

أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدتها.

قيمة تُستعمل لحساب طاقة الكم.

ظاهرة ابعاد الإلكترونات من سطح الفلز عندما يسقط عليه ضوء بتردد معين.

جسيم من الإشعاع الكهرومغناطيسي، لا كتلة له، ويحمل كمّا من الطاقة.

مجموعة من ترددات الموجات الكهرومغناطيسية المُنطلقة من ذرات العنصر.

(تابع) ١ - ١ الضوء وطاقة الكم

التفاصيل



الفكرة الرئيسية

- اكتب ثلاثة أسباب تجعل من نموذج رذرفورد الذري غير كامل من وجهة نظر العلماء.
1. لم يوضح النموذج كيفية ترتيب الإلكترونات في الفراغ حول النواة.
 2. لم يناقش سبب عدم انجذاب الإلكترونات سالبة الشحنة إلى نواة الذرة موجبة الشحنة.
 3. لم يقدم تفسيرًا لاختلاف التشابه في السلوك الكيميائي للعناصر المختلفة.

الذرة والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات

تُستعمل مع الصفحة 12

اشرح العلاقة المُبَيَّنة في الشكل أدناه، مستعملاً المصطلحات الآتية:
الطول الموجي، التردد، سعة الموجة، السرعة.



توجد علاقة تناسب عكسيّة بين الطول الموجي للموجة وترددّها. فكلما ازداد طولها الموجي

قل ترددّها. أمّا السرعة وسعة الموجة، فلا تتأثّران بطول الموجة أو التردد.

الطبيعة الموجية للضوء

تُستعمل مع الصفحات 16 – 13

(تابع) ١ - ١ الضوء وطاقة الكم

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حلّ اقرأ المثال المحلول ١ من كتابك المدرسي.

جرب ما يلي:

● المسألة

تُستعمل موجات الراديو لبث المعلومات على العديد من القنوات.

ما الطول الموجي لموجة راديو ترددتها $5.40 \times 10^{10} \text{ Hz}$

١. تحليل المسألة

المعطيات: $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$, $v = 5.40 \times 10^{10} \text{ Hz}$

المطلوب: $\lambda = ? \text{m}$

بما أنّ موجات الراديو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي، فإنّ سرعتها، وتردداتها، وطولها الموجي مرتبطة بالمعادلة $c = \lambda v$.

٢. حساب المطلوب

حلّ المعادلة التي تربط كلاً من: السرعة، والتردد، والطول الموجي لموجة كهرومغناطيسية، لإيجاد طولها الموجي (λ).

إذا كانت سرعة الضوء $c = \lambda v$ ، فإنّ

ويعوض قيمتي السرعة والتردد لموجة الراديو في المعادلة:

- تذكر أن s^{-1} ، أو $\text{Hz} = 1/\text{s}$

$$\lambda = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{5.40 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}}$$

وبإجراء عملية القسمة واختصار الوحدات، نجد أنّ:

$$\lambda = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{5.40 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}} = 0.555 \times 10^{-2} \text{ m}$$

٣. تقويم الإجابة

لقد عُبر عن الإجابة تعبيراً صحيحاً بطول الموجة بوحدة (m)، وعُبر عن كلتا القيمتين في المسألة باستعمال ٣ أرقام معنوية. كما عُبر عن الجواب بـ ٣ أرقام معنوية أيضاً.

(تابع) ١ - ١ الضوء وطاقة الكم

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

- اذكر حقيقتين فشل النموذج الموجي للضوء في تفسيرهما.
1. إطلاق الأجسام الساخنة ترددات محددة من الضوء عند درجات حرارة معينة.
 2. إطلاق بعض الفلزات إلكترونات عندما يسقط ضوء ذو لون معين وتتردد محددة على سطحها.

**الطبيعة المادية
للضوء**

تُستعمل مع الصفحات
19 – 17

صف مفهوم الكم لدى بلانك، بإكمال الجملة الآتية:

يدرك مفهوم الكم أنه يمكن للمادة أن تكتسب أو تفقد طاقة على دفعات بكمية صغيرة محددة فقط، وُسمى هذه الكمية الكم؛ وهو أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو ت فقدتها.

قارن بين معادلة أينشتاين ومعادلة بلانك، بإكمال الجمل الآتية:

تبين معادلة بلانك، $E = h\nu$ [هنتون]، ارتباط طاقة الفوتون رياضياً بتتردد الإشعاع المنبعث. أمّا معادلة أينشتاين، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ إذ تضمنت، إضافةً إلى الطبيعة الموجية للضوء، حقيقة أنّ شعاع الضوء يتكون من جزيئات متناهية الصغر تُسمى فوتونات.

طيف الانبعاث الذري

تُستعمل مع الصفحتين
21 – 20

قارن بين الطيف الكهرومغناطيسي المستمر وطيف الانبعاث الذري.

الطيف الكهرومغناطيسي هو الطيف المستمر من الألوان، الذي يتافق مع موجة الضوء المحددة أو طولها. أمّا طيف الانبعاث الذري، ويُعرف بالطيف الخطي، فإنه يتكون من طيف محدود من خطوط الألوان ذات الترددات المختلفة.

الإلكترونات في الذرات

2 - 1 نظرية الكم والذرة

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 2 من هذا الفصل، ثم اكتب ثلاثة أسئلة قد تخطر بذهنك بعد قراءة العناوين الرئيسية والتعليقات.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

3.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

المفردات الجديدة

حالة تمثل أقل طاقة ممكنة للذرة.

حالة الاستقرار

العدد الذي يعطى لكل مستوى من مستويات الإلكترون.

العدد الكمي

المعادلة التي تتوقع امتلاك الجسيمات المتحركة جميعها خواص الموجات.

معادلة دي برولي

ينص على أنه «من المستحيل معرفة سرعة جسيم ومكانه في الوقت نفسه بدقة».

مبدأ الشك لهايزنبرج

نموذج ذري يعامل الإلكترونات على أنها موجات.

النموذج الميكانيكي الكمي للذرة

منطقة ثلاثية الأبعاد للاكترون حول النواة.

المجال

العدد الذي يشير إلى الحجم النسبي وطاقة المستويات.

العدد الكمي الرئيس

مستويات الطاقة الرئيسية للذرة.

مستوى الطاقة الرئيس

المستويات الموجودة ضمن مستويات الطاقة الرئيسية.

مستوى الطاقة الثانوي

(تابع) 2 - 1 نظرية الكم والذرة

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صنف خواص كل سلسلة في طيف الهيدروجين الخطّي، والذي يتضمّن المعلومات الآتية:

1. مستوى (مستويات) الطاقة الابتدائية / مستوى (مستويات) الطاقة النهائية.
2. وصف خطوط الطيف.

نموذج بور للذرة

ُستعمل مع الصفحات

24 - 22

ليمان	باشن	بالمر
1. تنتقل الإلكترونات من المستويات ذات الطاقة العالية جمِيعها إلى مستوى الطاقة الأولى.	1. تنتقل الإلكترونات من مستويات الطاقة الرابع، والخامس، والسادس، والسابع إلى مستوى الطاقة الثالث.	1. تنتقل الإلكترونات من مستويات الطاقة الثالث، والرابع، والخامس، والسادس إلى مستوى الطاقة الثاني.
2. فوق البنفسجية	2. تحت الحمراء	2. أربعة ألوان محددة

رتب خطوات فكرة العالم دي برولي de Broglie والتي أدت إلى اشتقاء معادله، بإكمال المخطط الآتي:

يسَمح باستخدام الأرقام الصحيحة للأطوال الموجية في مدار دائري له نصف قطر ثابت.

يمتلك الضوء خواص كُلّ من الموجة والجسيم.

النموذج
الميكانيكي الكمّي
للذرة

ُستعمل مع الصفحة 25

هل يمكن لجسيمات المادة، بما فيها الإلكترونات، أن تسلك سلوك الموجات؟

إذا امتلك الإلكترون حركة الموجة وكان مقيداً بمدارات دائيرية أنصاف قطرها ثابتة، فإن الإلكترون يستطيع إشعاع موجات ذات أطوال موجية، وترددات وطاقات معينة فقط.

(تابع) 2 - 1 نظرية الكم والذرة

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

وضُحَّ كيف أثَر مبدأ هايزنبرج على العَالَم شِرودنجر لتطوير معادله الموجية.

ينص مبدأ هايزنبرج للشك على أنه من المستحيل معرفة سرعة جسيم ومكانه في الوقت نفسه

بدقة. حيث حفَز هذا المبدأ العَالَم شِرودنجر على تطوير معادلة لإيجاد الموضع المحتمل

لوجود الإلكترون وليس موقعه المحدد، إذ يُسمى الموضع المحتمل لوجود الإلكترون المستوى

الذرى.

اذكر أربع حقائق حول المجالات الذرية، بإكمال الجمل الآتية:

1. يُشير عدد الكم الرئيس إلى الحجم النسبي وطاقة المستويات الذرية.

2. تُسمى المستويات الأساسية للطاقة في الذرة مستويات الطاقة الرئيسة.

3. تحتوي مستويات الطاقة الرئيسة في الذرة على مستويات ثانوية للطاقة.

4. يزداد عدد المجالات الثانوية الطاقة في الذرة عندما تزداد قيم عدد الكم الرئيس n .

مبدأ هايزنبرج للشك

تُستعمل مع الصفحتين

27 - 26

مجالات ذرة الهيدروجين

تُستعمل مع الصفحات

30 - 28

لشخص

قارن بين نموذج بور للذرة والنماذج الميكانيكي الكمي للذرة.

لقد افترض نموذج بور حالة للذرة تُسمى حالة الاستقرار، تكون عندما يتواجد الإلكترون في أدنى مستويات طاقة رئيس ($n=1$).

واعتقد أيضًا أن الإلكترونات تتحرّك في مدارات دائرية محتملة ومحددة حول النواة، في حين اقترح النماذج الميكانيكي الكمي

للذرة وجود منطقة ثلاثة الأبعاد حول النواة تُسمى المستوى الذري، كما أخذت بالحسبان السلوك الكيميائي للذرة وتطبيقه على

ذرات العناصر الأخرى مثلما طُبِقَ على ذرة الهيدروجين؛ لذا تُعد نظرية بور الوحيدة التي فسرت طيف ذرة الهيدروجين.

الإلكترونات في الذرات

3 - 1 التوزيع الإلكتروني

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 3 من هذا الفصل، ثم أمعن النظر في العناوين الرئيسية والفرعية، والكلمات المكتوبة بخطٍ بارز، ملخصاً الأفكار الرئيسية في هذا القسم.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

ترتيب الإلكترونات في الذرة .

ينصُّ على أنَّ «الإلكترونات تشغل المستويات الأقل طاقة أولاً».

ينصُّ على أنَّ «عدد الإلكترونات المستوى الفرعي الواحد لا يزيد عن الكترونين فقط؛ إذا كان

الإلكترونان يدوران في اتجاهين متعاكسين».

تنصُّ على أنَّ «الإلكترونات المضادة المتشابهة في اتجاه الدوران يجب أن تشغل المستويات

الفرعية المتساوية الطاقة، قبل أن تشغل الإلكترونات الإضافية ذات اتجاه الدوران المعاكس

المستويات نفسها».

الكترونات مستوى الطاقة الخارجي للذرة.

تمثيل يكتب فيه رمز العنصر، الذي يمثل نواة الذرة والكترونات مستويات الطاقة الداخلية،

محااطاً بنقاط تمثل الكترونات مستوى الطاقة الخارجي للذرة جميعها.

المفردات الجديدة

التوزيع الإلكتروني

مبدأ أو فlaw

مبدأ باولي

قاعدة هوند

إلكترونات التكافؤ

الممثل النقطي للإلكترونات

(تابع) 3 - 1 التوزيع الإلكتروني

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

نظم المعلومات المتعلقة بالتوزيع الإلكتروني، يأكمال الخلاصة الآتية:
التوزيع الإلكتروني هو ترتيب الإلكترونات في الذرة.

- I. التوزيع الإلكتروني في الحالة المستقرة.
A. هناك ثلات قواعد تحكم كيفية توزيع الإلكترونات في مجالات الذرة:

1. مبدأ أوفباو.

2. مبدأ باولي.

3. قاعدة هوند.

التوزيع الإلكتروني في الحالة المستقرة

ٌستعمل مع الصفحتين
33 - 32

B. هناك نموذجان لتمثيل التوزيع الإلكتروني للذرة:

1. رسم مربعات المجالات.

a. مربعات فارغة تمثل مستويات طاقة فارغة.

b. مربع يحوي سهمًا متوجهًا إلى أعلى، يمثل مستوى طاقة فرعى يحتوى على إلكترون واحد.

c. مربع يحوي سهرين إلى أعلى وأسفل، يمثل مستوى طاقة فرعى يحتوى على إلكترونيين.

d. كل مربع يمثل عدد الكم الرئيس و المجالات الطاقة الثانوية المرتبطة بالمجال.

2. الترميز الإلكتروني:

تحدد هذه الطريقة مجال الطاقة الرئيس، ومجال الطاقة الثانوي، المرتبطين بكل مجال من مجالات الذرة. كما تشمل رقمًا سفليًّا يدل على عدد الإلكترونات في المجال.

رسم مربعات المجالات والترميز الإلكتروني

ٌستعمل مع الصفحة 34

C. إلكترونات التكافؤ وحدتها تحدد الخواص الكيميائية للعنصر.

1. يتالف التمثيل النقطي للإلكترونات من رمز العنصر الذي يمثل نواة الذرة والإلكترونات مجالات الطاقة الداخلية، محاطًا بنقاط تمثل إلكترونات المجال الخارجي للذرة جميعها.

إلكترونات التكافؤ

ٌستعمل مع الصفحة 37

(تابع) 3 - 1 التوزيع الإلكتروني

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حل اقرأ المثال المحلول 3-1 من كتابك المدرسي.
جرب ما يلي:

● المسألة

يُستخدم عنصر الروثينيوم (Ru) في تحضير سبائك البلاatin. ما التوزيع الإلكتروني للعنصر في حالة الاستقرار؟

1. تحليل المسألة

المعطيات: عنصر الروثينيوم.

المطلوب: التوزيع الإلكتروني للعنصر في حالة الاستقرار.

حدّد عدد الإلكترونات الإضافية التي تمتلكها ذرة الروثينيوم، والتي تزيد عن أقرب غاز نبيل، ثم اكتب توزيعها الإلكتروني.

2. حساب المطلوب

باستعمال الجدول الدوري، نجد أن العدد الذري لعنصر الروثينيوم هو **44**. وعليه، تمتلك ذرة الروثينيوم **44** إلكترونًا. أما الغاز النبيل الذي يسبقه، فهو الكربتون (Kr)، وعدد ذرته 36.

استعمل ترميز الغاز النبيل الكربتون **[Kr]**، الذي يمثل أول 36 إلكترونًا من الروثينيوم.

تمامًا أول 36 إلكترونًا المستويات الفرعية ($1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4d, 4p$)، وبذلك يتبقى **8** إلكترونات من عنصر الروثينيوم الواجب توزيعها؛ لذا فإن إلكترونات **[8]** المتبقية ستتمامًا المستويين **$5s$** و **$4d$** .

وباستعمال العدد الأقصى من الإلكترونات التي تدخل كل مستوى، سنجد أن التوزيع الإلكتروني لعنصر الروثينيوم هو **$[Kr]5s^24d^3$** .

3. تقويم الإجابة

لقد حدد مكان إلكترونًا الموجودة في ذرة الروثينيوم، واستعمل ترميز الغاز النبيل **[Kr]** الذي يسبقه. كما أن ترتيب تبعية المستويات **للدورة 5** صحيحة.

التمثيل النقطي
للحالات

تُستعمل مع المثال المحلول
صفحة 38، 1-3

ملخص الفصل

الإلكترونات في الذرات

بعد قراءتك لهذا الفصل، لاحظ ما قرأت، ثم اكتب المعادلين الرئيسيين وال العلاقة بينهما.

إجابات متحمّلة :

$$c = \lambda v ; \text{ سرعة الضوء تساوي حاصل ضرب الطول الموجي } (\lambda) \text{ في التردد } (v).$$

$$E_{\text{فوتون}} = hv \\ h = mv$$

العلاقات الرئيسية :

الطول الموجي / التردد

الطبيعة الموجية للضوء / الطبيعة المادية للضوء

نموذج بور للذرة / النموذج الميكانيكي الكمي للذرة

استعن بما يلي لمساعدتك على المراجعة:

- اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخصك.
- ادرس المفردات، والتعريفات العلمية.
- راجع الواجبات المنزلية اليومية.
- راجع الجداول، والرسوم البيانية، ووسائل الإيضاح.
- راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كلّ قسم من الفصل.
- ألق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية الفصل.
- راجع أسئلة مراجعة الفصل الموجودة في نهاية الفصل.

مراجعة

الربط مع واقع الحياة

اشرح كيف أثرَ تطورُ فهمنا للذرة في حياتنا اليومية.

أقبل الإجابات المعقولة جميعها. إجابة محتملة : لقد كان تأثير ذلك واضحًا، حيث تمثل في الاستخدامات الطبية، مثل جراحة الليزر،

والเทคโนโลยيا الصناعية، والتصوير الشعاعي، وهواتف الجوال، وحزم التل vaz والراديو، وغيرها.

الجدول الدوري والتدرج في خواص العناصر

قبل أن تقرأ

عِرْف المصطلحات التالية:

مراجعة المفردات

أصغر جزء من العنصر يحمل صفاته.

الذرة

ترتيب الإلكترونات في الذرة.

التوزيع الإلكتروني

إلكترونات المستوى الخارجي للذرة.

إلكترونات التكافؤ

تمثيل يُكتب فيه رمز العنصر، الذي يُمثل نواة الذرة وإلكترونات مستويات الطاقة الداخلية،

المُمثّل النقطي للإلكترونات

محاذاً بنقاط تمثل إلكترونات المستوى الخارجي للذرة جميعها.

ميّز بين الجسيمات المكوّنة للذرة من حيث الشحنة النسبية.

الفصل 3

الجسيم	الشحنة الكهربائية
البروتون	موجبة
الإلكترون	سالبة
النيوترون	متعدلة

الصف الأول الثانوي

صف كيفية توزيع الجسيمات المكوّنة للذرة.

توجد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة، والتي تشكّل المركز. أمّا الإلكترونات، فتتوزّع

في الفراغ الموجود حول النواة.

الجدول الدوري والدرج في خواص العناصر

1 - 2 تطور الجدول الدوري الحديث

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 1 من هذا الفصل، مركزاً على العناوين، والكلمات المكتوبة بخطٍّ بارزٍ، والأشكال، والتعليقات، ثم اكتب حقيقتين اكتشفهما حول الجدول الدوري.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

تكرار الخواص الفيزيائية والكميائية للعناصر عند ترتيبها تصاعدياً وفق أعدادها الذرية.

أعمدة رأسية رُتّب فيها العناصر وفق تزايد أعدادها الذرية في الجدول الدوري.

صفوف أفقية رُتّب فيها العناصر وفق تزايد أعدادها الذرية في الجدول الدوري.

عناصر المجموعات 1، و2، و18 - 13 من الجدول الدوري.

عناصر المجموعات 12 - 3 من الجدول الدوري.

واحدة من ثلاثة تصنيفات للعناصر في الجدول الدوري.

عناصر المجموعة 1 (باستثناء الهيدروجين).

عناصر المجموعة 2.

عناصر المجموعات 12 - 3 (باستثناء عناصر مجموعتي اللانثانيديات والأكتينيدات).

عناصر مجموعتي اللانثانيديات والأكتينيدات.

أحدى مجموعتي الفلزات الانتقالية الداخلية، تقع أسفل الجدول الدوري.

أحدى مجموعتي الفلزات الانتقالية الداخلية، تقع أسفل الجدول الدوري.

غازات أو مواد صلبة هشة ذات لون داكن، تُعدَّ رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء.

عناصر شديدة التفاعل توجد في المجموعة 17.

عناصر المجموعة 18 الخامدة جداً.

عناصر لها خواص فيزيائية مشابهة للفلزات واللافلزات معاً.

المفردات الجديدة

الدرج في الخواص

المجموعات

الدورات

العناصر المُمثّلة

العناصر الانتقالية

الفلزات

الفلزات القلوية

الفلزات القلوية الأرضية

الفلزات الانتقالية

الفلزات الانتقالية الداخلية

سلسلة اللانثانيديات

سلسلة الأكتينيدات

اللافلزات

الهالوجينات

الغازات النبيلة

أشبه الفلزات

(تابع) 1 - 2 تطور الجدول الدوري الحديث

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

- رتب الحوادث التي ساعدت على تطور الجدول الدوري فيما يلي:
- في عام 1790م، أعد لافوازييه قائمة من 33 عنصراً معروفاً.
 - في عام 1864م، رتب جون نيولاندز العناصر وفق ازدياد كتلها الذرية. وقد لاحظ أن خواص هذه العناصر تتكرر عند العنصر الثامن.
 - في عام 1869م، رتب منديف العناصر في مجموعات، لها خواص متشابهة وفق ازدياد كتلها الذرية. وقد ترك أماكن شاغرة في الجدول للعناصر غير المكتشفة.
 - في عام 1913م، اكتشف موزلي أن لكل عنصر عدداً من البروتونات يساوي عدده الذري. وقد رتب العناصر وفق ازدياد أعدادها الذرية بدلاً من كتلها الذرية.

حدد مكان كلٍّ من مجموعات العناصر الآتية في الجدول الدوري أدناه:

الهالوجينات	اللافزات	الفلزات القلوية
الفلزات الانتقالية	العناصر المُمثلة	الفلزات القلوية الأرضية
الغازات النبيلة	الغازات الانتقالية	العناصر الانتقالية الداخلية

ملحوظة استعمل أقلاماً ملونة، مستعيناً بدليل الألوان.
يجب أن تكون إجابات الطالب مشابهة للشكل 5-2 الوارد في الكتاب المدرسي.

تطور الجدول الدوري

ستعمل مع الصفحات
52 - 50

الجدول الدوري
الحديث

ستعمل مع الصفحات
55 - 52



(تابع) 1 - 2 تطور الجدول الدوري الحديث


التفاصيل

الفكرة الرئيسية

نظم المعلومات الخاصة بالجدول الدوري، بإكمال خريطة المفاهيم في أدناه.

يشتمل الجدول الدوري على 7 صفوف أفقية تُسمى دورات،

وعلى 18 عموداً تُسمى مجموعات أو عائلات.



(تابع) 1 - 2 تطور الجدول الدوري الحديث

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حدد المعلومات الموجودة على مربع العنصر في الجدول الدوري.

1. اسم العنصر.


2. الرمز.

3. العدد الذري.

4. متوسط الكتلة الذرية.

5. حالة المادة.

قارن بين ألوان المربعات في الجدول الدوري في الشكل 5-2 صفحة 54، ثم صنف العناصر الموجودة في هذه المربعات.



الربط مع واقع الحياة

استناداً إلى ما قرأت، صِفْ كيْف تُعدّ معرفة الجدول الدوري مُهَمَّة في ثلاثة من مجالات العمل.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

إجابة محتملة: يَسْتَعْمِلُ الْكِيْمِيَائِيُونَ الْجَدْوَلَ الدُّورِيَّ فِي تَوْقُّعِ سُلُوكِ الْعَنَاصِرِ.

أَمَّا الْمُهَنْدِسُونُ، فَيَسْتَعْمِلُونَهُ فِي تَصْنِيعِ موادٍ تُسْتَخَدَمُ فِي التَّطَبِيقَاتِ دَاتِ التَّقْنِيَّةِ الْعَالِيَّةِ.

وَيَسْتَعْمِلُهُ الْعُلَمَاءُ فِي تَوْقُّعِ سُلُوكِ الْذَّرَاتِ فِي أَثْنَاءِ التَّجَارِبِ الْمُخْبَرِيَّةِ،

فِي حِينَ يَسْتَعْمِلُهُ مَعْلُومُ الْكِيْمِيَاءُ فِي تَعْلِيمِ الطَّلَابِ مَادَةِ الْكِيْمِيَاءِ.

الجدول الدوري والدرج في خواص العناصر

2 - 2 تصنیف العناصر

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 2 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات الآتية:

- اقرأ عناوين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍ بارز.
- اقرأ الجداول كلّها، ثمْ أمعن النظر في الرسوم البيانية.
- انظر إلى الصور جميعها، ثمْ اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذكّر ما تعرفه حول أشكال الذرات وترتيبها في المركبات التساهمية.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها حول العلاقة بين الإلكترونات وموضع العنصر في الجدول الدوري.

1. قبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

3.

عُرف ما يلي:

المفردات الأكاديمية

شيء ما يتكون من عناصر أو أجزاء متراقبطة قد تكون بأعداد كبيرة أو صغيرة متراقبطة.

البنية

(تابع) 2 - 2 ترتيب العناصر

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

نظم المعلومات المتعلقة بالتوزيع الإلكتروني، بإكمال الملخص الآتي:

I. الإلكترونيات.

A. إلكترونات التكافؤ.

1. إلكترونات أعلى مستوى طاقة رئيس في الذرة.

2. ذرات المجموعة نفسها تمتلك العدد نفسه من إلكترونات التكافؤ.

B. إلكترونات التكافؤ، والدورات.

1. يدل مستوى الطاقة الذي يحوي إلكترونات التكافؤ على رقم الدورة التي يوجد فيها العنصر.

a. توجد العناصر التي تتواجد الكترونات تكافؤها في مستوى الطاقة الثاني في الدورة الثانية.

b. توجد العناصر التي تحتوي على إلكترونات تكافؤها في مستوى الطاقة الرابع في الدورة الرابعة.

c. إلكترونات التكافؤ، ورقم المجموعة.

1. العناصر المُمثّلة.

a. تحتوي عناصر المجموعة 1 جميعها على إلكترون تكافؤ واحد.

b. تحتوي عناصر المجموعة 2 جميعها على إلكتروني تكافؤ.

c. تحتوي عناصر المجموعة 13 جميعها على ثلاثة إلكترونات تكافؤ. وتحتوي عناصر المجموعة 14 جميعها على أربعة إلكترونات تكافؤ، وهكذا دواليك.

2. يُعد وجود الهيليوم في المجموعة 18 استثناءً.

صف العلاقة بين عدد إلكترونات التكافؤ والخواص الكيميائية للذرات.

تمتلك ذرات عناصر المجموعة الواحدة خواص كيميائية متشابهة؛ لأنَّ عناصرها جميعاً العدد نفسه من إلكترونات التكافؤ.

(تابع) 2 - 2 تصنیف العناصر

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

ميّز بين عناصر الفئات f, p, d, s ، بإكمال الجدول الآتي :

نوع العناصر التي تحتويها	المستويات	مجموعات الجدول الدوري	الفئة
العناصر الممثّلة	s	2، 1	الفئة s
العناصر الممثّلة	p	13 – 18	الفئة p
الفلزات الانتقالية	d, s	3 – 12	الفئة d
الفلزات الانتقالية الداخلية	5f, 4f, s	سلسلتا الlanthanides والأكتنides	الفئة f

عناصر الفئات

s, p, d, f

تُستعمل مع الصفحات
61 – 59

التوزيع الإلكتروني
والجدول الدوري

تُستعمل مع المثال المحلول
2-1، صفحة 62

لخُص بعد قراءة المثال المحلول 1-2 في كتاب المدرسي، املأ الفراغات الآتية لمساعدتك على تدوين الملاحظات.

• المسألة -----

دون استخدام الجدول الدوري، حدد كلاً من: المجموعة، الدورة، والفئة التي يوجد فيها عنصر الإسترانيوم.

1. تحليل المسألة

المطلوب:

المعطيات:

الموضع في الجدول الدوري

$[Kr]5s^2$

استعمل التوزيع الإلكتروني لعنصر الإسترانيوم لتحديد موقعه.

2. حساب المطلوب

المجموعة : يمتلك الإسترانيوم توزيعاً لإلكترونات تكافئه يتّهي بـ s^2 ؛ لذا يوجد في المجموعة 2، والتي تمتاز عناصرها جميعاً بالتوزيع الإلكتروني s^2 .

الدورة : أمّا الرقم 5 في $5s^2$ ، فيشير إلى وجود الإسترانيوم في الدورة الخامسة.

الفئة : ويدلّ s^2 على أن إلكترونات تكافؤ الإسترانيوم تملأ مستويات s الثانية؛ لذا يوجد ضمن الفئة s.

3. تقويم الإجابة

لقد رُبّطت العلاقة بين التوزيع الإلكتروني للعنصر، وموقعه في الجدول الدوري على نحوٍ صحيح.

• -----

الجدول الدوري والدرج في خواص العناصر

3 - 2 تدرج خواص العناصر

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 3 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات الآتية:

- اقرأ عناوين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍ بارز.
- اقرأ الجداول كلّها، ثمْ أمعن النظر في الرسوم البيانية.
- انظر إلى الصور جميعها، ثمْ اقرأ التعليقات الخاصة بها.

اكتب ثلات حقائق اكتشفتها حول تدرج خواص العناصر.

1. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

3.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

ذرة أو مجموعة ذرات مرتبطة لها شحنة موجبة أو سالبة.

الطاقة اللازمة لارتفاع الكترون من ذرة عنصر في الحالة الغازية.

تنصُّ على أنَّ الذرة تكتسب الإلكترونات، أو تفقدها، أو تشارك بها؛ لتحصل على ثمانية

الكترونات تكافؤ في مستوى طاقتها الأخير.

القدرة النسبية للذرات على جذب الإلكترونات في الرابطة الكيميائية.

المفردات الجديدة

الأيون

طاقة التأين

قاعدة الثمانية

الكهروساالية

(تابع) 3- تدرج خواص العناصر

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صف كيف يتم تحديد الحجم الذري؟

يحدد حجم الذرة بالمسافة التي تفصلها عن الذرات المجاورة لها. وبما أن طبيعة الذرات

المجاورة تختلف فيما بينها، فإن حجم الذرة نفسها يختلف إلى حد ما.

نصف قطر الذرة

تُستعمل مع الصفتين

64-63

حلل كيف تدرج الخواص في العناصر التي تراها في الشكل 11 - 2 صفحة 64 في كتاب المدرسي، موضحاً كيفية ارتباطها بالكتلة الذرية.

تناقص أنصاف قطرات الذرات عند الانتقال من اليسار إلى اليمين عبر الدورة، حيث تزداد الكتل

الذرية في الاتجاه نفسه. في حين تزداد أنصاف قطرات الذرات عند الانتقال من أعلى إلى أسفل

عبر المجموعة، حيث تزداد الكتل الذرية في الاتجاه نفسه أيضاً.

لخص بعد قراءة المثال المحلول 2-2 في كتاب المدرسي، أملاً الفراغات الآتية لمساعدتك على تدوين الملاحظات.

● **المسألة** -----

أيّ من الذرات الآتية لها أكبر نصف قطر ذري: الكربون C، أم الفلور F، أم البيريليوم Be، أم الليثيوم Li؟ فسر إجابتك في ضوء نمط التغيير في أنصاف قطرات الذرات.

1. تحليل المسألة

المعطيات: المعلومات المتوفّرة حول هذه العناصر في الجدول الدوري.

المطلوب: العنصر الذي يمتلك أكبر نصف قطر ذري.

2. حساب المطلوب

استعمل الجدول الدوري لتحديد ما إذا كانت العناصر تقع في المجموعة أو الدورة نفسها. العناصر جميعها في الدورة 2. رتب العناصر من اليسار إلى اليمين عبر الدورة (Li,Be,C,F). واستناداً إلى نمط تغير أنصاف قطرات الذرات، حدد الذرة التي تمتلك أكبر نصف قطر ذري. وبما أن الليثيوم هو الأول في الدورة، فإنه يمتلك أكبر نصف قطر ذري.

3. تقويم الإجابة

لقد طبق تدرج الخواص عبر الدورات في أنصاف قطرات الذرات على نحوٍ صحيح.

فسر التدرج في نصف قطر الذرة

تُستعمل مع المثال المحلول 2-2، صفحة 64

(تابع) 3 - 2 تدرج خواص العناصر

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صف الحجم الذري والتغير الأيوني، بإكمال الجدول الآتي:

حجم الذرة	شحنة الأيون	التغير الأيوني
يقل	تصبح موجبة الشحنة	تُفقد الذرة إلكترونات
يزداد	تصبح سالبة الشحنة	تكتسب الذرة إلكترونات

نصف قطر الأيون

تُستعمل مع الصفحتين 67-66

حدَّد سببين لنقصان حجم الذرة النسبي عند فقدانها إلكترونات.

1. يمكن أن تُفقد الذرة إلكترونات تكافتها، فيصبح مستوى طاقتها الخارجية فارغاً.

2. تقل قوة التنافر الكهروستاتيكية بين إلكترونات المتبقية، ومن ثم تُجذب نحو النواة إلى الداخل.

فسر سبب ازدياد حجم الذرة في حال اكتسابها إلكترونات.

إضافة إلكترونات إلى الذرة، يزيد من قوة التنافر الكهروستاتيكية؛ الأمر الذي يدفع إلكترونات إلى الابتعاد بعضها عن بعض.

طاقة التأين

تُستعمل مع الصفحتين 67-69

صف أنماط التغير في طاقة التأين في الجدول الدوري، بإكمال الفقرة الآتية:

تزداد طاقة التأين عند الانتقال من اليسار إلى اليمين عبر الدورة؛ بسبب ازدياد شحنة النواة التي تزيد من قوة جذبها لإلكترونات التكافؤ. وتقل طاقة التأين عادة عند الانتقال من أعلى إلى أسفل عبر المجموعة؛ بسبب نقصان الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترونات التكافؤ، الناجم عن ازدياد بعدها عن النواة.

تنص قاعدة الثمانية على أن الذرات تكتسب إلكترونات، أو تُفقدوها، أو تشارك بها؛ لتحصل على ثمانية إلكترونات تكافؤ في مجال طاقتها الأخير. أما عناصر الدورة الأولى، فتعد استثناءً من القاعدة.

توقع أيِّ أجزاء الجدول الدوري تكون قيمة الكهروسالبية فيه الأكبر؟ استعن بالشكل 18-2 الموجود في كتابك المدرسي.

الجزء العلوي الأيمن من الجدول الدوري.

الكهروسالبية

تُستعمل مع الصفحة 70

الجدول الدوري والدرج في خواص العناصر

ملخص الفصل

بعد قراءتك لهذا الفصل، لخّص ما قرأت، ثم اكتب ثلات حقائق حول الجدول الدوري والدرج في خواص العناصر.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

استعن بما يلي لمساعدتك على المراجعة:

- اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخصك.
- ادرس المفردات، والتعريفات العلمية.
- راجع الواجبات المنزلية اليومية.
- راجع الجداول، والرسوم البيانية، ووسائل الإيضاح.
- راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كلّ قسم من الفصل.
- ألق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية الفصل.
- راجع أسئلة مراجعة الفصل الموجودة في نهاية الفصل.

مراجعة

الربط مع واقع الحياة

اشرح كيف يساعدك فهم الجدول الدوري على اكتساب الثقة في النفس عند دراسة الكيمياء.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

المرّكبات الأيونية والفلزات

قبل أن تقرأ

عرف المصطلحات التالية:

مراجعة المفردات

ذرة أو مجموعة ذرات مرتبطة لها شحنة موجبة أو سلبية.

الأيون

الطاقة الالزامية لانفراز إلكترون من ذرة العنصر في الحالة الغازية. وتزداد هذه الطاقة عادة

طاقة التأين

عند الانتقال من اليسار إلى اليمين عبر الدورة، وتقل عند الانتقال من أعلى إلى أسفل عبر

المجموعة.

الغازات النبيلة

إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي؛ وتحدد الخواص الكيميائية للعنصر.

إلكترونات التكافؤ

رسم التمثيل النقطي لإلكترونات العناصر الآتية:

الفصل 1

Al	الألومنيوم
Ca	الكالسيوم
As	الزرنيخ
Te	التيليريوم
Xe	الزينون

المركبات الأيونية والفلزات

1 - 3 تكوّن الأيون

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 1 من هذا الفصل، ثم أمعن النظر في العناوين الرئيسة والفرعية، ومن ثم اكتب ثلاثة مفاهيم تعتقد أنها ستُناقَش في هذا القسم.

1. قبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يأتي:

القوة التي تربط ذرتين معاً.

أيون موجب الشحنة؛ يتكون عندما تفقد الذرة إلكترونًا واحدًا أو أكثر.

أيون سالب الشحنة؛ يتكون عندما تكتسب الذرة إلكترونًا واحدًا أو أكثر.

المفردات الجديدة

الرابطة الكيميائية

الكاتيون


الأيون

(تابع) 1 - 3 تكوّن الأيون

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

نظم المعلومات المتعلقة بتكوين الروابط الكيميائية، بإكمال خريطة المفاهيم في أدناه:



الكترونات التكافؤ والروابط الكيميائية

ُستعمل مع الصفحات
86-84

اكتب التوزيع الإلكتروني للأيون الأكثر شيوعاً، والشحنة المفقودة أو المكتسبة لكلٍّ من الذرات الآتية، ثم بين الشحنة الكلية للأيون؛ سواء أكانت سالبة أم موجبة.



الشحنة الكلية للأيون = + (موجبة)



الشحنة الكلية للأيون = -2 (سالبة)



الشحنة الكلية للأيون = 3 + (موجبة)



الشحنة الكلية للأيون = -1 - (سالبة)



الشحنة الكلية للأيون = 1 + (موجبة)



الشحنة الكلية للأيون = 3 + (موجبة)



(تابع) ١ - ٣ تكوّن الأيون

الفكرة الرئيسية

التفاصيل

رتب عناصر المجموعة 1 تصاعدياً وفق ازدياد طاقة تأينها، ثم رتب عناصر المجموعة 2 تصاعدياً وفق ازدياد ميلها الإلكتروني.

المجموعة 2

$P \rightarrow P^{3-}$	<u>3</u>
$O \rightarrow O^{2-}$	<u>2</u>
$Xe \rightarrow Xe^-$	<u>6</u>
$S \rightarrow S^{2-}$	<u>4</u>
$I \rightarrow I^-$	<u>5</u>
$F \rightarrow F^-$	<u>1</u>

المجموعة 1

$K \rightarrow K^+$	<u>2</u>
$Ne \rightarrow Ne^+$	<u>6</u>
$P \rightarrow P^{5+}$	<u>5</u>
$Fe \rightarrow Fe^{2+}$	<u>3</u>
$Rb \rightarrow Rb^+$	<u>1</u>
$Mg \rightarrow Mg^{2+}$	<u>4</u>

حدد الأيونات الآتية:

<u>الفضة</u>	Ag^+
<u>الليثيوم</u>	Li^+
<u>البروميد</u>	Br^-
<u>الكالسيوم</u>	Ca^{2+}
<u>الكبريتيد</u>	S^{2-}
<u>البورون</u>	B^{3+}
<u>الزرنيخيد</u>	As^{3-}
<u>الهيدريد</u>	H^-
<u>الكاديوم</u>	Cd^{2+}
<u>السيلنيد</u>	Se^{2-}

المرّكبات الأيونية والفلزات

2 - 3 الروابط والمرّكبات الأيونية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 2 من هذا الفصل، ثم اكتب ثلاثة أسئلة قد تخطر بذهنك بعد قراءة العناوين الرئيسية والتعليقات.

1. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يأتي:

قوّة التجاذب الكهروستاتيكي التي تمسك الجسيمات ذات الشحنات المختلفة معًا في المرّكبات الأيونية.

المفردات الجديدة

الرابطة الأيونية

المرّكبات التي تحتوي على روابط أيونية.

المرّكبات الأيونية

ترتيب هندسي للجسيمات ثلاثي الأبعاد.

الشبكة البلورية

مرّكب يوصل محلوله أو مصهوره التيار الكهربائي.

الإلكتروليت

الطاقة اللازمة لفصل أيونات 1 mol من المرّكب الأيوني.

طاقة الشبكة البلورية

(تابع) 2 - 3 الروابط والمركبات الأيونية

الفكرة الرئيسية	التفاصيل		
تكوين الرابطة الأيونية	<p>حل اقرأ الصفحات 88-90 من كتاب المدرسي.</p> <p>جرب ما يلي:</p> <p>المسألة</p> <p>وُضِّح كيفية تكوين مركب أيوني من عنصري البورون والسيلينيوم.</p>		
٩٠-٨٨	<p>٩٠-٨٨</p> <p>١. تحليل المسالة</p> <p>المعطيات: التوزيع الإلكتروني للعناصر المعطاة</p> $\text{B} \rightarrow [\text{He}] 2s^2 2p^1$ $\text{Se} \rightarrow [\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^4$ <p>المطلوب: عدد إلكترونات التكافؤ لكل ذرة متعادلة.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding-bottom: 10px; vertical-align: bottom;"> $\text{B} \rightarrow \frac{\text{إلكترونات تكافؤ}}{3}$ </td> <td style="width: 50%; padding-bottom: 10px; vertical-align: bottom;"> $\text{Se} \rightarrow \frac{\text{إلكترونات تكافؤ}}{6}$ </td> </tr> </table> <p>٢. حساب المطلوب</p> <p>حدّد عدد الإلكترونات التي يجب أن تفقدتها ذرة البورون، وعدد الإلكترونات التي يجب أن تكسبها ذرة السيلينيوم؛ ليصبح لكلّ منها توزيع إلكتروني مشابه لتوزيع الغاز النبيل.</p> <p>يحصل البورون B على التوزيع الإلكتروني [He] عندما يفقد 3 إلكترونات.</p> <p>يحصل السيلينيوم Se على التوزيع الإلكتروني [Kr] عندما يكسب 6 إلكترونات.</p> <p>حدّد عدد ذرات البورون والسيلينيوم التي يجب توافرها؛ حتى يتساوى عدد الإلكترونات المكتسبة والمفقودة.</p> <p>يُعد العدد 6 أصغر عدد يقبل القسمة على مقدار شحنات الأيونات 2، و3؛ لذا فإنّ ذرتين بورون B ستعطى ستة إلكترونات، تكسبها ثلاث ذرات سيلينيوم Se لتكوين العدد المناسب من الأيونات المستقرة.</p> <p>٣. تقويم الإجابة</p> <p>إن محصلة الشحنة الكهربائية الكلية في وحدة صيغة واحدة من هذا المركب تساوي صفرًا.</p> $= \left(\frac{2}{\text{أيونات البورن}} \right)^{-2} + \left(\frac{3}{\text{أيون البورن}} \right)^{+3} = 0$	$\text{B} \rightarrow \frac{\text{إلكترونات تكافؤ}}{3}$	$\text{Se} \rightarrow \frac{\text{إلكترونات تكافؤ}}{6}$
$\text{B} \rightarrow \frac{\text{إلكترونات تكافؤ}}{3}$	$\text{Se} \rightarrow \frac{\text{إلكترونات تكافؤ}}{6}$		

(تابع) 2 - 3 الروابط والمركبات الأيونية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حلل العلاقة بين طاقة الشبكة البلورية لمركب أيوني، وقوى التجاذب بين أيونات المركب.

طاقة الشبكة البلورية مقدار الطاقة اللازمة لفصل 1 mol من أيونات المركب الأيوني لذا:

كلما كانت قوى التجاذب أكبر، كانت طاقة الشبكة البلورية أكبر، وتكون ذات إشارة سالبة.

صف العلاقة بين حجم الأيونات في المركب الأيوني وطاقة الشبكة البلورية له.

كلما صغر حجم الأيون، ازداد جذب التوازن للكترونات التكافؤ، وبالتالي ازدادت قوة التجاذب بين

الأيونات؛ مما يجعل طاقة الشبكة البلورية أكبر، وتكون ذات إشارة سالبة.

خواص المركبات الأيونية

ستعمل مع الصفحات 95 – 90

وضح العلاقة بين طاقة الشبكة البلورية وشحنة الأيون.

كلما ازدادت شحنة الأيون الموجبة أو السالبة، ازدادت طاقة الشبكة البلورية، وتكون ذات إشارة

سالبة.

رتّب المركبات الأيونية الآتية تصاعدياً؛ من أقلّها قيمة سالبة إلى أكبرها قيمة سالبة وفق طاقة الشبكة البلورية.

LiCl	5
BeS	8
LiBr	4
BeO	9
BeCl ₂	7
RbBr	3
CsI	1
SrCl ₂	6
CsBr	2

المرّكبات الأيونية والفلزات

3 - 3 صيغ المرّكبات الأيونية وأسماؤها

التفاصيل

الفكرة الرئيسة

تصفح القسم 3 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات الآتية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ بارزٍ.
- اقرأ الجداول كلّها، ثمّ أمعن النظر في الرسوم البيانية.
- انظر إلى الصور جميعها، ثمّ اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- راجع الأمثلة محلولة، ملاحظاً الهدف منها.
- تذّكر ما تعرّفه حول طرائق تكوين الأيونات والمرّكبات الأيونية، وصيغها وتسميتها.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها حول أسماء المرّكبات الأيونية، وصيغها.

1. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يأتي:

تمثّل أبسط نسبة للأيونات في المرّكب الأيوني.

أيون يتكون من ذرة عنصر واحدة مشحونة.

شحنة الأيون الأحادي الذرة.

أيون يتكون من أكثر من ذرة واحدة.

أيون عديد الذرات، يتكون غالباً من عنصر لافلزي يرتبط مع ذرة أو أكثر من الأكسجين.

المفردات الجديدة

وحدة الصيغة الكيميائية

الأيون الأحادي الذرة

عدد التأكسد

أيون عديد الذرات

أيون أكسجيني سالب

عرف ما يأتي:

هو ما يُسبّب المرور من جهة إلى أخرى.

المفردات الأكاديمية

النقل

(تابع) 3-3 صيغ المركبات الأيونية وأسماؤها

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حل اقرأ المثال المحلول 1-3 من كتابك المدرسي.

جرب ما يلي:

صيغة المركب الأيوني

تُستعمل مع المثال المحلول
صفحة 98، 3-1

• المسألة

اكتب صيغة المركب الأيوني الناتج من اتحاد أيون الكالسيوم Ca^{2+} مع أيون الكلوريد Cl^- .

1. تحليل المسألة

المعطيات: الصيغة الأيونية لكل من Ca^{2+} و Cl^- .

المطلوب: صيغة المركب الناتج من اتحادهما.

2. حساب المطلوب

إن أصغر عدد يقبل القسمة على مقدار كلتا الشحتتين، هو 2 ؛ لذا فإن المركب يتكون من أيون كالسيوم واحد، وأيونين اثنين من أيونات الكلوريد؛ لذلك فإن صيغة المركب الناتج هي:



3. تقويم الإجابة

محصلة الشحنة الكهربائية الكلية في وحدة صيغة واحدة من هذا المركب تساوي صفرًا.

$$0 = \left(\frac{1-}{\text{أيون Cl}} \right) \text{Ca} + \left(\frac{2+}{\text{أيون Ca}} \right) \text{Cl}$$

• المسألة

حل اقرأ المثال المحلول 3-3 من كتابك المدرسي.

جرب ما يأتي:

صيغة مركب أيوني

عديد الذرات

تُستعمل مع المثال المحلول
صفحة 100، 3-3

• المسألة

اكتب صيغة المركب الناتج من اتحاد أيون الكالسيوم مع أيون البرومات.

1. تحليل المسألة

المعطيات: الصيغة الأيونية لكل من BrO_3^- ، Ca^{2+} ، و Cl^- .

المطلوب: صيغة المركب الناتج من اتحادهما.

(تابع) ٣ - صيغ المركبات الأيونية وأسماؤها

الفكرة الرئيسية

التفاصيل

٢. حساب المطلوب

إن أصغر عدد يقبل القسمة على مقدار كلتا الشحتتين، هو 2^- ; لذا سيتحدّد أيونان من إين أيون واحد مع Ca^{2+} من (BrO_3^-) . أمّا الصيغة الجزئية للمركب الأيوني الناتج، فهي $\underline{\text{Ca}(\text{BrO}_3)_2}$.

٣. تقويم الإجابة

محصلة الشحنة الكهربائية الكلية في وحدة صيغة واحدة من هذا المركب تساوي صفراً.

$$0 = \left(\frac{1^-}{\text{أيون } \text{BrO}_3^-} \right) \text{BrO}_3^- + \left(\frac{2^+}{\text{أيون } \text{Ca}^{2+}} \right) \text{Ca}^{2+}$$

[1] من أيونات BrO_3^- [2] من أيونات Ca^{2+}

أسماء الأيونات
والمركبات الأيونية

تُستعمل مع الصفحات
102 - 100

صنف الأيونات الآتية إلى أحادية الذرة، أو عديدة الذرات، والتي تحمل شحنة سالبة أو موجبة. وإذا كان الأيون عديد الذرات، فاذكر إن كان يضم أيون أكسجين أم لا.

أيون سائب	عديد الذرات	CN^-
أيون سائب؛ أكسجيني	عديد الذرات	MnO_4^-
أيون موجب	أحادي الذرة	Ba^{2+}
أيون سائب	عديد الذرات	$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$
أيون موجب	عديد الذرات	NH_4^+
أيون سائب	أحادي الذرة	N^{3-}
أيون موجب	عديد الذرات	Hg_2^{2+}
أيون سائب؛ أكسجيني	عديد الذرات	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
أيون سائب	أحادي الذرة	O^{2-}

سم المركبات الآتية:

أكسيد الكالسيوم	CaO
برمنجنات البوتاسيوم	KMnO_4
أيودات الاسترانيوم	$\text{Sr}(\text{IO}_3)_2$
هيدروكسيد الأمونيوم	NH_4OH
كبريتيد الحديد (III)	Fe_2S_3
نترات القصدير (IV)	$\text{Sn}(\text{NO}_3)_4$
فوسفات الرصاص (II)	$\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$
كبريتات الزئبق (I)	Hg_2SO_4
كلوريد البلاتين (IV)	PtCl_4

المرّكبات الأيونية والفلزات

4 - 3 الروابط الفلزية وخواص الفلزات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 4 من هذا الفصل، ثم اكتب ثلات معادلات قد تخطر بذهنك بعد قراءة العناوين الرئيسية والتعليقات.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يأتي:

المفردات الجديدة

نموذج تساهم فيه ذرات الفلز جميعها الموجدة في المادة الصلبة بالكترونات تكافئها؛ في

نموذج بحر الإلكترونات

تكوين بحر من الإلكترونات يحيط بأيونات الفلز الموجبة في الشبكة الفلزية، مما يمكّن

الإلكترونات من الانتقال بسهولة من ذرة إلى أخرى.

الإلكترونات الحرّة

الإلكترونات الموجدة في مستويات الطاقة الخارجية لذرات الفلز، المتراوحة والقادرة على

الانتقال بين الذرات؛ لعدم ارتباطها بأي ذرة أخرى.

الرابطة الفلزية

قدرة التجاذب بين الأيونات الموجبة للفلزات والإلكترونات الحرّة في الشبكة الفلزية.

الشبكة

خلط من العناصر ذات خواص فلزية فريدة.

(تابع) 4 - 3 الروابط الفلزية وخواص الفلزات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

لُخْص كيف يفسّر نموذج بحر الإلكترونيات خاصية الطرق، التوصيل الحراري، والكهربائي الجيد للفلزات.

إن القوة الخارجية الواقعة على أيونات الفلز، تجعلها تتحرّك عبر بحر الإلكترونيات، مما يجعل

الفلز قابلاً للطرق والسحب. كما أن حركة الإلكترونيات الحرة حول أيونات الفلز الموجبة تحمل

معها الحرارة والطاقة الكهربائية في خلال الفلز.

الروابط الفلزية

ستعمل مع الصفحتين
101-102

اشرح خواص الفلزات، بإكمال الجمل الآتية:

كلّما ازداد عدد الإلكترونات الحرّة في الفلز، ازدادت قوة الفلزات الانتقالية وصلابتها. وبما أنّ الأيونات الموجبة في الفلز مرتبطة بقوة مع الإلكترونات الحرّة، فإنّه ليس سهلاً انتزاعها من الفلز؛ مما يجعل الفلز مادة صلبة جدًا. أمّا الفلزات القلوية، فهي أكثر ليونة من الفلزات الانتقالية؛ بسبب وجود إلكترون حرّ واحد لكل ذرة.

تتفاوت درجات انصهار الفلزات كثيراً. ولكن، ليس بالمستوى نفسه لـ درجة الغليان. كما لا تتطلّب ذرات الفلز وجود كمية كبيرة من الطاقة لتكون قادرة على الحركة، مروّأ بذرة أخرى. ولكن، يجب فصل الذرات عن الأيونات الموجبة والإلكترونات في أثناء الغليان، وهذا يتطلّب كمية كبيرة من الطاقة. أمّا لمعان الفلزات، فنتائج من الضوء الممتصض والممبعث بواسطة الإلكترونات الحرّة في الفلز.

(تابع) 4 - 3 الروابط الفلزية وخواص الفلزات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صلٌ تركيب السبيكة في العمود الأول باسمها الشائع في العمود الثاني، واستعمالاتها في العمود الثالث. مستعيناً بالجدول 12-3 بصفته مرجعاً لذلك.

العمود 3	العمود 2	العمود 1
أدوات المائدة، والحلي	الحديد الصلب	42% Au, 15% Ag, 45% Cu
حشوات الأسنان	ذهب عيار 10 قيراط	8% Ni, 75% Fe
القوالب	فضة النقود	3% C, 97% Fe
الأجراس والميداليات	مملغمات الأسنان	7.5% Cu, 92.5% Ag
المغاسل، والأدوات	النحاس الأصفر	5% Sn, 15% Zn, 80% Cu
الجواهير	البرونز	15% Zn, 85% Cu
السباكية، والأدوات العامة، و والإضاءة	الفولاذ	15% Sn, 35% Ag, 50% Hg

السبائك الفلزية

تُستعمل مع الصفحة 105

قارن بين السبائك البديلة والسبائك الفراغية، مُعطيًا مثالاً على كلٍّ منها.

السبائك البديلة هي التي يستغنى فيها عن ذرات الفلز الأصلية بذرات فلز آخر مشابهة لها في

الحجم. وتحمل السبيكة الناتجة خواص الفلزين معًا اللذين تتكون منهما، مثل الفضة

المستخدمة في صنع الحلي. أما السبائك الفراغية، فهي التي تملأ فراغاتها بذرات فلز أصغر

حجمًا، بحيث تمتلك السبيكة الناتجة خواص تختلف عن خواص الفلزات التي تتكون منها، مثل

فولاذ الكربون.

ملخص الفصل

المركّبات الأيونية والفلزات

بعد قراءتك لهذا الفصل، لخّص ما قرأت، ثم اكتب ثلاث حقائق مهمة تعلّمها حول المركّبات الأيونية.

1. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بما يلي لمساعدتك على المراجعة:

- اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخصك.
- ادرس المفردات، والتعريفات العلمية.
- راجع الواجبات المنزلية اليومية.
- راجع الجداول، والرسوم البيانية، ووسائل الإيضاح.
- راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كلّ قسم من الفصل.
- ألق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية الفصل.
- راجع أسئلة مراجعة الفصل الموجودة في نهاية الفصل.

مراجعة

لخّص

اشرح كيف تحدّد خواص الذرات نوع الأيونات التي ستكونُها، وما الخواص التي ستمتلكها المركّبات الأيونية الناتجة منها.

إذا فقد العنصر الكتروناً أو أكثر من إلكترونات التكافؤ، للوصول إلى توزيع الغاز النبيل المستقر، فإنه سيكون أيونات موجبة الشحنة.

أما إذا اكتسب الكتروناً أو أكثر للوصول إلى توزيع الغاز النبيل المستقر، فإنه سيكون أيوناً سالباً الشحنة. وترتبط الأيونات الموجبة

والسلبية معاً، مكونة أشكالاً متكرّرة، تعادل تجاذب الأيونات وتنافرها، ومكونة الشبكة البلورية. وكلما ازدادت قوة التجاذب بين

الأيونات في المركب، أصبح المركب أكثر صلابة، وصارت درجات انصهاره وغليلاته أعلى.

الروابط التساهمية

قبل أن تقرأ

تعريف المصطلحات الآتية:

مراجعة المفردات

قوة الجذب الكهروسโคنية التي تمسك الجسيمات ذات الشحنات المختلفة معًا في المركبات

الرابطة الأيونية

تنصُّ على أنَّ الذرة تكتسب الإلكترونات، أو تفقدتها، أو تشارك بها؛ لتحصل على ثمانية

قاعدة الثمانية

الإلكترونات تكافأ في مستوى طاقتها الأخير.

وضُح المصطلحين التاليين: التدرج في الخواص، والخواص الدورية للعناصر.

الفصل 2

التدَّرُّج في الخواص هو تغير خواص العناصر بصورة تدريجية عند انتقالها عبر الدورة، أو عبر

المجموعة. أمَّا الخواص الدورية للعناصر، فهي خواصها الكيميائية أو الفيزيائية في الجدول

الدوري.

حدِّد الأيونات، وشحنتهَا في المركبات الأيونية الآتية:

الفصل 4

Li^+ ; أيون موجب، S^{2-} ; أيون سالب.

Li_2S

K^+ ; أيون موجب، MnO_4^- ; أيون سالب.

KMnO_4

Al^{3+} ; أيون موجب، O^{2-} ; أيون سالب.

Al_2O_3

الروابط التساهمية

1 - 4 الرابطة التساهمية

التفاصيل

الفكرة الرئيسة

تصفح القسم 1 من هذا الفصل، ثم اكتب ثلاث معادلات قد تخطر بذهنك بعد قراءة العناوين الرئيسة والتعليقات.

1. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2

3

المفردات الجديدة

رابطة كيميائية تُنْتَج عند مشاركة ذرات العناصر بالكترونات التكافؤ.

الرابطة التساهمية

يتكون عندما ترتبط ذرتان أو أكثر معاً برابطة تساهمية.

الجزيء

تمثيل نقطي لالكترونات يُسْتَعْمَل لاظهار كيفية ترتيب الالكترونات في الجزيء.

تركيب لويس

رابطة تساهمية أحادية بين ذرتين تشاركان بزوج من الالكترونات، في منتصف المسافة بين

رابطة سيجما

الذرتين.

رابطة باي π

رابطة تساهمية تُنْتَج عند تداخل مستويات الطاقة المتعاكسة للمشاركة في الالكترونات.

تفاعل ماض للطاقة

تفاعل يحدث عندما يكون مقدار الطاقة اللازمة لتفكيك الرابط الموجود في المواد

تفاعل طارد للطاقة

المتفاعلة أكبر من مقدار الطاقة الناتجة من تكون الرابط الجديد في المواد الناتجة.

تفاعل يحدث عندما يكون مقدار الطاقة الناتجة في أثناء تكون الرابط الجديد في المواد

الناتجة أكبر من مقدار الطاقة اللازمة لتفكيك الرابط الموجود في المواد المتفاعلة.

عرف ما يأتي:

المفردات الأكاديمية

إشغال نفس المنطقة بشكل جزئي.

التدخل

(تابع) ١ - ٤ الرابطة التساهمية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

اشرح قاعدة الثمانية، بإكمال الجمل الآتية:
تنصُّ قاعدة الثمانية على أنَّ الذرات تتكتسب الإلكترونات، أو تخسرها، أو تشارك بها؛ لتحصل على توزيع الكتروني مستقر، يتألف من 8 إلكترونات تكافؤ في مستوى طاقتها الأخيرة، أو مكتمل. وعلى الرغم من وجود استثناءات لذلك، إلا أنَّ هذه القاعدة تزوَّدنا بأسس مفيدة لفهم الروابط الكيميائية.

أكمل الجمل الآتية، مستعِملاً كلمات أو جملًا من كتابك المدرسي.
إذن قوة التجاذب بين الذرات، هي محصلة تنافر الكترون والكترون، أو نواة ونواة، أو تجاذب نواة وإلكترون. وعند نقطة الجذب القصوى، تتعادل قوى التجاذب مع قوى التنافر. أمَّا أكثر الترتيبات ثباتًا للذرات فتوجد عند نقطة الجذب القصوى؛ وذلك عند اتحاد الذرات معًا برابطة تساهمية، وتكون الجزيئات.

حل أقرأ المثال المحلول ١-٤ من كتابك المدرسي.

جرِّب ما يأتي:

● المسألة

رسم تركيب لويس لحمض الهيدروكلوريك HCl.

١. تحليل المسألة

رسم التمثيل النقطي للإلكترونات لكل ذرة في المركب.


المعطيات: H : \bullet Cl : $\ddot{\bullet}$

المطلوب: تركيب لويس لحمض HCl

يمتلك الهيدروجين إلكترون تكافؤ واحد، وهو ما تحتاج إليه ذرة الكلور التي تحتوي على 7 إلكترونات تكافؤ لإكمال مجالها الخارجي وفق قاعدة الثمانية.

٢. حساب المطلوب

رسم التمثيل النقطي للإلكترونات لكل ذرة في المركب، ثم بيّن زوج الإلكترونات المشتركة.



لماذا ترتبط الذرات معاً؟

ما الرابطة التساهمية؟

تُستعمل مع صفحة 118

الروابط التساهمية الأحادية

تركيب لويس للجزيء

تُستعمل مع المثال المحلول 4-1، صفحة 122

(تابع) ١ - ٤ الرابطة التساهمية

الفكرة الرئيسية

التفاصيل

3. تقويم الإجابة
لقد أصبح لكل ذرة التوزيع الإلكتروني لـ الغاز نبيل، ومن ثم أصبحت كل ذرة مستقرة.

بين نوع الروابط بين الذرات الممتدة فيما يأتي، إما تساهمية أحادية؛ رابطة سيجما، أو تساهمية مزدوجة؛ رابطة سيجما ورابطة باي π ، أو تساهمية ثلاثة؛ رابطة سيجما ورابطة باي π .


رابطة تساهمية أحادية بين كل ذرة H وذرة C من نوع سيجما،



ورابطة تساهمية ثلاثة بين ذرة C وذرة C؛ واحدة من نوع سيجما،

واثنتان من نوع باي π .

رابطة تساهمية أحادية بين كل ذرة H وذرة C من نوع سيجما،



ورابطة تساهمية مزدوجة بين ذرة C وذرة O؛ واحدة من نوع سيجما،

والآخر من نوع باي π .

اشرح العوامل التي تحكم بقوّة الرابط التساهمية.

تعتمد قوّة الرابطة التساهمية على المسافة بين أنوبيّة الذرات، إضافة إلى عدد أزواج الإلكترونات

المشاركة، حيث تزداد قوّة الرابطة بازدياد عدد أزواج الإلكترونات المشتركة. كما تزداد قوّة

الرابطة بقصّ الرابطة نفسها.

الروابط التساهمية المتعددة

تُستعمل مع الصفحتين

124 – 123

قوّة الروابط التساهمية

تُستعمل مع الصفحتين

125 – 124

عرف طاقة تفكك الرابطة.

هي مقدار الطاقة اللازمة لكسر رابطة تساهمية معينة.

الربط مع واقع الحياة

اشرح كيف يساعد فهمُ الرابطة التساهمية، وكيمياء المركبات العلماء على زيادة موارد الغذاء.

أقبل الإجابات المعقولة جميعها. إجابة محتملة: إن فهم كيّفية ترابط المواد الوراثية في أصناف الغذاء معاً، قد يساعد العلماء

على جعل الصفات الوراثية في الأغذية تُنتج كمية أكبر، وأحسن طعمًا، وأكثر فائدة غذائية لأجيال المستقبل.

الروابط التساهمية

2 - 4 تسمية الجزيئات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 2 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات الآتية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ بارز.
- اقرأ الجداول كلّها، ثمّ أمعن النظر في الرسوم البيانية.
- انظر إلى الصور جميعها، ثمّ اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- اقرأ الصيغ الجزيئية جميعها.
- تذكّر ما تعرفه حول تسمية الجزيئات.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها حول الصيغ الجزيئية للجزيئات التساهمية وأسمائها.

1. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

3.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يأتي:

أي حمض يتتألف من الهيدروجين وأيون أكسجيني سالب.

المفردات الجديدة


الحمض الأكسجيني

(تابع) 2 - 4 تسمية الجزيئات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

سم بادئة كل من المركبات الجزيئية الثنائية الذرات الآتية:



تسمية المركبات

الجزئية الثنائية
الذرات

ٌستعمل مع المثال محلول 4-2، صفحة 127

حل اقرأ المثال محلول 2-4 من كتابك المدرسي.

جرب ما يأتي:

المسألة

سم المركب N_2O_3

1. تحليل المسألة

المعطيات: الصيغة الكيميائية للمركب: N_2O_3 .

المطلوب: اسم المركب.

تبين الصيغة أسماء العناصر الموجودة وأعداد ذراتها. حيث يحتوي المركب على عنصرين لافززين فقط؛ لذا يمكن تسميته وفق قاعدة تسمية المركبات الجزيئية الثنائية الذرات.

2. حساب المطلوب

العنصر الأول الموجود في المركب هو النيتروجين N ، أما العنصر الثاني فهو الأكسجين O . ولهذا، يُسمى العنصر الأول أكسيداً. وبما أنّ الصيغة تحتوي على ذرتين من النيتروجين N ، التي يُعبر عنها بـ باليادة ثلثي، وثلاث ذرات من الأكسجين O ، والتي يُعبر عنها بـ باليادة ثالث، فيكون اسم المركب هو ثالث أكسيد ثلثي النيتروجين.

3. تقويم الإجابة

تبين اسم المركب، ثالث أكسيد ثلثي النيتروجين، أنه يحتوي على ذرتين من النيتروجين N ، وثلاث ذرات من الأكسجين O ، وهذا يتفق مع الصيغة الكيميائية للمركب N_2O_3 .

(تابع) 2 - 4 تسمية الجزيئات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صلِّ الصيغة الكيميائية بالاسم الصحيح للحمض فيما يأتي:

حمض الكبريتوز	HF
حمض الهيدروفلوريك	HIO_4
حمض الفوسفوريك	H_2SO_3
حمض الهيبوكلوروز	H_3PO_4
حمض البيرأيديك	$\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$
حمض البرمنجينيك	H_2CO_3
حمض الأسيتيك	HClO
حمض الكربونيك	HMnO_4

تسمية الأحماض

ُستعمل مع الصفحتين
129 - 128

اكتب الصيغ الكيميائية لأسماء المركبات الجزيئية أدناه، مستعيناً بالشكل 11 - 4 لمساعدتك على معرفة الصيغة الصحيحة.

رابع نيتريد رباعي الكبريت	S_4N_4	رابع بروميد ثنائي الكربون	C_2Br_4
حمض الزرنيخيك	H_3AsO_4	خامس فلوريد الزرنيخ	AsF_5
حمض الهيدروسيانيك	HCN	حمض البيركلوريك	HClO_4

كتابة الصيغ
الكيميائية للمركبات
من أسمائها

ُستعمل مع الصفحتين
130 - 129

كون

نظم مسابقة علمية حول تسمية الجزيئات، تتضمن مجموعة من الأسئلة والإجابات عن كلٌّ مما يلي: الbadئات، وأسماء الذرات، وأسماء المركبات الجزيئية الثنائية الذرات وصيغها وأسمائها الشائعة، وأسماء كلٌّ من الأحماض الثنائية، والأحماض الأكسجينية وصيغها وأسمائها الشائعة.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

الروابط التساهمية

3 - 4 التراكيب الجزيئية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 3 من هذا الفصل، ثم اكتب ثلاثة أسئلة قد تخطر بذهنك بعد قراءة العناوين الرئيسية والتعليقات.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يأتي:

المفردات الجديدة

الصيغة البنائية

الرنين

الرابطة التساهمية التناسقية

نموذج جزيئي يستعمل رموز العناصر والروابط لبيان الموضع النسبي للذرات.

حالة تحدث عندما يكون هناك احتمال لرسم أكثر من تركيب لويس، لشكل الجزيء أو الأيون.

رابطة تساهمية تتكون عندما تقدم إحدى الذرات الكترونياً لمشاركة بعدها ذرة أخرى أو أيوناً

آخر بحاجة إلى الكترونيين ليكونا ترتيباً كترونياً مستقرّاً بأقل طاقة وضع.

(تابع) 3 - 4 التراكيب الجزيئية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

- اكتب الخطوات الواجب استعمالها لتحديد تركيب لويس.
1. حدد موقع بعض الذرات.
 2. حدد العدد الكلي للإلكترونات المتوافرة للروابط.
 3. حدد عدد أزواج إلكترونات الروابط؛ بقسمة عدد الإلكترونات الكلي على 2.
 4. ضع زوجاً من الإلكترونات (رابطة تساهمية أحادية) بين الذرة المركزية، وكل ذرة من الذرات الطرفية.

الصيغة البنائية

تُستعمل مع الصفحتين
132 – 131

تركيب لويس لمركب
تساهمي يحتوي روابط
متعددة

تُستعمل مع المثال
4 – 4، صفحة 134

حل اقرأ المثال محلول 4 – 4 من كتابك المدرسي.

جرّب ما يأتي:

المسألة

رسم تركيب لويس لمركب FCHO.

1. تحليل المسألة

المعطيات: الصيغة الكيميائية للمركب FCHO.

المطلوب: تركيب لويس للمركب FCHO.

بما أنّ ذرة الكربون أقلّ قوة في جذب إلكترونات المشتركة، فستصبح هي الذرة المركزية.

2. حساب المطلوب

حدد العدد الكلي لإلكترونات التكافؤ، وكذلك عدد أزواج الترابط.

7 إلكترونات تكافؤ لذرة الفلور F + 4 إلكترونات تكافؤ لذرة الكربون C +

6 إلكترونات تكافؤ لذرة الأكسجين + 1 إلكترون تكافؤ لذرة هيدروجين H

18 = إلكترون تكافؤ

$$\frac{\text{إلكترون تكافؤ } [18]}{\text{إلكترونين لكلّ زوج}} = \text{عدد أزواج إلكترونات الترابط}$$


9 = أزواج

(تابع) 3-4 التراكيب الجزيئية


الفكرة الرئيسية

التفاصيل

ارسم روابط تساهمية أحادية، تمثل كل منها زوجاً من الإلكترونات؛ من ذرة الكربون C نحو كل ذرة طرفية أخرى، ثم ضع أزواج الإلكترونات المتبقية حول ذرتي الأكسجين والفلور لتعطي كل منها توزيع ثمانية المستقر.



هناك 9 أزواج متوافرة، استعمل منها 9 أزواج. إذن، الباقي = صفرًا. لم تحصل ذرة الكربون على توزيع الثمانية؛ لذا يجب أن يشترك زوج إلكترونات من ذرة الأكسجين مع ذرة الكربون لتكوين رابطة تساهمية ثنائية؛ ولذلك فإن تركيب لويس للمركب هو:



1. تقويم الإجابة

والآن، فقد أصبح لدى كل من ذرتي الكربون والأكسجين 8 إلكترونات، وهذا يجعلهما مستقرتين ويتبعان قاعدة الثمانية.

تركيب لويس

لأيونات المتعدد الذرات

٣-١-٤ ستُستعمل مع المثال 5-4، صفحة 135

المسألة

ارسم تركيب لويس لأيون البرمنجنات (MnO_4^-).

1. تحليل المسألة

المعطيات: الصيغة الكيميائية للأيون MnO_4^-

المطلوب: تركيب لويس للأيون MnO_4^-

بما أنّ ذرة المنجنيز أقلّ قوة في جذب الإلكترونات المشتركة، فستصبح هي الذرة المركزية.

2. حساب المطلوب

حدّد العدد الكلي لإلكترونات التكافؤ، وكذلك عدد أزواج الترابط.

$$1 \text{ ذرة Mn} \times \frac{[\text{6}] \text{ إلكترونات تكافؤ}}{\text{ذرة O}} + [\text{4}] \text{ ذرات O} \times \frac{[\text{7}] \text{ إلكترونات تكافؤ}}{\text{ذرة Mn}} = [\text{16}] \text{ إلكترونات تكافؤ}$$

$$[\text{1}] + [\text{32}] \text{ إلكترون من الشحنة السالبة} = [\text{32}] \text{ إلكترون تكافؤ.}$$


$$\text{عدد أزواج الإلكترونات} = \frac{[\text{16}] \text{ زوجاً}}{[\text{2}] \text{ إلكtron لكل زوج}} = \frac{[\text{32}]}{[\text{2}]} \text{ إلكترونات}$$

(تابع) 3 - 4 التراكيب الجزيئية


الفكرة الرئيسية

التفاصيل

ارسم روابط تساهمية أحادية، تمثل كل منها زوجاً من الإلكترونات؛ من ذرة Mn نحو كل ذرة أكسجين O طرفية، ثمّ ضع أزواج الإلكترونات المتبقية حول ذرات الأكسجين O لتصل إلى توزيع الثمانية المستقر.



هناك 16 زوجاً متواافقاً من الإلكترونات، استعمل منها 16 زوجاً. إذن، الباقي = صفرًا.
لم يبق أي زوج إضافي من الإلكترونات للمنجنيز؛ لهذا فإنّ تركيب لويس للأيون هو:



1. تقويم الإجابة

تمتلك الذرات جميعها ثمانية إلكترونات. أما المجموعة الذرية، فإن محاصلة الشحنة الكهربائية الكلية لها = 1-.

أشكال الرنين

ُستعمل مع الصفحة 136

إن كل جزيء أو أيون له دين خاص به، يظهر كأن له بناء واحد فقط. وقد أظهرت القياسات العملية لأطوال الروابط، أنّ الروابط المحسوبة في المختبر جميعها متماطلة تماماً لبعضها بعضًا.

اكتب ثلاثة استثناءات لقاعدة الثمانية.

1. يمكن أن يكون لمجموعة صغيرة من الجزيئات أعداد فردية من الإلكترونات التكافؤ، ولا

تستطيع أن تكون 8 إلكترونات حول كل ذرة.

2. تصل بعض المركبات إلى التوزيع المستقر وتكون بوجود عدد أقل من 8 إلكترونات حول الذرة.

3. تتكون بعض المركبات حول ذرات تملك أكثر من 8 إلكترونات تكافؤ.

استثناءات قاعدة

الثمانية

ُستعمل مع الصفحتين 137 – 136

الروابط التساهمية

4 - 4 أشكال الجزيئات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 4 من هذا الفصل ، مستفيداً من الإرشادات الآتية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ بارز.
- اقرأ الجداول كلّها، ثمْ أمعن النظر في الرسوم البيانية.
- انظر إلى الصور جميعها، ثمْ اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذكّر ما تعرفه حول أشكال الذرات وترتيبها في المركبات التساهمية.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها حول أشكال المركبات التساهمية.

1. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

3.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يأتي:

المفردات الجديدة

اختصار لنموذج التنافر بين أزواج إلكترونات التكافؤ (Valence Shell Electron Pair

(Repulsion model). وفيه ترتّب الذرات في الجزيء بطريقة تقلل التنافر بين أزواج

الإلكترونات المرتبطة وغير المرتبطة حول الذرة المركزية إلى أقصى درجة ممكنة.

نموذج VSEPR

عملية تحدث عند دمج مستويات الطاقة الفرعية معًا، لتكوين مستويات جديدة متماضية تماماً،

التهجين


تسمى المستويات المهجنة.

(تابع) 4- أشكال الجزيئات




التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صل أشكال الجزيئات المذكورة بقياس زوايا روابطها فيما يأتي:



ضع أسماء المستويات المهجّنة في الأشكال أدناه على النحو الآتي: sp^3 , sp^2 , أو sp . sp^3d^2 , sp^3d , أو sp^2



نموذج VSEPR

تُستعمل مع الصفحتين
141-140

التهجين

تُستعمل مع الصفحتين
142-141

(تابع) 4- أشكال الجزيئات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حل اقر المثال المحلول 7-4 من كتابك المدرسي.

جرب ما يأتي:

ما شكل الجزيء؟

تُستعمل مع المثال المحلول
صفحة 143، 4-7

ما شكل جزيء SbI_5 ? حدد مقادير زوايا الربط، ونوع المستويات المهجنة التي تتكون منها الروابط.

1. تحليل المسألة

المعطيات: الصيغة الكيميائية للمركب SbI_5 .

المطلوب: شكل الجزيء، ومقادير زوايا الربط، ونوع المستويات المهجنة التي تتكون منها الروابط.

يحتوي الجزيء على ذرة أنتيمون مركبة واحدة، مرتبطة بخمس ذرات يود.

2. حساب المطلوب


حدد العدد الكلي لإلكترونات التكافؤ، وكذلك عدد أزواج الترابط.

$$\text{([7 إلكترونات تكافؤ} \times 5 \text{ ذرات يود I}) + (5 \text{ إلكترونات تكافؤ} \times \text{ذرة أنتيمون Sb}) = 40 \text{ إلكترون تكافؤ}}$$

وبما أن كل ذرة يود I تحوي 3 أزواج من الإلكترونات، فهذا يعني وجود 10 إلكترونات تكافؤ قادرة على الترابط (5 إلكترونات من 5 ذرات يود، و 5 إلكترونات من ذرة أنتيمون).

$$\text{عدد أزواج الترابط} = \frac{10 \text{ إلكترونات تكافؤ}}{2 \text{ إلكترون لكل زوج}} = 5 \text{ أزواج إلكترونات متاحة للربط}$$

رسم تركيب لويس للجزيء، ثم حدد شكله.



شكل الجزيء هو ثنائي الهرم مثلثي، وبزوايا مقدارها 120° للمستوى الأفقي، وأخرى 90° بين الروابط الأفقية والعمودية. أما المستويات المهجنة، فهي من نوع sp^3d .

3. تقويم الإجابة

تحتوي كل ذرة يود على 8 إلكترونات. أما ذرة الأنتيمون، فتحتوي على 10 إلكترونات، وهذا مسموح به عند تهجين مجال d.

الروابط التساهمية

5 - 4 الكهروسائلية والقطبية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 5 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات الآتية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ بارز.
- اقرأ الجداول كلّها، ثمّ أمعن النظر في الرسوم البيانية.
- انظر إلى الصور جميعها، ثمّ اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذكّر ما تعرفه حول قوة الروابط التساهمية، وتوزيع الشحنات فيها.

اكتُب ثلاَث حقائق اكتشفتها حول الكهروسائلية.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

3.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يأتي:

المفردات الجديدة

رابطة تتكون نتيجة تشارك زوج الكترونات الرابطة التساهمية بين ذرات العناصر المختلفة

الرابطة التساهمية القطبية

بصورة غير متساوية بسبب وجود فرق في الكهروسائلية.

الرابطة التساهمية غير القطبية

رابطة تتكون نتيجة تشارك زوج الكترونات الرابطة التساهمية بين ذرتين متماثلتين بصورة متساوية، ويكون الفرق في الكهروسائلية بينهما يساوي صفرًا.

(تابع) 5-4 الكهروسالبية والقطبية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

رتب العناصر الآتية من الأقل كهروسالبية إلى الأكثر كهروسالبية، اعتماداً على الشكل 4-19 في كتاب المدرسي:

Au	7
Y	2
Ba	1
P	5
H	6
Te	4
O	9
I	8
Co	3

الميل الإلكتروني،
والكهروسالبية، وخصائص
الرابطة

تُستعمل مع الصفحتين
145 - 144

ارسم تراكيب لويس لكلٌ من المركبات الجزيئية أدناه. وحلّل تماثل كلٌ تركيب؛ لتحديد ما إذا كان المركب تساهمياً قطبياً، أم تساهمياً غير قطبي.


الروابط التساهمية
القطبية

تُستعمل مع الصفحتين
147 - 146


تساهمي غير قطبي



تساهمي غير قطبي



تساهمي قطبي



(تابع) 5-4 الكهروسائلبية والقطبية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حدّد ما إذا كانت الخواص المدرجة أدناه هي لمركبّات أيونية، أم تساهمية، أم تساهمية غير قطبية، أم تساهمية قطبية.

<u>مركب تساهمي</u>	درجة انصهاره منخفضة
<u>مركب تساهمي</u>	صلب، لين جداً
<u>مركب أيوني</u>	درجة غليانه مرتفعة
<u>مركب تساهمي</u>	تجاذب ضعيف بين الصيغ البنائية
<u>مركب تساهمي غير قطبي</u>	الذائبة في الزيت
<u>مركب أيوني</u>	شديد الصلابة
<u>مركب أيوني</u>	درجة انصهاره مرتفعة
<u>مركبات أيونية وتساهمية قطبية</u>	الذائبة في الماء
<u>مركب تساهمي</u>	سريع التبخر
<u>مركب أيوني</u>	تجاذب قوي بين الصيغ البنائية

خواص المركبات التساهمية

تُستعمل مع الصفحتين
149 - 148

صفُّ كيف تبدو جزيئات (SiO_2) في الشبكة البلورية للكوارتز، وكيف أن لها شكلاً رباعي الأوجه منتظمًا مشابهًا للالماس.

يمتلك السليكون أربعة إلكترونات تكافؤ مثل الكربون. حيث تتشارك ذرة السليكون بالكترون تكافؤ

واحد مع كل ذرة أكسجين؛ مما يترك إلكترونين غير مرتبطين لذرة السليكون، والكترونا واحداً

مع ذرة الأكسجين. أما إذا تحدّد جزيء آخر من SiO_2 مع الجزيء الأول، فإن الإلكترونين غير

المرتبطين الموجودين في ذرة السليكون سيرتبطان مع كل ذرة أكسجين في الجزيء الثاني.

فيصبح الجزيء الأول كأنه SiO_4 ; لوجود شكل رباعي الأوجه منتظم له. أما ذرة السليكون في

الجزيء الثاني، فت تكون رابطتين تساهميتين مع جزيء ثالث، وآخر رابع؛ لذا فإن الشكل

الناتج هو بلورة لها شكل رباعي الأوجه منتظم، تشبه خواصها الكربون في الالماس. ولكن، ليس

بالجودة والصلابة نفسيهما.

المواد الصلبة
التساهمية الشبكية

تُستعمل مع الصفحة 149

ملخص الفصل

الروابط التساهمية

بعد قراءتك لهذا الفصل، اكتب ثلاث حقائق رئيسة حول الروابط التساهمية.

1. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بما يأتي لمساعدتك على المراجعة:

اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخصك.

ادرس المفردات، والتعريفات العلمية.

راجع الواجبات المنزلية اليومية.

راجع الجداول، والرسوم البيانية، ووسائل الإيضاح.

راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كلّ قسم من الفصل.

ألق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية الفصل.

راجع أسئلة مراجعة الفصل الموجودة في نهاية الفصل.

مراجعة

الربط مع واقع الحياة

اشرح كيف تُفسّر روابط الكربون التساهمية وجوده هذا العدد الهائل من مركبات الكربون، بما فيها المركبات الموجودة في المخلوقات الحية.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها، بحيث تبيّن أنَّ الكربون، مثل العناصر جميعها التي في مجموعته، يمتلك أربعة إلكترونات تكافؤ:

لذا فهو قادر على تكوين أكبر عدد من الروابط لكل ذرة، قبل وصوله إلى توزيع الثمانية المستقر. وتتضمن هذه الروابط

التساهمية روابط أحادية، وثنائية، وثلاثية. وبما أنها تساهمية، فإن ذرات الكربون باستطاعتها الارتباط ببعضها؛ مما يُشكّل

سلسل طويلة وحلقات في مركبات الكربون وجزيئاته، وهذا ما يفسّر العدد الهائل من المركبات العضوية، التي يُعدَّ كثير منها

ضروريًا للمخلوقات الحية.

الحسابات الكيميائية

قبل أن تقرأ

عَرِّف المصطلحات التالية:

المفردات الجديدة

وحدة نظام دولية أساسية تُستعمل لقياس كمية الذرات، أو الجسيمات، أو الوحدات البنائية في

المول

المادة.

كتلة مول واحد من أي مادة ندية بالجرامات.

كتلة المول

نسبة قيم متكافئة، تُستعمل للتعبير عن الكمية نفسها بوحدات مختلفة.

عامل التحويل

طريقة لحل المسائل، تُركّز على الوحدات المستخدمة في وصف المادة.

التحليل البعدى

ينصُّ على أن "الكتلة لا تُفنى ولا تُسْتَهَدَّ في أثناء التفاعل الكيميائي".

قانون حفظ الكتلة

زن المعادلة الآتية:



الفصل 4

الصف الأول الثانوي

استعمل الجدول الدوري الموجود في نهاية كتابك المدرسي، لإكمال الجدول الآتي:

الفصل 5

الصف الأول الثانوي

الكتلة المولية	المادة الندية
12.011	الكريون
22. 990	الصوديوم
15.999	الأكسجين
105.96	كربونات الصوديوم

الحسابات الكيميائية

1 - 5 المقصود بالحسابات الكيميائية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 1 من هذا الفصل، ثم اكتب ثلاثة أسئلة قد تخطر في ذهنك بعد قراءة العنوانين الرئيسة والتعليقات.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

3.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

المفردات الجديدة

دراسة العلاقات الكمية بين كميات المواد المتفاعلة، والممواد الناتجة من التفاعل الكيميائي.

الحسابات الكيميائية

النسبة بين أعداد المولات لأي مادتين في المعادلة الكيميائية الموزونة.

النسبة المولية

عرف ما يلي:

المفردات الأكاديمية

يحصل على شيء من مصدر محدد.

يشتّت

فسّر أهمية قانون حفظ الكتلة في التفاعلات الكيميائية.

علاقة المول

ينصُّ على أنَّ "الكتلة لا تُفنى ولا تُستحدث في أثناء التفاعل الكيميائي".

بالجسيمات

ويحدث تفكك للروابط الكيميائية في المواد المتفاعلة، وت تكون روابط جديدة في النواتج.

تُستعمل مع الصفحتين 12-13

لكن، تبقى كمية المادة في نهاية التفاعل كما كانت في بدايته دون تغيير.

(تابع) 5 - 1 المقصود بالحسابات الكيميائية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

لُّخص بعد قراءة المثال محلول 1-5 من كتاب المدرسي، أملاً الفراغات الآتية لمساعدتك على تدوين الملاحظات.

المسألة

فسّر المعادلة من خلال الجسيمات المُمثّلة، المولات، والكتلة.
وبيّن أنّ قانون حفظ الكتلة يمكن ملاحظته.

1. تحليل المسألة



المطلوب: المعادلة بدلالة عدد الجزيئات =

المعادلة بدلالة عدد المولات =

المعادلة بدلالة الكتلة =

2. حساب المطلوب

تبيّن المعاملات عدد الجزيئات.

تبيّن المعاملات عدد المولات.

احسب كتلة كلّ من المواد المتفاعلة والنواتج.

اضرب عدد المولات في كلّ من: معامل التحويل، والكتلة المولية.

الكتلة المولية للمادة المتفاعلة × عدد مولات المادة المتفاعلة = جرامات المادة المتفاعلة.
1 mol من المادة المتفاعلة

الكتلة المولية للمادة الناتجة × عدد مولات المادة الناتجة = جرامات المادة الناتجة.
1 mol من المادة الناتجة

اجمع كتل المواد المتفاعلة جميعها.



اجمع كتل المواد الناتجة جميعها.



حدّد ما إذا كان قانون حفظ الكتلة قد لوحظ أم لا؟ وهل كتلة المواد المتفاعلة متساوية لكتلة المواد الناتجة؟ نعم.

3. تقويم الإجابة

لكلّ من: المادة المتفاعلة والمادة الناتجة [4] أرقام معنوية، لذا يجب أن تتضمّن إجابتك [4] أرقام معنوية أيضًا.

تفسير المعادلات الكيميائية

تُستعمل مع المثال محلول 5-1، صفحة 14



(تابع) ١-٥ المقصود بالحسابات الكيميائية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تفحّص العلاقة بين المعاملات التي يمكن استعمالها لكتابه مُعامل التحويل، المُسمى النسبة المولية.

مثال




اكتب النسب المولية التي تحدّد العلاقات المولية في هذه المعادلة.

(ملحوظة: اربط المواد المتفاعلة والمواد الناتجة بعضها البعض).

$$\begin{array}{ll} \frac{2 \text{ mol KClO}_3}{2 \text{ mol KCl}} & \frac{2 \text{ mol KClO}_3}{3 \text{ mol O}_2} \\ \frac{2 \text{ mol KCl}}{2 \text{ mol KClO}_3} & \frac{3 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol KClO}_3} \\ \frac{2 \text{ mol KCl}}{3 \text{ mol O}_2} & \frac{3 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol KCl}} \end{array}$$

جُرب ما يلي:

ارسم أسهماً تُبيّن العلاقات بين المواد في المعادلة التالية، مستعملاً الأقلام الملونة:



اكتب النسب المولية للمعادلة أعلاه.

$$\begin{array}{lll} \frac{1 \text{ mol C}_2\text{H}_4}{3 \text{ mol O}_2} & , & \frac{1 \text{ mol C}_2\text{H}_4}{2 \text{ mol CO}_2} & , & \frac{1 \text{ mol C}_2\text{H}_4}{2 \text{ mol H}_2\text{O}} \\ \frac{3 \text{ mol O}_2}{1 \text{ mol C}_2\text{H}_4} & , & \frac{3 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol CO}_2} & , & \frac{3 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol H}_2\text{O}} \\ \frac{2 \text{ mol CO}_2}{3 \text{ mol O}_2} & , & \frac{2 \text{ mol CO}_2}{1 \text{ mol C}_2\text{H}_4} & , & \frac{2 \text{ mol CO}_2}{2 \text{ mol H}_2\text{O}} \\ \frac{2 \text{ mol H}_2\text{O}}{3 \text{ mol O}_2} & , & \frac{2 \text{ mol H}_2\text{O}}{2 \text{ mol CO}_2} & , & \frac{2 \text{ mol H}_2\text{O}}{1 \text{ mol C}_2\text{H}_4} \end{array}$$

النسبة المولية

تُستعمل مع الصفحتين
16-15

الحسابات الكيميائية

2 - 5 الحسابات الكيميائية والمعادلات الكيميائية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 2 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات التالية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍ بارز.
- اقرأ الجداول والرسوم البيانية كلّها.
- انظر إلى الصور جميعها، ثم اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذكّر ما تعرفه حول هذا الموضوع.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها حول الحسابات الكيميائية.

1. اقبل الإجابات المعقوله جميعها.

2.

3.

حدّد الأدوات الالزمة لإجراء الحسابات الكيميائية على المعادلات الكيميائية.

تبدأ الحسابات الكيميائية جميعها بكتابه النسبة المولية المبنية على المعادلة الكيميائية الموزونة، ومن ثم تطبيق تحويلات الكتلة - المول.

استخدام الحسابات

الكيميائية

ستعمل مع الصفحتين

18 - 17

(تابع) 2-5 الحسابات الكيميائية والمعادلات الكيميائية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حل اقرأ المثال المحلول 3-5 من كتابك المدرسي.

جرب ما يلي:

حسابات

المول - الكتلة

تُستعمل مع المثال
المحلول 3-5، صفحة 20

● المسألة

احسب عدد جرامات كلوريد الحديد III، FeCl_3 ، الناتجة من تفاعل 2.00 mol من الحديد الصلب Fe مع غاز الكلور Cl_2 .

1. تحليل المسألة

المعطيات: عدد مولات الحديد = 2.00 mol

المطلوب: عدد جرامات FeCl_3

أعطيت عدد مولات المواد المتفاعلة، الحديد Fe، وعليك حساب كتلة الناتج، كلوريد الحديد III FeCl_3 . لذا، عليك تطبيق تحويلات المول – الكتلة.

2. حساب المطلوب

اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة، مواضحاً المعطيات والمطلوب.



اكتب النسب المولية لهذه المعادلة، مُستعملاً أسهماً تبيّن العلاقات بين المواد، ثمّ ضع دائرة حول النسبة المولية التي تربط بين عدد مولات كلٌّ من: Fe و FeCl_3 .

$$\begin{array}{c} \frac{2 \text{ mol Fe}}{3 \text{ mol Cl}_2} \quad , \quad \frac{1 \text{ mol Fe}}{1 \text{ mol FeCl}_3} \\ \frac{2 \text{ mol FeCl}_3}{3 \text{ mol Cl}_2} \quad , \quad \frac{1 \text{ mol FeCl}_3}{1 \text{ mol Fe}} \\ \frac{3 \text{ mol Cl}_2}{2 \text{ mol Fe}} \quad , \quad \frac{3 \text{ mol Cl}_2}{2 \text{ mol FeCl}_3} \end{array}$$

اضرب عدد مولات Fe في النسبة المولية، لحساب عدد مولات FeCl_3 .

$$2.00 \text{ mol Fe} \times \frac{\boxed{1} \text{ mol FeCl}_3}{\boxed{1} \text{ mol Fe}} = \boxed{2.00} \text{ mol FeCl}_3$$

اضرب عدد مولات FeCl_3 في كتلته المولية:

$$2.00 \text{ mol FeCl}_3 \times \frac{\boxed{162} \text{ g FeCl}_3}{1 \text{ mol FeCl}_3} = \boxed{324} \text{ g FeCl}_3$$

3. تقويم الإجابة

تمتلك عدد المولات المُعطاة أرقاماً ذات $\boxed{3}$ منازل؛ لذا يجب أن تكون قيمة الكتلة المحسوبة لـ FeCl_3 ذات $\boxed{3}$ منازل أيضاً.

(تابع) 2 - 5 الحسابات الكيميائية والمعادلات الكيميائية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حل اقرأ المثال المحلول 2-5 من كتابك المدرسي.

جرب ما يلي:

حسابات

المول - المول

تُستعمل مع المثال
المحلول 2-5، صفحة 19

- المسألة احسب عدد مولات أكسيد الألومنيوم Al_2O_3 ، الناتجة من اتحاد 4.0 mol من الألومنيوم Al مع غاز الأكسجين O_2 .

1. تحليل المسألة


المعطيات: عدد مولات الألومنيوم = 4.0 mol Al

المطلوب: عدد مولات الأكسجين = ?

لاحظ أن كمية كلّ من: **المعطيات والمطلوب مُعطاة بوحدة المول**; لذا عليك تطبيق تحويلات المول - مول.

2. حساب المطلوب

اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة، موضحاً المعطيات والمطلوب.



اكتب النسب المولية لهذه المعادلة، مستعيناً أسهماً تبيّن العلاقات بين المواد، ثم ضع دائرة حول النسبة المولية التي تربط بين عدد مولات كلّ من Al و Al_2O_3 .

$$\frac{2 \text{ mol Al}}{1 \text{ mol Al}_2\text{O}_3}, \quad \frac{4 \text{ mol Al}}{3 \text{ mol O}_2}$$

$$\frac{3 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol Al}_2\text{O}_3}, \quad \frac{3 \text{ mol O}_2}{4 \text{ mol Al}}$$

$$\frac{\text{1 mol Al}_2\text{O}_3}{2 \text{ mol Al}}, \quad \frac{2 \text{ mol Al}_2\text{O}_3}{3 \text{ mol O}_2}$$

اضرب عدد مولات Al المُعطاة في النسبة المولية، لحساب عدد مولات Al_2O_3 المطلوبة.

$$4.0 \text{ mol Al} \times \frac{\boxed{1.0} \text{ mol Al}_2\text{O}_3}{\boxed{2.0} \text{ mol Al}} = \boxed{2.0} \text{ mol Al}_2\text{O}_3$$

3. تقويم الإجابة

تمتلك عدد المولات المُعطاة أرقاماً معنوية عددها $\boxed{2}$; لذا يجب أن تتضمن إجابتك أرقاماً معنوية عددها $\boxed{2}$ أيضاً.

(تابع) 2-5 الحسابات الكيميائية والمعادلات الكيميائية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حل اقرأ المثال المحلول 4-5 من كتابك المدرسي.

جرب ما يلي:

حساب الكتل

ستعمل مع المثال المحلول

5-4، صفحة 21

المسألة

احسب كتلة غاز الأمونيا NH_3 ، الناتج من تفاعل 3.75g من غاز النيتروجين N_2 مع غاز الهيدروجين H_2 .

1. تحليل المسألة

المعطيات: كتلة غاز النيتروجين = 3.75g

المطلوب: كتلة NH_3 ؟

أعطيت كتلة الماء المتفاعلة، وعليك إيجاد كتلة الناتج؛ لذا يجب استعمال تحويلات الكتلة - الكتلة.

2. حساب المطلوب

اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل.



حول جرامات N_2 إلى عدد مولات باستعمال مقلوب كتلة المول بصفته عامل تحويل.

$$3.75 \text{ g N}_2 \times \frac{1 \text{ mol N}_2}{28.01 \text{ g N}_2} = \boxed{0.130} \text{ mol N}_2$$

اكتب النسب المولية لهذه المعادلة:

$$\frac{3 \text{ mol H}_2}{1 \text{ mol N}_2} \quad \frac{1 \text{ mol N}_2}{2 \text{ mol NH}_3} \quad \frac{1 \text{ mol N}_2}{3 \text{ mol H}_2}$$

$$\frac{2 \text{ mol NH}_3}{1 \text{ mol N}_2} \quad \frac{2 \text{ mol NH}_3}{3 \text{ mol H}_2} \quad \frac{3 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol NH}_3}$$

اضرب عدد مولات N_2 في النسبة المولية التي تربط بين N_2 و NH_3 .

$$0.13 \text{ mol N}_2 \times \frac{\boxed{2} \text{ mol NH}_3}{\boxed{1} \text{ mol N}_2} = \boxed{0.26} \text{ mol NH}_3$$

اضرب عدد مولات NH_3 الناتجة في كتلتها المولية.

$$0.26 \text{ mol NH}_3 \times \frac{17.03 \text{ g NH}_3}{1 \text{ mol NH}_3} = \boxed{4.42} \text{ g NH}_3$$


3. تقويم الإجابة

تمتلك كتلة N_2 المعلقة $\boxed{3}$ أرقام معنوية؛ لذا يجب أن تتضمن كتلة NH_3 المحسوبة $\boxed{3}$ أرقام معنوية أيضاً.

(تابع) 2 - الحسابات الكيميائية والمعادلات الكيميائية

التفاصيل

رتب الخطوات الالزمه للتحويل من المعادلة الكيميائية الموزونة إلى كتلة المادة المجهولة.



الفكرة الرئيسية

حل مسائل الحسابات الكيميائية

ٌستعمل مع الصفحة 18

حدّد خطوات إجراء الحسابات الكيميائية، بإكمال الملخص أدناه.

1. اكتب معادلة كيميائية موزونة، ثم عُبّر عنها باستخدام المولات.

2. احسب مولات المادة المعطاة، باستخدام معامل تحويل الكتلة - المول، مستعملاً النسبة المولية الصحيحة من المعادلة الكيميائية الموزونة بصفتها معامل تحويل.

3. احسب عدد مولات المادة المجهولة من عدد مولات المادة المعطاة، مستعملاً النسبة المولية الصحيحة من المعادلة الكيميائية الموزونة بصفتها معامل تحويل.

4. احسب كتلة المادة المجهولة من عدد مولاتها التي حسبتها، مستعملاً معامل تحويل المول - الكتلة. استعمل الكتلة المولية بصفتها معامل تحويل.

الحسابات الكيميائية

3 - 5 المادة المحددة للتفاعل

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 3 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات التالية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍّ بارز.
- اقرأ الجداول والرسوم البيانية كلّها.
- انظر إلى الصور جميعها، ثم اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذكّر ما تعرفه حول المادة المحددة للتفاعل.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها حول المادة المحددة للتفاعل.

1. اقبل الإجابات المعقوله جميعها.

.2

.3

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

المادة التي تحدّد سير التفاعل، وكمية المادة الناتجة.

كمية المواد المتفاعلة المتبقية بعد توقف التفاعل.

مفردات جديدة

المادة المحددة للتفاعل

المادة المتفاعلة الفائضة

(تابع) 3-5 المادة المحددة للتفاعل

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

افترض أن لديك ست قطع من الخبر، وثلاث قطع من الطماطم، وقطعتين من الجبن، فكم شطيرة من الطماطم والجبن يمكنك تحضيرها؟ أي هذه المكونات يحدد عدد الشطائر التي تستطيع إعدادها؟ يمكنك تحضير شطيرتين؛ لأن الجبن هو المكون المحدد.

لماذا تتوقف
التفاعلات؟

ُستعمل مع الصفحتين 23 - 24

رتب المعلومات التالية والمتعلقة بالمواد المحددة للتفاعل.

I. متى تتوقف المواد المتفاعلة عن التفاعل؟

A. المادة المحددة للتفاعل.

1. تحدد مدى حدوث التفاعل.

2. تحدد كمية النواتج.

B. تعدد المواد المتفاعلة الأخرى المتبقية جميعها فائضة.

III. حساب النواتج عند وجود مادة محددة للتفاعل.

A. احسب عدد مولات كل مادة متفاعلة.

1. حول الكتل إلى مولات.

2. اضرب كل كتلة في مقلوب كتلتها المولية.

B. حدد النسب المولية للمعادلة.

C. قارن عدد المولات المتوافرة بالنسبة المولية؛ لتحديد المادة المحددة للتفاعل.

D. حدد كمية المواد الناتجة التي يمكن تكوينها من مولات المادة المحددة للتفاعل.

حل اقرأ المثال محلول 5-5 من كتاب المدرسي.

جريدة ما يلي:

● المسألة

احسب كتلة ثاني كلوريد ثنائي الكبريت S_2Cl_2 ، الناتجة من تفاعل 100.0 g من الكبريت S مع 50.0 g من الكلور Cl.


1. تحليل المسألة

المعطيات: كتلة الكبريت = 100.0g، وكتلة الكلور = 50.0g

المطلوب: عدد جرامات ثاني كلوريد ثنائي الكبريت.

2. حساب المطلوب

اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل.



المادة المحددة للتفاعل


ُستعمل مع المثال محلول 5-5، صفحة 26

(تابع) 3-5 المادة المحددة للتفاعل

الفكرة الرئيسية

التفاصيل

اكتب النسب المولية لهذه المعادلة.



اضرب كل كتلة في مقلوب الكتلة المولية لها.

$$100 \text{ g} \text{ S}_8 \times \frac{1 \text{ mol S}_8}{256.5 \text{ g S}_8} = 0.38 \text{ mol S}_8$$

$$50.0 \text{ g S}_8 \times \frac{1 \text{ mol Cl}_2}{70.91 \text{ g Cl}_2} = 0.70 \text{ mol Cl}_2$$

احسب النسبة الفعلية للمواد المتاحة.

$$\frac{0.70 \text{ mol Cl}_2}{0.38 \text{ mol S}_8} = \frac{1.84 \text{ mol Cl}_2}{1 \text{ mol S}_8}$$

حدد المادة المحددة للتفاعل

بما أن كمية الكلور المتاحة تساوي 1.84 mol، وبما أنه يجب توافر

4 mol Cl₂ للتفاعل مع مول واحد من S₈، فإن الكلور هو المادة المحددة للتفاعل.

اضرب عدد مواد المادة المحددة للتفاعل في النسبة المولية للمادة الناتجة إلى المادة المحددة للتفاعل.

$$0.70 \text{ mol Cl}_2 \times \frac{4 \text{ mol S}_2\text{Cl}_2}{4 \text{ mol Cl}_2} = 0.70 \text{ mol S}_2\text{Cl}_2$$

اضرب عدد مواد المادة الناتجة في كتلتها المولية.

$$0.70 \text{ mol S}_2\text{Cl}_2 \times \frac{135.0 \text{ g S}_2\text{Cl}_2}{1 \text{ mol S}_2\text{Cl}_2} = 94.5 \text{ g S}_2\text{Cl}_2$$

اضرب عدد مواد كل مادة متفاعلة فائضة في الكتلة المولية الخاصة بها.

$$0.70 \text{ mol Cl}_2 \times \frac{1 \text{ mol S}_8}{4 \text{ mol Cl}_2} = 0.18 \text{ mol S}_8$$

$$0.18 \text{ mol S}_8 \times \frac{256.5 \text{ g S}_8}{1 \text{ mol S}_8} = 46.1 \text{ g S}_8$$

اطرح كتلة المادة المتفاعلة الفائضة من كتلة المادة المعطاة.

$$100 \text{ g S}_8 - 46.1 \text{ g S}_8 = 53.9 \text{ g S}_8$$

1. تقويم الإجابة

تمتلك الكتلة المعطاة [3] أرقام معنوية، لذا يجب أن تتضمن كلتا المادة المجهولة [3] أرقام معنوية أيضاً.

الحسابات الكيميائية

4 - 5 نسبة المردود المئوية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 4 من هذا الفصل، مركزاً على العناوين الرئيسة والفرعية، والكلمات المكتوبة بخطٍّ بارز، ثم لخص الأفكار الرئيسة في هذا الجزء.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

استعن بكتابك المدرسي لكتابة المصطلح المناسب لكل ممّا يلي:

نسبة المردود الفعلي إلى المردود النظري في صورة نسبة مئوية.

أكبر كمية من الناتج يمكن الحصول عليها من كمية المادة المتفاعلة المُعطاة.

كمية المادة الناتجة عند إجراء التفاعل عملياً.

المفردات الجديدة

نسبة المردود المئوية

المردود النظري

المردود الفعلي

**ما مقدار المادة
الناتجة؟**

تُستعمل مع الصفحتين

31-30

$$\frac{100\%}{\text{نسبة المردود المئوية}} \times \frac{\text{المردود الفعلي (من التجربة)}}{\text{المردود النظري (من الحسابات الكيميائية)}}$$

(تابع) 4 - 5 نسبة المردود المئوية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حل اقرأ المثال المحلول 6-5 من كتابك المدرسي.

جرب ما يلي:

المسألة

إذا تفاعل 100.0 kg من الرمل SiO_2 مع الكربون C، ونتج 51.4 kg من SiC ، و CO ، فما نسبة المردود المئوية للناتج؟

1. تحليل المسألة

المعطيات: كتلة الرمل = 100 kg، والمردود الفعلي = 51.4 kg من SiC

المطلوب: المردود النظري =؟ ونسبة المردود المئوية =؟

2. حساب المطلوب

اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لتفاعل.



حدد النسبة المولية التي تربط بين SiO_2 و SiC .

$$\frac{1 \text{ mol } \text{SiO}_2}{1 \text{ mol } \text{SiC}}$$

حوّل إلى kg.

$$100 \text{ kg } \text{SiO}_2 = 100\ 000 \text{ g}, 51.4 \text{ kg } \text{SiC} = 51\ 400 \text{ g}$$

حوّل الجرامات إلى مولات، مستعملاً مقلوب الكتلة المولية.

$$100\ 000 \text{ g } \text{SiO}_2 \times \frac{1 \text{ mol } \text{SiO}_2}{60.09 \text{ g } \text{SiO}_2} = 1664 \text{ mol } \text{SiO}_2$$

استعمل النسبة المولية الصحيحة لتحويل عدد مولات SiO_2 إلى عدد مولات SiC .

$$1664 \text{ mol } \text{SiC}_2 \times \frac{1 \text{ mol } \text{SiC}}{1 \text{ mol } \text{SiO}_2} = 1664 \text{ mol } \text{SiC}$$

احسب المردود النظري بضرب عدد مولات SiC في كتلتها المولية.

$$1664 \text{ mol } \text{SiC} \times \frac{40.0 \text{ g } \text{SiC}}{1 \text{ mol } \text{SiC}} = 66\ 726 \text{ g } \text{SiC}$$

اقسم المردود الفعلي على المردود النظري، ثم اضرب في 100%.

$$\frac{51.4 \text{ kg } \text{SiC}}{66.7 \text{ kg } \text{SiC}} \times 100\% = 77.0 \% \text{ SiC}$$

3. تقويم الإجابة

تمتلك الكميات جميعها [3] أرقام معنوية؛ لذا يجب أن تتضمن نسبة المردود المئوية [3]

أرقام معنوية أيضاً.

الحسابات الكيميائية

كون

اكتب في العمود الأيمن مفاهيم الحسابات التي تقابل أنشطة العاملين اليومية في سوق الأوراق المالية.

**الحسابات الكيميائية،
سوق الأوراق المالية**

1. يراقب محلل الأسهم أرباح الشركات باستمرار؛ فهو الذي يحدّد نسبة أرباح كل منها.

المردود النظري

2. يتبع المحلل نفسه ما إذا كانت الشركات تفي بالتوقعات، أم يتعذر عليها ذلك.

نسبة المردود المئوية

3. يرغب تاجر حبوب في التحقق من توافر 100 000 صاع من الحبوب في المخازن ليبعها في فصل الشتاء؛ لذا فقد قرر طلب 12 000 صاع من الحبوب؛ لعلمه أن التلف قد يُفسد نسبة مئوية من المحصول.

المادة المتفاعلة الفائضة

4. يعلم تاجر ماشية أن إحدى الشاحنات تستطيع حمل 10 عجول، يزن كل منها 550 kg. وهو يرغب في تخمين حمولة شاحنة مشابهة مليئة بالأغنام، تزن كل منها 90 kg، وذلك بمعرفة عدد الأغنام التي توجد في هذه الشاحنة.

تحويل الكتلة - كتلة

5. علم أحد سمسارة البورصة (سوق الأوراق المالية) أن إحدى شركات المستلزمات الطبية لها عدّة أطنان من مركبات الفضة النادرة، التي تؤهّلها لصناعة معدّات أسنان متميزة. فهل تستطيع الشركة إنتاج حاجة السوق من هذه المعدّات؟

المادة المحدّدة للتفاعل

الحسابات الكيميائية

ملخص الفصل

بعد قراءتك لهذا الفصل، لُّحِّص ما قرأت، ثم اكتب المعادلات والعلاقات الرئيسية.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

استعن بما يلي لمساعدتك على المراجعة:

مراجعة

- اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخصك.
- ادرس المفردات، والتعريفات العلمية.
- راجع الواجبات المنزلية اليومية.
- راجع الجداول، والرسوم البيانية، ووسائل الإيضاح.
- راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كلّ قسم من الفصل.
- ألق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية الفصل.
- راجع أسئلة تقويم الفصل الموجودة في نهاية الفصل.

الربط مع واقع الحياة

اشرح كيف تُعد الحسابات الكيميائية مهمة للوسائد الهوائية وسلامتك.

يعتمد انتفاخ الوسادة الهوائية على سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي تشمل الحرارة، و"أزيد الصوديوم" (Na_3N)، إضافة

إلى نترات البوتاسيوم. فإذا لم تكن نسب التفاعلات الكيميائية دقيقة تماماً وفقاً للحسابات الكيميائية، فإن الوسادة الهوائية لن

تنتفخ، وقد يكون انتفاخها صلباً جداً؛ مما قد يُسبب الأذى لك أو لمرافقك.

حالات المادة

قبل أن تقرأ

عرف المصطلحين التاليين:

مراجعة المفردات

إحدى حالات المادة التي تأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه، وتملاً **الحيز كله**، إضافة إلى

قابلية للانضغاط.

الخاصية التي يمكن ملاحظتها وقياسها دون تغيير في التركيب الأصلي للعينة.

الغاز

الخاصية الفيزيائية

احسب كثافة عينة من مادة ما، كتلتها 22.5g، وحجمها 5.00 cm^3 . استعمل المعادلة التالية:

$$\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}} = \text{الكثافة}$$

$$22.5\text{g}/5.00\text{ cm}^3$$

$$4.5\text{g}/\text{cm}^3$$

الفصل 2

الصف الأول الثانوي

صفِ **الخاصيتين** اللتين تُحدّدان **الخواص الفيزيائية والكيميائية** للمادة.

الفصل 2

الصف الأول الثانوي

يعتمد تحديد **الخواص الكيميائية** للمادة على نوع الذرات الموجودة فيها (التركيب)، وكيفية

ترتيب هذه الذرات (الشكل). وبالمثل، فإنَّ تركيب هذه المادة وشكلها (**الخواص الفيزيائية**)

يؤثّران كثيراً في سلوكها.

قارن بين **الخواص الفيزيائية والكيميائية** للغازات.

تُحدّد **الخاصية الكيميائية** هوية الغاز. في حين تُحدّد **الخاصية الفيزيائية** سلوك الغاز.

حالات المادة

١ - ٦ الغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفّح القسم ١ من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات التالية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍ بارز.
- اقرأ الجداول والرسوم البيانية كلّها.
- انظر إلى الصور جميعها، ثم اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذكّر ما تعرّفه عن هذا الموضوع.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

المفردات الجديدة

نظرية الحركة الجزيئية

التصادم المرن

درجة الحرارة

الانتشار

قانون جراهام للتدفق

الضغط

البارومتر

باسكال

الضغط الجوي

قانون دالتون للضغط

نظرية تصف سلوك الغازات بدلالة حركة الجسيمات.

تصادم لا تفقد فيه الطاقة الحركية.

مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجسيمات عينة من المادة.

حركة تداخل المواد معًا؛ وذلك من منطقة ذات تركيز عالٍ إلى منطقة أخرى ذات

تركيز منخفض.

ينص على أن "معدل سرعة تدفق الغاز يتناسب تناسباً عكسيًّا مع الجذر التربيعي للكتلة المولية".

مقدار القوة الواقعـة على وحدة المساحة.

أداة تُستخدم لقياس الضغط الجوي.

وحدة النظام العالمي للضغط، وتساوي مقدار قوة واحد نيوتون لكل متر مربع.

وحدة قياس ضغط الهواء الشائعة.

ينص على أن "الضغط الكلي لخليلـتـ من الغازات يساوي مجموع الضغوط الجزيئـة للغازات في

الخليلـتـ".

(تابع) 1 - 6 الغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

ميّز بين الخواص الفيزيائية الثلاث الرئيسة لجسيمات الغاز، بإكمال الفقرات التالية:

1. الجسيمات صغريرة الحجم. ويفترض عدم وجود قوى تجاذب أو تنافر ذات معنى بين جسيمات الغاز.
2. الحركة مستمرة وهي حركة عشوائية، وتسير جسيمات الغاز في خطوط مستقيمة حتى تصطدم بجسم آخر.
3. طاقتها ثابتة. ويفترض أن الكتلة والسرعة تؤثران في مستوى طاقة جسيمات الغاز.

نظريّة الحركة الجزيئيّة

تُستعمل مع الصفحتين

51-50

صف طاقة الحركة على صورة معادلة، بإكمال الجدول التالي:

التعريف	المتغير	$KE = \frac{1}{2} mv^2$
طاقة الحركة	طاقة الحركية	KE
كمية المادة	الكتلة	m
سرعة الحركة واتجاهها	السرعة	v

تفسير سلوك الغازات

تُستعمل مع الصفحات

53-51

صف المفاهيم التالية وارتباطها بسلوك الغازات، بإكمال الفقرات التالية:

كثافة منخفضة - تمتلك الغازات كثافة منخفضة (الكتلة / وحدة الحجم)، مقارنة بالمواد الصلبة. ويعزى الفرق في الكثافة - جزئياً - إلى كتلة الجسيمات، إضافة إلى وجود فراغات هائلة بين هذه الجسيمات.

الانضغاط والتتمدد - إن وجود الفراغات الكبيرة بين جسيمات الغاز، يسمح لها بالانضغاط، ويدفعها إلى تكوين حجم أصغر. وعندما يتوقف الضغط، فإن الجزئيات تتتمدد، وتعود إلى حجمها الأصلي.

الانتشار والتدفق - إن عدم وجود قوى تجاذب كبيرة بين جسيمات الغاز، يسمح لها بالانتشار بسهولة، مروراً ببعضها البعض. وهذه الحركة العشوائية تسمح للغازات بالاختلاط حتى تتوزع بالتساوي. وتسمى حركة جسيمات الغاز عندما تمر فوق بعضها البعض الانتشار، في حين تسمى الحركة التي تسمح للغاز بالانتقال من مكان ذي تركيز عالٍ التدفق.

(تابع) 1 - 6 الغازات

الفكرة الرئيسية

التفاصيل

اكتب قانون جراهام للتدفق على صورة تناوب.

$$\frac{1}{\text{معدل التدفق}} \propto \sqrt{\frac{\text{الكتلة المولية}}{\text{الكتلة المولية}}}$$

اكتب صيغة التناوب المبنية على قانون جراهام للتدفق، بحيث يمكنك المقارنة بين معدل انتشار غازين مختلفين.

$$\frac{\text{معدل انتشار}_B}{\text{معدل انتشار}_A} = \sqrt{\frac{\text{الكتلة المولية}_A}{\text{الكتلة المولية}_B}}$$

صف الضغط وعلاقته بسلوك الغازات.

الضغط: مقدار القوة الواقعه على وحدة المساحة؛ إذ تولد جسيمات الغاز الضغط عندما

تصطدم بجدران الوعاء. وكلما ازداد عدد الجسيمات، كان الضغط الناتج منها أكبر.

ضغط الغازات

تُستعمل مع الصفحات

56-54

ميّز بين البارومتر والمانومتر.

يقيس البارومتر مقدار الضغط الجوي. في حين يقيس المانومتر ضغط الغاز المحصور في وعاء

مغلق.

استكشف العلاقة بين وحدات قياس الضغط المختلفة، بإكمال الجدول التالي:

نسبة التحويل $1 \text{ kPa} = \underline{\hspace{2cm}}$	نسبة التحويل $1 \text{ atm} = \underline{\hspace{2cm}}$	اسم الوحدة (رمز الوحدة)
	101.3 kPa	كيلو باسكال (kPa)
7.501 mm Hg	760 mm Hg	(mm Hg) مليметр زئبق
7.501 torr	760 torr	torr
0.145 psi	14.7 psi	باوند للإنش المربيع (lb/in ²) أو psi
0.009869 atm		ضغط جوي (atm)

حالات المادة

2 - 6 قوى التجاذب

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 2 من هذا الفصل، ثم اكتب ثلاثة أسئلة قد تخطر بذهنك بعد قراءة العناوين الرئيسية والتعليقات.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

3.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي :.

المفردات الجديدة

قوى التشتت

القوى ثنائية القطبية

الرابطة الهيدروجينية

قوى ضعيفة ناتجة من إزاحة مؤقتة في كثافة الإلكترونات الموجودة في السحابة الإلكترونية.

قوى التجاذب بين مناطق مختلفة الشحنة في الجزيئات القطبية.

رابطة ثنائية القطبية قوية، تنشأ بين الجزيئات التي تحتوي على ذرات هيدروجين متعددة مع

ذرات صغيرة ذات كهروسالبية عالية، ولها زوج من الإلكترونات غير مرتبط على الأقل مثل الفلور

والأكسجين والنيتروجين.

المفردات الأكاديمية

عرف ما يلي :

التوجيه

الترتيب باتجاه محدد؛ والاصطفاف باتجاه واحد.

(تابع) 2 - قوى التجاذب

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صف الفرق بين قوى الترابط الجزيئية، والقوى بين الجزيئات.

قوى الترابط الجزيئية هي قوى التجاذب التي تربط بين جسيمات المادة معًا بروابط أيونية، أو تساهمية، أو فلزية. أما القوى بين الجزيئات، فهي قوى التجاذب البينية التي تربط بين جسيمات مختلفة أو متشابهة من المادة.

قوى بين الجزيئات

تُستعمل مع الصفحات 64-69

قارن بين قوى الترابط الجزيئات، بإكمال الجدول التالي:

مثال	أسباب الجذب	القوى
NaCl	تجاذب بين الشحنات: الموجبة والسلبية.	الأيونية
H ₂	تجاذب بين الأنوية الموجبة، والإلكترونات المشتركة.	التساهمية
Fe	تجاذب بين أيونات الفلز الموجبة، والإلكترونات الحرة.	الفلزية

قارن بين القوى بين الجزيئات، بإكمال الجدول التالي:

مثال	أسباب الجذب	القوى
F ₂	قوى ضعيفة ناتجة من الإزاحة المؤقتة في كثافة الإلكترونات، في السحابة الإلكترونية.	التشتت
HCl	قوى تجاذب بين مناطق مختلفة الشحنة في الجزيئات القطبية.	الثنائية القطبية
H ₂ O	قوى تجاذب ثنائية القطبية بين ذرة هيدروجين وذرة صغيرة ذات كهروسالبية عالية، لها زوج من الإلكترونات غير مرتبطة على الأقل مثل الفلور والأكسجين والنيتروجين.	الرابطة الهيدروجينية

حالات المادة

3 - 6 المواد السائلة والمواد الصلبة

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات التالية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍ بارز.
- اقرأ الجداول والرسوم البيانية كلّها.
- انظر إلى الصور جميعها، ثم اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذكّر ما تعرّفه عن هذا الموضوع.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

المفردات الجديدة

مقياس مقاومة السائل للأسباب.

الزوجة

مقياس لمقدار قوة السحب إلى الداخل بواسطة الجسيمات الموجودة داخل السائل.

التوتر السطحي

مركبات تعمل على تقليل التوتر السطحي للسائل، بتكسير الروابط الهيدروجينية بين جزيئات

عوامل خافضة للتوتر السطحي

الماء. كما تُسمى عوامل السطح النشطة.

الصلب المتبلور

مواد صلبة تكون ذراتها، أو أيوناتها، أو جزيئاتها مرتبة في شكل هندسي منتظم، وبنية ثلاثة

الأبعاد.

وحدة بناء

أصغر ترتيب للذرات يمكن أن يتكرر في ثلاثة اتجاهات لتكوين الشبكة البلورية.

متآصل

ظاهرة وجود العنصر بأشكال مختلفة، وفي الحالة الفيزيائية نفسها.

مادة صلبة غير متبلورة

مادة صلبة لا تترتب فيها الجسيمات بنمط مكرر ومنتظم.

حالات المادة

3 - 6 المواد السائلة والمواد الصلبة

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

قارن بين المفاهيم التالية، استناداً إلى ارتباطها بخواص السوائل، بإكمال الجمل التالية:

الكثافة والانضغاط: تستطيع السوائل أن تأخذ شكل الواقع، ولكن يبقى حجمها ثابتاً. وكثافة أي سائل أكبر من كثافة المادة نفسها في الحالة الغازية. والسوائل غير قابلة للانضغاط، باستثناء تلك التي تكون تحت ضغط كبير جداً.

الميوعة والزوجة: الميوعة، هي القدرة على الانسياط؛ إذ تنساب السوائل داخل بعضها بعضًا، ولكن بدرجة أقل مما هو عليه الحال في الغازات. أمّا الزوجة فهي مقدار مقاومة السائل للانسياط. وكلما كانت قوى التجاذب أكبر، قلّت قدرة السائل على الانسياط؛ مما يزيد درجة لزوجته (ومقاومته).

الزوجة ودرجة الحرارة: تؤثر درجات الحرارة في زوجة السائل، وهي تقلّ بارتفاع درجة الحرارة.

صف العلاقة بين الزوجة، ودرجة الحرارة، والتغيير في طاقة الحركة، بإكمال الجدول التالي:

التأثير في السائل	الزوجة	التغير في طاقة الحركة ΔKE	درجة الحرارة
تنساب بصورة أسرع	تقلّ	تزاد	تزاد
تنساب بصورة أبطأ	تزداد	تقلّ	تقلّ
لا تغير	لا تغير	لا تغير	لا تغير

السوائل


تُستعمل مع الصفحات 65-69

(تابع) 3 - 6 المواد السائلة والمواد الصلبة

الفكرة الرئيسية

التفاصيل

فسّر ظاهرة التوتر السطحي، بإكمال المخطط الشبكي التالي:



صف المفاهيم التالية وعلاقتها بخواص السوائل، بإكمال الجمل التالية:

تُستعمل مع الصفحة 69

الخاصية الشعرية: حركة ارتفاع السائل إلى أعلى في الأنابيب الرفيعة جدًا، وتُعرف

بخاصية التمسك والتلاصق.

التمسك: قوة الترابط بين الجزيئات المتماثلة.

التلاصق: قوة الترابط بين الجزيئات المختلفة.

(تابع) 3 - 6 المواد السائلة والمواد الصلبة

الفكرة الرئيسية

المواد الصلبة

تُستعمل مع الصفحات
74-70

التفاصيل

قارن بين كثافة السوائل والمواد الصلبة، بإكمال الفقرة التالية:

تكون الجسيمات في المواد الصلبة متقاربة جدًا؛ أي أنها أكثر كثافة منها في السوائل. وعندما توجد المادة في الحالتين، الصلبة، والسائلة، وفي المكان نفسه، فإنّ المواد الصلبة منها تغرس في الحالة السائلة. والاستثناء من ذلك هو الماء؛ فعندما يوجد الماء في الحالة الصلبة، على صورة جليد مثلاً؛ فإنه يطفو على السطح، مثلما تطفو مكعبات الثلج في كأس من الماء، أو ماء بحيرة مغطاة بالجليد. ويعزى ذلك إلى احتواء الجليد على فراغات بين جسيمات الثلج أكثر مما هي في الماء.

تُستعمل مع الصفحة 72

قارن بين الأنواع المختلفة للمواد الصلبة البلورية، بإكمال الجدول التالي:

أمثلة	الخواص	وحدة الجسيمات	النوع
عناصر المجموعة 18	لينة إلى لينة جداً، ودرجة انصهارها منخفضة، ورديئة التوصيل للتيار الكهربائي.	ذرات	ذرية
I_2 , H_2O , NH_3 CO_2 , $C_{12}H_{22}O_{11}$	لينة، ودرجات انصهارها منخفضة إلى عالية معتدلة، ورديئة التوصيل للتيار الكهربائي.	جزيئات	جزيئية
(C) (SiO_2)	صلبة جداً، ودرجات انصهارها عالية جداً، ورديئة التوصيل للتيار الكهربائي غالباً.	ذرات متراقبطة بواسطة روابط تساهمية شبكية	تساهمية شبكية
$NaCl$, KBr , $CaCO_3$	صلبة، وهشة، ودرجات انصهارها عالية، ورديئة التوصيل للتيار الكهربائي.	أيونات	أيونية
العناصر الفلزية جميعها	لينة، صلبة، ودرجات انصهارها منخفضة إلى عالية جداً، وقابلة للطرق والسحب، وجيدة التوصيل للتيار الكهربائي.	ذرات محاطة بالكترونات تكافؤ حرّة متحركة	فلزية

حالات المادة

4 - 6 تغيرات الحالة الفيزيائية

التفاصيل

تصفح القسم 4 من هذا الفصل، ثم اكتب ملخصاً للموضوعات الرئيسية.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

الفكرة الرئيسية

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

الضغط الذي يولّده البخار المتجمّع فوق سطح السائل.

درجة الحرارة التي يتساوى عندها ضغط بخار السائل مع الضغط الخارجي أو الضغط الجوي.

العملية التي يتحول فيها الغاز أو البخار إلى سائل.

عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة، دون المرور بالحالة السائلة.

رسم بياني للضغط مقابل درجة الحرارة يوضح حالة المادة تحت ظروف مختلفة من درجة

الحرارة والضغط.

المفردات الجديدة

ضغط البخار

درجة الغليان

التكاثف

الترسب

مخطط الحالة الفيزيائية

قارن بين المفردات التالية باستعمال كتابك المدرسي.

تُسمى درجة الحرارة التي تتكسر عندها القوى التي تربط جسيمات الشبكة البلورية بعضها

بعض، فتحوّل المادة إلى الحالة السائلة، درجة الانصهار. في حين تُسمى درجة الحرارة

التي يتحول عندها السائل إلى صلب بلوري، درجة التجمد. أما النقطة الموجودة على مخطط

الحالة الفيزيائية، التي تمثل كلاً من الضغط ودرجة الحرارة التي يوجد عندها الماء في

حالاته الثلاث معاً، فتُسمى النقطة الثلاثية.

تُسمى العملية التي يتحوّل من خلالها السائل إلى غاز أو بخار التبخر. أما إذا حدثت هذه العملية

عند سطح السائل فقط، فإنها تُعرف بالتبخر السطحي.

درجة الانصهار، ودرجة التجمد،
والنقطة الثلاثية

التبخر، والتباخر السطحي

(تابع) 4 - 6 تغيرات الحالة الفيزيائية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صنف أنواع تغيرات الحالة، بإكمال الجدول التالي، مستعيناً بالشكل 23-6 الموجود في كتاب المدرسي.

نوع التغير	حالة التغير
ترسب	غاز إلى صلب
انصهار	صلب إلى سائل
تبخر	سائل إلى غاز
تجمد	سائل إلى صلب
تكاثف	غاز إلى سائل
تسامي	صلب إلى غاز

تغيرات الحالة
الفيزيائية الماء
لطاقة

تُستعمل مع الصفحة 75

صف تغيرات الحالة التي تحتاج إلى طاقة، بإكمال الملخص التالي:

I. الذوبان

تُستعمل مع الصفحات

77-75

A. تكسر الطاقة الحرارية الروابط الهيدروجينية.

B. تعتمد كمية الطاقة اللازمة على قوة الروابط.

C. درجة الانصهار هي درجة الحرارة التي يتحوّل عندها الصلب إلى سائل.

D. درجة انصهار المادة غير المتبلورة غير محددة.

II. التبخر

A. بعض الجسيمات لها طاقة أكثر في الماء السائل.

B. تتحوّل الجسيمات التي ترك السائل إلى الحالة الغازية.

C. يسمى حدوث التبخر عند سطح السائل التبخر السطحي.

D. يسمى الضغط الذي يولّد البخار المتجمّع فوق سطح السائل ضغط البخار.

E. يسمى درجة الحرارة التي يتساوي عندها ضغط بخار السائل مع الضغط الجوي درجة الغليان.

III. التسامي

A. تتحوّل كثير من المواد الصلبة إلى غازات، دون المرور بالحالة السائلة أولاً.

B. بعض المواد الصلبة تتسامي عند درجة حرارة الغرفة.

C. تُعد عملية التجفيف بالتجميد مثلاً على حالة التسامي.

(تابع) 4 - 6 تغيرات الحالة الفيزيائية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

رتّب أنواع تغيرات الحالة الطاردة للطاقة، محدّداً كلاً من : الحالة، والطريقة، والطريقة العكسية، بإكمال الجدول التالي :

الطريقة العكسية	وصف الطريقة	تغير الحالة
التبخّر	عملية تحول الغاز أو البخار إلى سائل.	التكاثف
الانصهار	عملية تحول السائل إلى صلب.	التجمّد
التسامي	عملية تحول الغاز إلى صلب دون المرور بالحالة السائلة.	الترسب

تغيرات الحالة الفيزيائية الطاردة للطاقة

تُستعمل مع الصفحتين 78-79


مخطط الحالة الفيزيائية

تُستعمل مع الصفحتين 79-80

فسّر كيف تؤثّر النقطة الحرجة في الماء.

النقطة الحرجة : النقطة التي تمثل كلاً من الضغط ودرجة الحرارة التي لا يمكن الماء بعدها أن يكون في الحالة السائلة. وإذا وجد بخار الماء عند درجة الحرارة الحرجة، فلا يمكن لزيادة الضغط أن تحول بخار الماء إلى سائل.

بيّن كلاً من: درجة التجمّد العادي، ودرجة الغليان، والنقطة الحرجة، والنقطة الثلاثية على مخطط الحالة الفيزيائية للماء أدناه، مستعيناً بالشكل 6-29 الموجود في كتاب المدرسي.



حالات المادة

ملخص الفصل

بعد قراءتك لهذا الفصل، اكتب ثلات معادلات رئيسية وعلاقتها.
اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

$$KE = \frac{1}{2} mv^2 \quad .1$$

2. تقل اللزوجة بازدياد درجة الحرارة.

3. الانصهار هو عكس التجمد.

استعن بما يلي لمساعدتك على المراجعة:

اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخصك.

ادرس المفردات، والتعريفات العلمية.

راجع الواجبات المنزلية اليومية.

راجع الجداول، والرسوم البيانية، ووسائل الإيضاح.

راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كلّ قسم من الفصل.

ألق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية الفصل.

راجع أسئلة تقويم الفصل الموجودة في نهاية الفصل.

مراجعة

الربط مع واقع الحياة

تشاهد كل يوم كثيراً من الأمثلة على تغيرات الحالة. استعن بكتابك المدرسي لبيان أي تغير حالة تصفه كل من التالية، على النحو الظاهر في المثال الأول.

ترسب

تكون الثلوج على نافذة الطائرة

انصهار

تحول الجليد إلى ماء

تبخر

تصاعد البخار من فنجان القهوة

تجدد

انفجار أنبوب ماء في يوم بارد جداً

تكاثف

نقط من الماء تغطي مرآة الحمام

تسامي

انصهار الثلوج دون تكون سائل

الغازات

قبل أن تقرأ

مراجعة المفردات

الكتلة (m) لكل وحدة حجم (V).

الكثافة

دراسة كمية للعلاقات بين كميات المواد المتفاعلة المستهلكة، والمواد الناتجة المتكونة من

الحسابات الكيميائية

التفاعل الكيميائي.

نظريّة الحركة الجزيئية

وصف خواص الغازات، اعتماداً على كلٍّ من: الطاقة، والحجم، وحركة الجسيمات.

زن المعادلة التالية:



الفصل 4

الصف الأول الثانوي

بَيْن النسب المولية في التفاعل التالي:



. النسبة المولية لـ H_2 : N_2 . A

$$\frac{1 \text{ mol N}_2}{3 \text{ mol H}_2}$$

. النسبة المولية لـ H_2 : NH_3 . B

$$\frac{2 \text{ mol NH}_3}{3 \text{ mol H}_2}$$

فَسُرْ كِيف تُولَّد جسيماتُ الغاز الضغطَ.

الفصل 5

تُولَّد جسيمات الغاز الضغط عندما تصطدم بجدار الوعاء الذي توجد فيه.

الفصل 6

الغازات

1 - 7 قوانين الغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 1 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات التالية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍ بارز.
- اقرأ الجداول والرسوم البيانية كلّها.
- انظر إلى الصور جميعها، ثم اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذكّر ما تعرّفه عن هذا الموضوع.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها حول قوانين الغاز.

1. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

ينصُ على أن "مقدار حجم محدَّد من الغاز يتتناسب تناسباً عكسيّاً مع الضغط الواقع عليه عند ثبوث درجة حرارته".

المفردات الجديدة

قانون بويل

ينصُ على أن "حجم أي مقدار محدَّد من الغاز يتتناسب تناسباً طرديّاً مع درجة حرارته المطلقة عند ثبوت الضغط".

قانون شارل

الصفر على تدريج كلفن؛ ويُمثّل أقل قيمة ممكنة لدرجة الحرارة التي تكون عندها طاقة الذرات أقل ما يمكن.

الصفر المطلق

ينصُ على أن "ضغط مقدار محدَّد من الغاز يتتناسب تناسباً طرديّاً مع درجة الحرارة المطلقة له إذا بقي الحجم ثابتاً".

قانون جاي - لو ساك

يحدُّد العلاقة بين كلٍّ من الضغط، والحجم، ودرجة الحرارة لكمية محدَّدة من الغاز.

القانون العام للغازات

(تابع) 1 - 7 قوانين الغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حل اقرأ المثال المحلول 1-7 من كتابك المدرسي.

جرب ما يلي:

قانون بويل

ستعمل مع المثال المحلول

95، صفحة 7-1

المسألة

إذا أضيفت كمية من غاز الهيليوم، حجمها 4.00 L ، وضغطها 210 kPa ، بحيث أصبح حجمها 2.50 L عند درجة حرارة ثابتة، فاحسب ضغط الغاز عند هذا الحجم.

1. تحليل المسألة

المطلوب:

المعطيات:

$$P_2 = ? \text{ kPa}$$

$$P_1 = 2.1 \text{ kPa}$$

$$V_2 = 5.2$$

$$V_1 = 4.0 \text{ L}$$

استعمل معادلة قانون بويل والقيم المُعطاة أعلاه لإيجاد قيمة P_2 .

2. حساب المطلوب

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

اكتب معادلة قانون بويل:

جد قيمة P_2 ، بقسمة طرفي المعادلة على V_2 :

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2}$$

عوّض قيم المُعطيات في المعادلة، لإيجاد قيمة P_2 :

$$P_2 = \frac{(210 \text{ kPa}) (4.0 \text{ L})}{(2.5 \text{ L})}$$

$$P_2 = 340 \text{ kPa}$$

3. تقويم الإجابة

عندما يقل الحجم، فإن الضغط يزداد. أمّا وحدة الناتج، فهي **kPa**؛ وهي وحدة لقياس الضغط.

(تابع) 1 - 7 قوانين الغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

لُخْص املأ الفراغات التالية لمساعدتك على تدوين الملاحظات، بعد قراءة المثال المحلول

7-2

قانون شارل

تُستعمل مع المثال المحلول
صفحة 98، 7-2

● **المسألة**

إذا كان حجم عينة من الغاز عند درجة حرارة 40.0°C يساوي 2.32 L ، فما حجم هذه العينة

إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 75.0°C ، مع بقاء الضغط ثابتاً؟

1. تحليل المسألة

المطلوب: المعطيات:

$$T_1 = \underline{40.0^{\circ}\text{C}}$$

$$V_2 = \underline{? \text{ L}}$$

$$T_2 = \underline{75.0^{\circ}\text{C}}$$

استعمل قانون شارل والقيم المُعطاة أعلاه لإيجاد قيمة V_2 .

2. حساب المطلوب

حول قيمتي T_1 و T_2 السيليزية إلى درجة حرارة مطلقة بوحدة الكلفن: K

$$T_1 = \underline{273 + 40.0^{\circ}\text{C}} = \underline{313\text{ K}}$$

$$T_2 = 273 + \underline{75.0^{\circ}\text{C}} = \underline{348\text{ K}}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \text{اكتب معادلة قانون شارل:}$$

جد قيمة V_2 ، بضرب طرفي المعادلة في T_2 :

$$V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1}$$

عُوض قيم المعطيات في المعادلة؛ لإيجاد قيمة V_2 :

$$V_2 = \frac{(2.32\text{ L}) (348\text{ K})}{(313\text{ K})} = \underline{2.58\text{ L}}$$

3. تقويم الإجابة

إذا ازدادت درجة الحرارة - على تدريج كلفن - ازيداً طفيفاً، فإن الحجم سيزداد بمقدار بسيط أيضاً. أمّا وحدة الإجابة، فهي L; وهي وحدة لقياس الحجم.

(تابع) ١ - ٧ قوانين الغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حلّ اقرأ المثال محلول ٣-٧ من كتاب المدرسي.

جرب ما يلي:

قانون جاي- لوساك

تُستعمل مع المثال محلول

١٠١ صفحة ٣-٧

●----- المسألة -----●

إذا كان ضغط عينة من غاز التبريد عند درجة حرارة 22.0°C يساوي 4.0 atm ، فما ضغط الغاز إذا انخفضت درجة الحرارة إلى 0.0°C ؟

١. تحليل المسألة

المطلوب:

المُعطيات:

$$P_2 = ? \text{ atm}$$

$$P_1 = 4.0 \text{ atm}$$

$$T_1 = 22.0^{\circ}\text{C}$$

$$T_2 = 0.0^{\circ}\text{C}$$

استعمل قانون جاي- لوساك والقيم المُعطاة أعلاه لإيجاد قيمة P_2 .

٢. حساب المطلوب

حول قيمتي T_1 و T_2 السيليزية إلى درجة حرارة مطلقة بوحدة الكلفن K:

$$T_1 = 273 + 22.0^{\circ}\text{C} = 295 \text{ K}$$

$$T_2 = 273 + 00.0^{\circ}\text{C} = 273 \text{ K}$$

اكتب معادلة قانون جاي- لوساك:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

: T_2 ، بضرب طرفي المعادلة في

$$P_2 = \frac{P_1(T_2)}{(T_1)}$$

عُرض قيم المُعطيات في المعادلة، لإيجاد قيمة P_2 :

$$P_2 = \frac{(4.0 \text{ atm}) (273 \text{ K})}{(295 \text{ K})} = 3.7 \text{ atm}$$

٣. تقويم الإجابة

قللت درجة الحرارة، فقل الضغط.

الغازات

1 - 7 قوانين الغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صف القانون العام للغازات.

القانون العام للغازات

قانون واحد جامع يتضمن المتغيرات التي تؤثر في سلوك الغازات جميعها؛ الضغط، والحجم، ودرجة الحرارة.

تُستعمل مع الصفحة 102

اكتب معادلة القانون العام للغازات.

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

يتناصف الضغط تناصفيًا عكسيًا مع الحجم، وطريديًا مع درجة الحرارة. أما الحجم فيتناسب تناصفيًا طريديًا مع درجة الحرارة.

تُستعمل مع المثال المحلول
7-4، صفحة 103

حل اقرأ المثال المحلول 7-4 من كتابك المدرسي.

جرب ما يلي:

المسألة

إذا كان حجم عينة من الغاز يساوي 1.0 L تحت ضغط مقداره 100 kPa، ودرجة حرارة 30°C، فاحسب درجة الحرارة إذا أصبح الضغط 200 kPa، والحجم 0.5 L

1. تحليل المسألة

المطلوب: المعطيات:

$$T_2 = ?^{\circ}\text{C}$$

$$P_1 = 100 \text{ KPa}$$

$$P_2 = 200 \text{ KPa}$$

$$T_1 = 30^{\circ}\text{C}$$

$$V_1 = 1.0 \text{ L}$$

$$V_2 = 0.5 \text{ L}$$

تذكّر أنّ الحجم يزداد بازدياد درجة الحرارة، ويقلّ بازدياد الضغط.

الغازات

1 - 7 قوانين الغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

2. حساب المطلوب

حول قيمة T_1 إلى درجة حرارة مطلقة بوحدة الكلفن K:

$$T_1 = \underline{273} + 30.0 \text{ } ^\circ\text{C} = \underline{303} \text{ K}$$

اكتب معادلة القانون العام للغازات:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

لإيجاد قيمة T_2 ، اضرب طرفي المعادلة في T_2 :

$$\frac{T_2 P_1 V_1}{T_1} = P_2 V_2$$

ثم اضرب طرفي المعادلة في T_1 :

$$T_2 P_1 V_1 = \underline{P_2 V_2 T_1}$$

ومن ثم اقسم طرفي المعادلة على $P_1 V_1$:

$$T_2 = \frac{P_2 V_2 T_1}{P_1 V_1}$$

عرض قيم المُعطيات في المعادلة لإيجاد قيمة T_2 بوحدة الكلفن K:

$$T_2 = \frac{200.0 \text{ KPa} \times 0.50 \text{ L} \times 303 \text{ K}}{100.0 \text{ KPa} \times 1.00 \text{ L}} = 303 \text{ K}$$

جد قيمة T_2 بوحدة درجة الحرارة السليزية ${}^\circ\text{C}$:

$$T_2 = \underline{303} \text{ K} - 273 \text{ K} = \underline{30.0} \text{ } {}^\circ\text{C}$$

3. تقويم الإجابة

عندما ازداد الضغط، وقل الحجم بكميات متناسبة، بقيت درجة الحرارة ثابتة.



الغازات

2 - 7 قانون الغاز المثالي

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 2 من هذا الفصل، ثم اكتب ثلاثة أسئلة قد تخطر في ذهنك بعد قراءة العناوين الرئيسية والتعليقات.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

2.

3.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي العدد نفسه من الجسيمات عند درجة الحرارة والضغط نفسيهما.

الحجم الذي يشغله 1 mol من الغاز عند درجة حرارة 0.0°C ، وضغط جوي 1 atm

قيمة ثابتة تُحسب عن طريق التجربة، وتعتمد وحدته على الوحدات المستعملة للضغط.

قانون يصف السلوك الفيزيائي للغاز المثالي من حيث: الضغط، والحجم، ودرجة الحرارة، وعدد مولات الغاز المتوافرة.

المفردات الجديدة

مبدأ أو جادرو

الحجم المولاري

ثابت الغاز المثالي (R)

قانون الغاز المثالي

(تابع) 2 - 7 قانون الغاز المثالي

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

فَسْر مبدأ أفوجادرو، بإكمال الفقرة التالية:

ينصُّ مبدأ أفوجادرو على أنّ "الأحجام المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي العدد نفسه من الجسيمات عند درجة الحرارة والضغط نفسها". الحجم المولاري لأيّ غاز هو الحجم الذي يشغله 1 mol من الغاز عند درجة حرارة 0.0°C ، وضغط جوي 1 atm .

مبدأ أفوجادرو

تُستعمل مع الصفحتين
106-105

حول أحجام الغاز التالية - عند الظروف المعيارية STP - إلى مولات، باستعمال L/mol

كمعامل تحويل.

$$2.50\text{ L} \times \frac{1 \text{ mol}}{22.4\text{ L}} = 0.112 \text{ mol}$$

$$7.34\text{ L} \times \frac{1 \text{ mol}}{22.4\text{ L}} = 0.328 \text{ mol}$$

$$4.7\text{ L} \times \frac{1 \text{ mol}}{22.4\text{ L}} = 0.21 \text{ mol}$$

(تابع) 2 - 7 قانون الغاز المثالي

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حلل قانون الغاز المثالي.

$PV = nRT$ تُكتب المعادلة على صورة

حيث إن:

P : يُمثل الضغط

V : يُمثل الحجم

n : يُمثل عدد مولات الغاز الموجودة

R : يُمثل ثابت الغاز المثالي

T : تُمثل درجة الحرارة

قانون الغاز المثالي

ستعمل مع الصفتين

108-107

ينصُّ قانون الغاز المثالي على أنَّ "حجم الغاز يتتناسب تناضيًّا طردًياً مع عدد مولات الغاز

الموجودة. كما أنَّ درجة حرارته بوحدة الكلفن تتتناسب تناضيًّا عكسيًّا مع ضغطه. وتعتمد قيمة

(R) على الوحدات المستعملة للضغط".

صف خواص الغاز المثالي.

غاز ليس له حجم لجسيماته، ولا توجد أي قوى تجاذب بين جزيئاته.

صف خواص الغاز الحقيقي.

غاز لجسيماته حجم، ويوجد فيه قوى تجاذب بين الجزيئات.

(تابع) 2 - 7 قانون الغاز المثالي

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

لُخْص املأ الفراغات التالية لمساعدتك على تدوين الملاحظات، بعد قراءة المثال المحلول
6-7 من كتابك المدرسي.

- **المسألة** احسب عدد مولات عيّنة من الغاز، حجمها 3.0 L ، عند درجة حرارة $3.0 \times 10^2 \text{ K}$ ، وضغط جوي مقداره 1.5 atm .

1. تحليل المسألة

المطلوب: المعطيات:

$$n = ? \text{ mol}$$

$$V = 3.0 \text{ L}$$

$$T = 3.0 \times 10^2 \text{ K}$$

$$P = 1.5 \text{ atm}$$

$$R = 0.0821 \frac{\text{L.atm}}{\text{mol.K}}$$

استعمل قانون الغاز المثالي والقيم المُعطاة أعلاه لإيجاد قيمة n .

2. حساب المطلوب

اكتب معادلة قانون الغاز المثالي:

$$PV = nRT$$

جد قيمة n ، بقسمة طرفي المعادلة على RT .

$$n = \frac{PV}{RT}$$

عُوّض قيم المُعطيات في المعادلة، لإيجاد قيمة n :

$$n = \frac{(1.50 \text{ atm})(3.0 \text{ L})}{(0.0821 \frac{\text{L.atm}}{\text{mol.K}})(3.00 \times 10^2 \text{ K})} = 0.18 \text{ mol}$$

$$n = 0.18 \text{ mol}$$

3. تقويم الإجابة

يجب أن تُماثل الإجابة التوقعات التي تُشير إلى أنّ عدد المولات سيكون أقلّ من مول واحد.
أمّا وحدة الإجابة، فهي المول.

الغازات

3 - 7 الحسابات المتعلقة بالغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 3 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات التالية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍ بارز.
- اقرأ الجداول والرسوم البيانية كلّها.
- انظر إلى الصور جميعها، ثم اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذكّر ما تعرّفه عن هذا الموضوع.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها حول الحسابات المتعلقة بالغازات.

.1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2.

.3.

عرف المصطلح التالي:

المفردات الأكاديمية

العلاقة الكمية بين شيئين.

النسبة

(تابع) 3 - 7 الحسابات المتعلقة بالغازات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

جُدْ عدد المولات والأحجام لتفاعل التالي، مستعيناً بالشكل 10-7 بصفته مرجعاً لذلك.



تُمثّل معاملات الحدود في المعادلة الموزونة الكميات المولارية، والحجم النسبية.

لُخص املا الفراغات التالية لمساعدتك على تدوين الملاحظات، بعد قراءة المثال المحلول

7-7

● المسألة

جد حجم غاز الأكسجين اللازم لحرق L 4.00 من غاز البروبان (C_3H_8) على نحوٍ كامل.

1. تحليل المسألة


المطلوب:

$$\text{O}_2 = ? \text{L} \quad \text{حجم غاز البروبان } \text{C}_3\text{H}_8 = 4.00 \text{ L}$$

استعمل حجم المادة المُعطاً وقيمة L 4.00 لإيجاد الحجم المطلوب ل الاحتراق.

2. حساب المطلوب

اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة لاحتراق غاز البروبان: C_3H_8



اكتب النسبة الحجمية:

$$\frac{5 \text{ vol O}_2}{1 \text{ vol C}_3\text{H}_8}$$

اضرب حجم غاز البروبان C_3H_8 المعطى في النسبة الحجمية:

$$4.00 \text{ L C}_3\text{H}_8 \times \frac{5 \text{ vol O}_2}{1 \text{ vol C}_3\text{H}_8} = 20.0 \text{ L O}_2$$

3. تقويم الإجابة

تبيّن معاملات المواد المتفاعلة أن كمية غاز الأكسجين المستهلكة أكبر من كمية غاز البروبان.

أمّا وحدة الإجابة، فهي اللتر; وهي وحدة قياس الحجم.

الحسابات الكيميائية:
حساب الحجم

تُستعمل مع الصفحتين
114-113

مسائل حساب الحجم

تُستعمل مع المثال المحلول
7-7، صفحة 114

الغازات

ملخص الفصل

بعد قراءتك لهذا الفصل، لُخّص ما قرأت، ثُمّ قابل قوانين الغازات بمعادلاتها فيما يلي:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \cdot 1 \quad \underline{4} \quad \text{قانون الغاز المثالي}$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \cdot 2 \quad \underline{3} \quad \text{قانون جاي - لوساك}$$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \cdot 3 \quad \underline{1} \quad \text{قانون شارل}$$

$$PV = nRT \cdot 4 \quad \underline{5} \quad \text{القانون العام للغازات}$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \cdot 5 \quad \underline{2} \quad \text{قانون بوويل}$$

مراجعة

- اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخصك.
- ادرس المفردات، والتعريفات العلمية.
- راجع الواجبات المنزلية اليومية.
- راجع الجداول، والرسوم البيانية، ووسائل الإيضاح.
- راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كلّ قسم من الفصل.
- ألق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية الفصل.
- راجع أسئلة تقويم الفصل الموجودة في نهاية الفصل.

الربط مع واقع الحياة

فسّر لماذا يزداد حجم بالون عند نفخه، ولا ينفجر بصورة مباشرة عند زيادة أيّ ضغط عليه؟

عندما تزداد كمية الغاز، يزداد الحجم. وكلما ازداد الحجم، يبقى الضغط ثابتاً.

الهيدروكربونات

قبل أن تقرأ

عرف المصطلحين التاليين:

المفردات الجديدة

الرابطة الكيميائية التي تنتُج عندما تتشارك الذرات في إلكترونات التكافؤ؛ للوصول إلى

الرابطة التساهمية


حالة الاستقرار.

تراكيب لويس

طريقة تُستعمل التمثيل النقطي للإلكترونات لبيان كيفية توزيع الإلكترونات حول الجزيئات.

الفصل 4

رسم تركيب لويس لجزيء الأمونيا NH_3 .



الفصل 6

قارن بين درجتي الانصهار والغليان.

تُشير درجتي الانصهار والغليان إلى تغيرات الحالة، حيث يتحول الصلب إلى سائل عند درجة

الانصهار، ثم يتحول إلى غاز عند درجة الغليان.

الهيدروكربونات

1 - 8 مقدمة إلى الهيدروكربونات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 1 من هذا الفصل، مستفيداً من الإرشادات التالية:

- اقرأ عنوانين هذا القسم كلّها.
- اقرأ الكلمات المكتوبة بخطٍ بارز.
- انظر إلى الأشكال جميعها، ثم اقرأ التعليقات الخاصة بها.
- تذّكر ما تعرفه عن هذا الموضوع.

اكتب ثلاث حقائق اكتشفتها حول الهيدروكربونات.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها. إجابات محتملة :

1. تحتوي الهيدروكربونات على عنصري الهيدروجين والكربون فقط.
2. ترتبط ذرات الكربون معًا بروابط تساهمية؛ أحادية، وثنائية، وثلاثية.
3. يمكن الحصول على العديد من الهيدروكربونات من النفط والوقود الأحفوري.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

المفردات الجديدة

مركب يحتوي على الكربون، باستثناء أكسيد الكربون، والكربونات، والكريبيات.

المركب العضوي

أبسط المركبات العضوية التي تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط.

الهيدروكربون

الهيدروكربون الذي يحتوي على روابط تساهمية أحادية فقط.

الهيدروكربون المُشبع

الهيدروكربون الذي يحتوي على رابطة ثنائية أو ثلاثية على الأقل.

الهيدروكربون غير المشبع

عملية فصل مكوّنات النفط بعضها عن بعض إلى مكونات أبسط.

التقطير التجزيئي

عملية تتكسر فيها المكوّنات الثقيلة للبترول إلى جزيئات صغيرة.

التكسير الحراري

(تابع) 1 - 8 مقدمة إلى الهيدروكربونات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

فسّر تطور الفهم المعاصر لمصطلح المركب العضوي.

في مطلع القرن التاسع عشر، كان الكيميائيون يطلقون اسم المركبات العضوية على مركبات الكربون التي تُنتِجها المخلوقات الحية.



المركبات العضوية

تُستعمل مع الصفحتين
131-130

وباستعمال نظرية دالتون، استطاع الكيميائيون تحضير مركبات عديدة؛ ولكنها غير كربونية. ويعزى هذا الفشل إلى إيمانهم بمبدأ الحيوية، الذي يعني أن تحضير المركبات العضوية يحتاج إلى قوة حيوية. أما تجربة فوهر في تحضير اليوريا، فكانت الشارة التي أطلقت سلسلة من التجارب، وحثّت الكيميائيين الآخرين على القيام بسلسلة من التجارب المشابهة، التي أثبتت بطلان مبدأ الحيوية.




والاليوم، يُطلق اصطلاح المركبات العضوية على المركبات جميعها التي تحوي الكربون، باستثناء أكسيد الكربون، والكربونات، والكريبيات؛ التي تُعدّ مركبات غير عضوية.

فسّر سبب وجود العديد من المركبات التي تحتوي على الكربون، بإكمال الفقرة التالية:

يسمح التوزيع الإلكتروني للكربون بتكونه أربع روابط تساهمية. وترتبط ذرات الكربون في المركبات العضوية بندرات الهيدروجين، وعناصر أخرى قريبة من الكربون في الجدول الدوري. كما ترتبط ذرات الكربون بعضها البعض لتكون سلسل طويلة.

عنون الشبكة التالية؛ بكتابة الاسم الصحيح لكل نموذج من نماذج جزيء الميثان.



تُستعمل مع الصفحتين
132-131

(تابع) 1 - 8 مقدمة إلى الهيدروكربونات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

رتب الملحّص التالي:

I. طائق ارتباط ذرات الكربون بعضها ببعض.

A. الروابط التساهمية الأحادية

1. مشاركة زوج واحد من الإلكترونات

2. تسمى الهيدروكربونات المشبعة

B. الرابطة التساهمية الثنائية

1. مشاركة زوجين من الإلكترونات

2. تسمى الهيدروكربونات غير المشبعة

C. الروابط التساهمية الثلاثية

1. مشاركة ثلاثة أزواج من الإلكترونات

2. تسمى المركبات غير المشبعة

**الروابط المُضاعفة
بين ذرات الكربون**

تُستعمل مع الصفحة 132

رسم نموذجاً لكل رابطة بين C-C، مستفيداً من الإيضاحات الموجودة في صفحة 128 من كتاب المدرسي.

الرابطة التساهمية الثلاثية	الرابطة التساهمية الثنائية	الرابطة التساهمية الأحادية
$-C \equiv C-$	$\begin{array}{c} \diagup \\ C=C \\ \diagdown \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ -C-C- \\ \end{array}$

(تابع) 1 - 8 مقدمة إلى الهيدروكربونات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

حدّد المصادر الطبيعية للهيدروكربونات بإكمال الجمل التالية:

يُعدّ النفط المصدر الطبيعي الرئيس للهيدروكربونات؛ وهو خليط يحوي آلاف المركبات المختلفة. ويصبح النفط أكثر فائدة للإنسان عندما يُفصل إلى مكونات أبسط، التي تسمى مشتقات. وتتم عملية الفصل بغلي النفط، ثم جمع مشتقاته في أثناء تكاثفها عند درجات حرارة متباعدة، وتسمى هذه الطريقة التقطير التجزئي.

تنقية الهيدروكربونات

تُستعمل مع الصفحتين
134-133

رُتب خطوات عملية التقطير التجزئي.

3 تصاعد الأبخرة إلى الأعلى في برج التجزئة.

1 تكون درجة الحرارة قريبة من 400°C في أسفل برج التجزئة.

5 تبقى الهيدروكربونات التي تحوي عدداً قليلاً من ذرات الكربون، على صورة بخار حتى تصل إلى أكثر المناطق برودة، في أعلى برج التجزئة.

4 تتكاثف الهيدروكربونات ذات الكتلة الجزيئية الكبيرة قريباً من أسفل البرج، حيث تُسحب إلى الخارج.

2 يغلي النفط، ثم يبدأ بالتصاعد تدريجياً إلى أعلى.

اكتب أسمى العمليتين التاليتين عن يمين تعريف كل منها.

1. التقطير التجزئي 2. التكسير الحراري

التكسير الحراري عملية تكسير الجزيئات الكبيرة للنفط إلى جزيئات صغيرة.

التقطير التجزئي عملية فصل النفط إلى مكونات أبسط.

وضح لماذا يفضل استعمال الهيدروكربونات ذات السلسل المتفرعة على الهيدروكربونات ذات السلسل المستقيمة في وقود السيارات.

أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

تصنيف الجازولين

تُستعمل مع الصفحتين
135-134

تحترق معظم الهيدروكربونات ذات السلسل المستقيمة بصورة غير منتظمة. فهي؛ إما أن

تشتعل مبكراً، أو متأخراً، حيث يؤدي الاحتراق المبكر إلى حدوث فرقعة. في حين تحرق

الهيدروكربونات ذات السلسل المتفرعة بانتظام؛ مما يساعد على منع حدوث هذه الفرقعة.

الهيدروكربونات

2 - 8 الألكانات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 2 من هذا الفصل، ثم اكتب ثلاثة أسئلة قد تخطر في ذهنك بعد قراءة العناوين الرئيسية والتعليقات.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

مركب هيدروكربوني يحتوي على روابط تساهمية أحادية فقط بين ذراته.

المفردات الجديدة

الألكان

السلسلة المتماثلة

السلسلة الرئيسية

المجموعة البديلة

الهيدروكربون الحلقي

الألكان الحلقي

عرف المصطلح التالي:

المفردات الأكاديمية

الشيء أو الشخص الذي يحل محل الآخر.

البديل

(تابع) 2 - 8 الألكانات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

الألكانات ذات السلاسل المستقيمة

تُستعمل مع الصفحات
138-136

قارن النماذج التالية بعضها بعض في الجدول التالي:

وصف النموذج	نوع النموذج
لا تعطي معلومات عن الشكل الهندسي للجزيء.	1. الصيغة الجزيئية
تبين ترتيب الذرات بوجه عام، ولا تعطي الشكل الهندسي الدقيق.	2. الصيغة البنائية
يعطي صورة منطقية عن شكل الجزء لو تمكنا من رؤيته.	3. النموذج الفراغي
يُبيّن التركيب الهندسي للجزيء بصورة أكثر وضوحاً.	4. نموذج الكرة والعصا

صف الألكانات ذات السلاسل المستقيمة، بإكمال الجمل التالية:

تُسمى المركبات الأربع الأولى في مجموعة الألكانات ذات السلاسل المستقيمة: الميثان، والإيثان، والبروبان، والبيوتان. إذ تنتهي أسماء الألكانات جميعها بالحرفين (ان).

وبيما أنّ المركبات الأربع الأولى قد سُميت قبل الفهم الكامل لتركيب الألكانات، فإنّ أسماءها ليست مشتقة من بادئة رقمية، كما هو الحال في الألكانات التي تحتوي على خمس ذرات كربون فما فوق في سلاسلها. ويستعمل الكيميائيون الصيغ البنائية المختصرة لتوفير الحيز.

فسّر الصيغة البنائية للهيدروكربونات التالية مستعيناً بالمثال 1 في إجاباتك:

1. يتكون الميثان من ذرة كربون واحدة، وأربع ذرات هيدروجين.
2. يتكون البيوتان من أربع ذرات كربون، وعشر ذرات هيدروجين.
3. يتكون الأوكتان من ثمان ذرات كربون، وثمان عشرة ذرة هيدروجين.
4. يتكون الديكان من عشر ذرات كربون، واثنين وعشرين ذرة هيدروجين.

حلّ كيف يظهر مفهوم السلسلة المتماثلة في الصيغة البنائية المختصرة لمركب التوان؟

يمكن التعبير عن العلاقة بين عدد ذرات كلّ من الهيدروجين والكربون بالصيغة (C_nH_{2n+2}) .

وبذلك يمكن التعبير عن التوان بالصيغة $CH_3(CH_2)_7CH_3$; للدلالة على وجود سبع ذرات كربون، وأربعة عشرة ذرة هيدروجين في السلسلة المتماثلة.

(تابع) 2 - 8 الألكانات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

قارن بين ثلاث خصائص لكل من البيوتان والأيزوبيوتان.

ترتّب ذرات الكربون في البيوتان على نحو متعرّج، حيث ترتبط كل ذرة كربون طرفية بثلاث ذرات هيدروجين وذرة كربون، في حين تترتّب ذرات الكربون الوسطية بذرتي هيدروجين وذرتي كربون.

أما ذرات الكربون في الأيزوبيوتان، فتشكلّ ثلاث ذرات كربون على صورة سلسلة واحدة، في حين تتفرّع الرابعة من ذرة الكربون الوسطية. وفي المقابل، فإن كل ذرة كربون طرفية تتصل بثلاث ذرات هيدروجين، وذرة كربون. في حين تترتّب ذرة الكربون الوسطية بثلاث ذرات كربون، وذرة هيدروجين واحدة.

صف كيفية تسمية الألكانات ذات السلاسل المتفرّعة.

يمكن أن تكون للألكانات ذات السلاسل المستقيمة والمترّعة الصيغة الجزيئية نفسها.

المبدأ

لذا، يجب أن يصف اسم المركب العضوي الصيغة الجزيئية للمركب وصفاً دقيقاً.

طريقة التسمية

يمكن تصوّر الألكانات ذات السلاسل المتفرّعة على أنها سلسلة مستقيمة من ذرات الكربون، يتفرّع منها ذرات، أو مجموعات من ذرات الكربون الأخرى.

التسمية، الخطوة 1

تُسمى أطول سلسلة من ذرات الكربون المتصلة السلسلة الرئيسية.

التسمية، الخطوة 2

تُسمى التفرّعات الجانبية جميعها المجموعات البديلة، حيث تَظَهُر كأنّها استبدلت ذرة هيدروجين في السلسلة المستقيمة.

التسمية، الخطوة 3

تُسمى كل مجموعة بديلة متفرّعة من السلسلة الرئيسية الألكان ذات السلسلة المستقيمة، الذي يحتوي على عدد ذرات الكربون نفسه، مع استبدال الحرفين الآخرين (ان) بالحروفين (يل).

الألكانات ذات السلاسل المتفرّعة

تُستعمل مع الصفحة 138

تسمية الألكانات ذات السلاسل المتفرّعة

تُستعمل مع الصفحتين

140-139

(تابع) 2 - 8 الألكانات



الهيدروكربونات

3 - 8 الألkinات والألكاينات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 3 من هذا الفصل، مرتكزاً على العناوين الرئيسة والفرعية، والكلمات المكتوبة بخطٍ بارز، إضافة إلى الأفكار الرئيسة، ثم لخُص الأفكار الرئيسة الواردة في هذا القسم في الفراغ التالي:

أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

إجابة محتملة: يجب أن تحتوي الألkinات على رابطة تساهمية ثنائية واحدة على الأقل بين ذرتين كربون، وهذا ما يميزها عن الألكاينات التي يجب أن تحتوي على روابط تساهمية ثلاثة واحدة على الأقل بين ذرتين كربون. من جهة أخرى، تختلف خصائص الألkinات والألكاينات عن مثيلاتها من الألكانات؛ إذ تُستعمل قواعد نظام التسمية الأيوپاك (IUPAC) للتسمية الهيدروكربونات.

المفردات الجديدة

الألkin

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:
مركب هيدروكربوني غير مشبع، يحتوي على رابطة تساهمية ثنائية واحدة أو أكثر بين ذرات الكربون في سلسلته.

الألكاين

مركب هيدروكربوني غير مشبع، يحتوي على رابطة تساهمية ثلاثة واحدة أو أكثر بين ذرات الكربون في سلسلته.

(تابع) 3 - 8 الألكيّنات والألّكايّنات

التفاصيل

الفكرة الرئيسة

اكتب خمس حقائق حول الألكيّنات نوقشت في هذا الجزء من الفصل.

1. بما أنه يجب على الألكيّنات أن تحوي رابطة تساهمية ثنائية بين ذرات الكربون، فإنه لا يوجد ألكين بذرة كربون واحدة.

2. تحتوي أبسط الألكيّنات على ذرتين كربون، بينما رابطة تساهمية ثنائية.

3. تشارك الإلكترونات الأربع المتبقية مع ذرتين كربون وأربع ذرات هيدروجين لتكوين جزيء الإيثين.

4. تُشكّل الألكيّنات التي تحوي رابطة تساهمية ثنائية سلسلة متوجّسة من المركبات.

5. الصيغة العامة للألكيّنات هي C_nH_{2n} .

رتب العوامل التي تعتمد عليها تسمية الألكيّنات التي تحتوي على أربع ذرات كربون أو أكثر في سلسلتها وفق تسلسل أرقامها، مستعملاً المخطط الشبكي التالي:



لُخص استعمال ما يلي لمساعدتك على تدوين الملاحظات الواردة في المثال 8-3 في كتابك المدرسي.

المُسألة
• سِمّ الألّكين المجاور.

الألّكينات

تُستعمل مع الصفحتين 147-146

تسمية الألّكينات ذات السلاسل المتفرّعة

تُستعمل مع المثال المحلول 8-3، صفحة 148

(تابع) 3 - 8 الألكينات والألكاينات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

1. تحليل المسألة

يُعد المركب الأكيني ذا سلسلة متفرعة يحتوي على رابطة ثنائية واحدة، إضافة إلى مجموعتي الألكيل. استخدم قواعد نظام الأيونيك IUPAC في تسميته.

2. حساب المطلوب


- a. تحتوي أطول سلسلة كربونية متصلة من ذرات الكربون التي توجد فيها الرابطة الثنائية على 7 ذرات كربون. ونسمى الألكان الذي يحتوي على 7 ذرات كربون "هبتان". وعليه، يصبح الاسم هبتين؛ لاحتواه على رابطة تساهمية ثنائية.



- b. وc. رقم السلسلة على أن يعطى أصغر رقم للرابطة التساهمية الثنائية، ثم سُمِّ كل مجموعة بديلة متفرعة منها.



- d. حدد عدد المجموعات البديلة المتفرعة الموجودة، ثم عين الbadene الصحيحة التي تمثل العدد الصحيح، مضيفاً إليها أرقام مواقعها لتحصل على الbadene كاملة.



- e. ليس هناك حاجة إلى كتابة أسماء المجموعات البديلة المتفرعة وفق الترتيب الهجائي؛ لأنها متماثلة.

- f. أدخل الbadene الكاملة إلى اسم سلسلة الألكين الرئيسة، واستخدم الفواصل بين الأرقام، والشرطات (-) بين الأرقام والكلمات، ثم اكتب الاسم:
4.6-ثنائي ميثيل - 2- هبتين.

3. تقويم الإجابة

تحتوي أطول سلسلة كربونية على الرابطة الثنائية، وموقعها له أصغر رقم ممكن. استعملت الbadenes الصحيحة وأسماء مجموعات الألكيل لتعيين التفرعات.

●

قارن بين الألكينات والألكاينات.

كلتاهم غير مشبعة، ونشاطها الكيميائي عالي. وتحتوي الألكينات على رابطة تساهمية ثنائية، في حين تحتوي الألكاينات على رابطة تساهمية ثلاثية.

الألكاينات

ستعمل مع الصفحتين
151-150

الهيدروكربونات

4 - 8 متشكّلات الهيدروكربونات

التفاصيل

الفكرة الرئيسة

تصفح القسم 4 من هذا الفصل، ثم اكتب سؤالين قد يخطران في ذهنك بعد قراءة العناوين الرئيسية والتعليقات.

1. أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

.2

.3

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

مركبان أو أكثر، لها الصيغة الجزيئية نفسها، إلا أنها تختلف في صيغها البنائية.

المفردات الجديدة

المتشكلات

المتشكل البنائي

متشكّلات لها الصيغة الجزيئية نفسها، إلا أن ترتيب الذرات فيها مختلف، وتحتّل في خواصها الكيميائية والفيزيائية.

الكيميائية والفيزيائية.

المتشكل الفراغي

المتشكل الهندسي

متشكّلات ناتجة من اختلاف ترتيب المجموعات حول الرابطة التساهمية الثنائية واتجاهها.

الكيرالية

خاصية يوجد فيها الجزيء في صورتين إحداها تشبه صورة اليد اليمنى، والأخرى تشبه صورة

اليد اليسرى.

ذرة الكربون غير المتماثلة

المتشكل الضوئي

متشكّلات تنتّج من ترتيبات واتجاهات فراغية لـ 4 مجموعات مختلفة حول ذرة الكربون نفسها،

وهي تملك الخواص الكيميائية والفيزيائية نفسها، لكنّها تختلف في التفاعلات التي تكون فيها

الكيرالية مهمة.

الدوران الضوئي

عملية ناجمة عن مرور الضوء المستقطب خلال محلول يحتوي على متشكّل ضوئي، محدثة دوراناً

لمستوى الاستقطاب إلى اليمين بواسطة المتشكّل (D-)، أو إلى اليسار بواسطة المتشكّل (L-).

(تابع) 4 - 8 متشكلات الهيدروكربونات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

رتب الملحّص التالي:

I. **المتشكلات** مرّكّبان أو أكثر لها الصيغة الجزيئية نفسها، إلّا أنها تختلف في صيغها البنائيّة.

A. هناك نوعان من المتشكلات هما:

1. المتشكلات البنائيّة

a. تكون الذرات مرتبطة ببعضها بعضًا بترتيب مختلف.

b. لها خواص فيزيائية وكميّانية مختلفة، رغم أن لها الصيغة الجزيئية نفسها.

i. تتضمّن الأمثلة، بنتان، و₂-ميثيل بيوتان، و₂-ثنائي ميثيل بروبان.

2. المتشكلات الفراغية

a. تمتلك الذرات جميعها الترتيب نفسه، ولكنها تختلف في ترتيبها الفراغي.

i. ذرتا كربون بينهما رابطة تساهمية أحادية، تدوران بحرية.

ii. ذرتا كربون بينهما رابطة تساهمية ثنائية، لا تتحرّكان.

b. المتشكلات الهندسية.

i. تُستُّج من اختلاف ترتيب المجموعات حول الرابطة التساهمية الثنائيّة.

ii. قد تُسبِّب **مخاطر صحية** مع متشكلات الحمض الدهنية (ترانس).

iii. ليس للمتشكّل (سيس) في الحمض الدهني نفسه أيّ مخاطر صحية.

صف الكيرالية، بإكمال لوحه التدفق التالية:

التي ترتبط بها أربع ذرات، أو مجموعات ذرات مختلفة.

يحتوي المركب ذرة كربون غير متّماملة.

تحدث الكيرالية عندما

إذ يمكن للمجموعات الأربع أن تترتّب بطريقتين مختلفتين في الفراغ.

حيث تكون الجزيئات مختلفّة، رغم أنّها تبدو متشابهة تمامًا.

وتسُمّى هذه المتشكلات **المتشكلات الضوئية**.

المتشكلات البنائيّة

تُستعمل مع الصفحة 153

المتشكلات الفراغية

تُستعمل مع الصفحة 154


الكيرالية

تُستعمل مع الصفحة 155

(تابع) 4 - 8 متشكلات الهيدروكربونات

التفاصيل

الفكرة الرئيسية



المتشكلات الضوئية

تُستعمل مع الصفتين

157-156



متشكلات هندسية

ترانس-1، 2-ثنائي كلورو إيثين سيس-1، 2-ثنائي كلورو إيثين



متشكلات هندسية

قارن

فسّر ما أوجه الشبه بين زوج من الأحذية وبليورات حمض التارتاريك؟

الفردتان: اليسرى، واليمنى، تمثل كل واحدة صورة مرآة للأخرى، كما هو الحال بالنسبة إلى حمضي التارتاريك -D، والتارتاريك

-L، حيث تعنى (D) إلى جهة اليمين و (L) إلى جهة اليسار. وتُستعمل المخلوقات الحية واحداً من هذه المتشكلات، الذي يناسب

إنزيماتها تماماً، كما هو حال فردة الحداء اليمنى التي تناسب القدم اليمنى، وبالعكس.

الهيدروكربونات

5 - 8 الهيدروكربونات الأромاتية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

تصفح القسم 5 من هذا الفصل، مركزاً على العناوين الرئيسة والفرعية، والكلمات المكتوبة بخطٍ بارز، إضافة إلى الأفكار الرئيسة، ثم لخص الأفكار الرئيسة الواردة في هذا القسم في الفراغ التالي:

أقبل الإجابات المعقولة جميعها.

إجابة محتملة: يساعدنا نموذج جزيء البنزين على فهم الهيدروكربونات الأромاتية والأليفاتية

غير المشبعة. أما الوقود الأحفوري، فهو مصدر كلّ منهما، خاصة التقطير الذي يُعد خليطًا معقدًا

ومهما، يستفيد منه الناس عندما يُفصل بوساطة التقطر التجزئي، ثم يُرسّ إلى مكونات

صغريرة بوساطة التكسير الحراري.

استعن بكتابك المدرسي لتعريف ما يلي:

المفردات الجديدة

المركب الأروماتي

المركب الأليفاتي

مركب عضوي يحتوي على حلقات البنزين كجزء من بنائه.

يشمل الهيدروكربونات، مثل: الألكانات، والألكينات، والألكاينات.

(تابع) 5-8 الهيدروكربونات الأروماتية

التفاصيل

الفكرة الرئيسية

صنف خصائص المركبات الأروماتية والأليفاتية.


النشاط الكيميائي	الخصائص البنائية	المركيبات الأروماتية
أقل نشاطاً	تحتوي على حلقات بنزين، وأحياناً تحتوي على حلقتي بنزين أو أكثر ملتحمة معاً.	المركيبات الأروماتية
أكثر نشاطاً	تحتوي على رابطة تساهمية؛ أحادية، أو ثنائية، أو ثلاثية.	المركيبات الأليفاتية

المركبات الأروماتية

ستعمل مع الصفحتين 162-161

نَمِذْجَ ارْسَمْ نَمُوذْجًا لِنَظَامِ الْحَلَقَاتِ الْمَلْتَحَمَةِ.

إجابة محتملة : يمكن أن يرسم الطالب نماذج مشابهة لكل من النفلاتين، والأنثراسين .



أنثراسين




فنالين

بَيْنَ كَيْفَ تُرْقَمَ حَلْقَةُ الْبَنْزِينِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مَجْمُوعَاتِ بَدِيلَةٍ مُتَفَرِّعَة.

تُرْقَمَ الْحَلْقَةُ الْمُتَفَرِّعَةُ مُثْلَ الْأَكَانَاتِ الْحَلَقِيَّةِ الْمُتَفَرِّعِّةِ تَمَامًا، بِطُرِيقَةٍ تُعْطِي أَصْغَرَ أَرْقَامَ

مُمْكِنَةٍ لِمَوْاقِعِ الْمَجْمُوعَاتِ الْبَدِيلَةِ أَوْ (الْتَّفَرِعَاتِ).

رَقْمُ حَلْقَةِ الْبَنْزِينِ الْمُتَفَرِّعَةِ التَّالِيَةِ، ثُمَّ سَمِّهَا.



– إيثيل – 1. 4 -ثنائي ميثيل بنزين

الهيدروكربونات

ملخص الفصل

بعد قراءتك لهذا الفصل، لُّحِّصَ ما قرأت، ثُمَّ صنَّفَ الأنواع والنماذج التي تمثل المركبات الكيميائية، وسمَّ الأنواع المختلفة للهيدروكربونات.

<u>النموذج</u>	<u>الهيدروكربونات</u>
<u>الصيغة الجزيئية</u>	<u>الألكانات</u>
<u>الصيغة البنائية</u>	<u>الألكانات ذات السلسل المستقيمة</u>
<u>نموذج الكرة والعصا</u>	<u>الألكانات ذات السلسل المتفرعة</u>
<u>النموذج الفراغي</u>	<u>الألكانات الحلقية</u>
	<u>الألكينات</u>
	<u>الألكينات ذات السلسل المتفرعة</u>
	<u>الألكاينات</u>
	<u>المتشكلات</u>
<u>الفراغية</u>	<u>البنائية</u>
<u>الضوئية</u>	<u>الهندسية</u>
<u>المركبات الأليفاتية</u>	<u>المركبات الأروماتية</u>

استعن بما يلي لمساعدتك على المراجعة:

- اقرأ هذا الفصل من كتاب الكيمياء الذي يخصك.
- ادرس المفردات، والتعريفات العلمية.
- راجع الواجبات المنزلية اليومية.
- راجع الجداول، والرسوم البيانية، ووسائل الإيضاح.
- راجع أسئلة التقويم الموجودة في نهاية كلّ قسم من الفصل.
- ألق نظرة على دليل مراجعة الفصل الموجود في نهاية الفصل.
- راجع أسئلة تقويم الفصل الموجودة في نهاية الفصل.

لُّحِّص

بيانٌ كيف ساهمت الهيدروكربونات في اكتشاف الفضاء.

أقبل الإجابات المعقولة جميعها. إجابة محتملة: يُعد الوقود أهم مادة أسهمت في اكتشاف الفضاء؛ إذ زُوِّدت به المركبات الفضائية

التي سافرت إلى ما بعد كوكبنا، فضلاً عن المواد المصنعة من الهيدروكربونات والمُستخدمة في أثناء الرحلات الفضائية،

إضافة إلى بدلات رواد الفضاء ومعداتهم.