

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية



* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/10>

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة فيزياء وجميع الفصول, اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/10physics>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/10physics1>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/bh/grade10>

[almanahjbhbot/me.t//:https](https://t.me/almanahjbhbot)

للتحدث إلى بوت على تلغرام: اضغط هنا

مسائل تدريبية

1-1 الرياضيات والفيزياء

صفحة 11

أعد كتابة المعادلات المستخدمة في حل المسائل التالية، ثم احسب المجهول:

1. وُصِّل مصباح كهربائي مقاومته 50.0Ω في دائرة كهربائية مع بطارية فرق جهدها 9.0 volts . ما مقدار التيار الكهربائي المار في المصباح؟

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9.0 \text{ volt}}{50.0 \text{ ohms}} = 0.18 \text{ ampere}$$

2. إذا تحرك جسم من السكون بتسارع ثابت a ، فإن سرعته v_f بعد زمن مقداره t تُعطى بالعلاقة $v_f = at$. ما تسارع دراجة تتحرك من السكون فتصل سرعتها إلى 6 m/s خلال زمن قدره 4 s ؟

$$a = \frac{v_f}{t} = \frac{6 \text{ m/s}}{4 \text{ s}} = 1.5 \text{ m/s}^2$$

3. ما الزمن الذي تستغرقه دراجة نارية تتسارع من السكون بمقدار 0.400 m/s^2 ، حتى تبلغ سرعتها 4.00 m/s ؟ (علمًا بأن $v_f = at$)

$$t = \frac{v_f}{a} = \frac{4.00 \text{ m/s}}{0.400 \text{ m/s}^2} = 10.0 \text{ s}$$

4. يُحسب الضغط P المؤثر في سطح ما بقسمة مقدار القوة F على مساحة السطح A ، حيث $P = \frac{F}{A}$. فإذا أثر رجل وزنه 520 N يقف على الأرض بضغط مقداره 32500 N/m^2 ، فما مساحة نعلي الرجل؟

$$A = \frac{F}{P} = \frac{520 \text{ N}}{32500 \text{ N/m}^2} = 0.016 \text{ m}^2$$

مراجعة القسم

1-1 الرياضيات والفيزياء

صفحة 15

5. رياضيات لماذا توصف المفاهيم في الفيزياء بواسطة المعادلات الرياضية؟

المعادلة الرياضية مختصرة ونستطيع استخدامها لتوقع قيم بيانات جديدة.

6. مغناطيسية تحسب القوة المؤثرة في شحنة تتحرك في مجال مغناطيسي بالعلاقة $F = Bqv$ ، حيث:

F القوة المؤثرة بوحدة kg.m/s^2

q الشحنة بوحدة A.s

v السرعة بوحدة m/s

B كثافة الفيض المغناطيسي بوحدة T (tesla) . ما وحدة T المُعبر عنها بالوحدات أعلاه؟

$$F = Bqv$$

لذا فإن:

$$B = \frac{F}{qv}$$

$$T = \frac{\text{kg.m/s}^2}{(\text{A.s})(\text{m/s})} = \frac{\text{kg}}{\text{A.s}^2}$$

$$1 \text{ T} = 1 \text{ kg/A.s}^2$$

7. مغناطيسية أعد كتابة المعادلة: $F = Bqv$ للحصول على v بدلالة كل من F و q و B .

$$v = \frac{F}{Bq}$$

8. التفكير الناقد القيمة المقبولة لتسارع الجاذبية الأرضية هي 9.80 m/s^2 . وفي تجربة لقياسها باستخدام البندول حصلت على قيمة 9.4 m/s^2 ، هل تقبل هذه القيمة؟ فسّر إجابتك.

لا؛ لأن القيمة 9.80 m/s^2 قيمة مقبولة تم اعتمادها وإقرارها بعد عدد كبير من التجارب والقياسات. لذلك عليك أن تثبت أن جميع من سبقوك إلى قياس تسارع الجاذبية الأرضية كانوا على خطأ. من العوامل التي قد تكون أثرت في حساباتك: الاحتكاك، ومدى دقتك في قياس المتغيرات المختلفة.

مسائل تدريبية

1-2 القياس

صفحة 18

استخدم تحليل الوحدات للتحقق من المعادلة قبل إجراء عملية ضرب.

9. كم MHz في 750 kHz ؟

$$750 \text{ kHz} \left(\frac{1000 \text{ Hz}}{1 \text{ kHz}} \right) \left(\frac{1 \text{ MHz}}{1000000 \text{ Hz}} \right) = 0.75 \text{ MHz}$$

تابع الفصل 1

15. الأدوات لديك ميكروميتر (جهاز يستخدم لقياس طول الأجسام إلى أقرب 0.01 mm) مُنَحَن بشكل سيئ. كيف تقارنه بمسطرة مترية ذات نوعية جيدة من حيث الدقة والضبط؟ سيكون أكثر دقة ولكنه أقل ضبطاً.

16. اختلاف زاوية النظر هل يؤثر اختلاف زاوية النظر في دقة القياسات التي تجريها؟ وضح ذلك. لا، فهو لا يؤثر في وضوح أجزاء التدريجات.

17. الأخطاء أخبرك صديقك أن طوله 182 cm. وضح مدى دقة هذا القياس. سيكون طوله بين 181.5 cm و 182.5 cm. ودقة القياس هنا هي نصف مقدار أصغر تدريج في الجهاز، لذا سيكون طوله (182.0 ± 0.5) cm.

18. الدقة صندوق طوله 19.2 cm، وعرضه 18.1 cm، وارتفاعه 20.3 cm.

a. ما حجم الصندوق؟

$$7.05 \times 10^3 \text{ cm}^3$$

b. ما دقة قياس الطول؟ وما دقة قياس الحجم؟

إلى أقرب واحد بال عشرة من السنتمتر؛ إلى أقرب 10 cm^3 .

c. ما ارتفاع مجموعة من 12 صندوقاً من النوع نفسه؟

$$243.6 \text{ cm}$$

d. ما دقة قياس ارتفاع الصندوق مقارنة بدقة قياس ارتفاع 12 صندوقاً؟

تكون دقة قياس صندوق أكبر من دقة قياس 12 صندوقاً.

19. التفكير الناقد كتب زميلك في تقريره أن متوسط الزمن اللازم ليدور جسم دورة كاملة في مسار دائري هو 65.414 s. وقد سجلت هذه القراءة عن طريق قياس زمن 7 دورات باستخدام ساعة دقتها 0.1 s. ما مدى ثقتك في النتيجة المدونة في التقرير؟ وضح إجابتك. النتيجة المدونة في التقرير ليست موثوقة؛ لأن دقة

10. عبّر عن 5201 cm بوحدة km.

$$5201 \text{ cm} \left(\frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \right) \left(\frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \right) = 5.201 \times 10^{-2} \text{ km}$$

11. كم ثانية في السنة الميلادية الكبيسة (السنة الكبيسة تساوي 366 يوماً)؟

$$366 \text{ day} \left(\frac{24 \text{ h}}{1 \text{ day}} \right) \left(\frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} \right) \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right) = 31622400 \text{ s}$$

12. حوّل السرعة 5.30 m/s إلى km/h.

$$\left(\frac{5.30 \text{ m}}{1 \text{ s}} \right) \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right) \left(\frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} \right) \left(\frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \right) = 19.08 \text{ km/h}$$

مراجعة القسم

1-2 القياس

صفحة 21

13. مغناطيسية بروتون شحنته $1.6 \times 10^{-19} \text{ A.s}$ يتحرك بسرعة $2.4 \times 10^5 \text{ m/s}$ عمودياً على مجال مغناطيسي شدته 4.5 T. لحساب القوة المغناطيسية المؤثرة في البروتون:

a. عوض القيم في المعادلة $F = Bqv$ ، وتحقق من صحة المعادلة بتعويض الوحدات في طرفيها.

$$F = Bqv$$

$$= (4.5 \text{ kg/A.s}^2)(1.60 \times 10^{-19} \text{ A.s})(2.4 \times 10^5 \text{ m/s})$$

فتكون وحدة قياس القوة kg.m/s^2 ، وهذه وحدة صحيحة للقوة.

b. احسب مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في البروتون.

$$17.28 \times 10^{-14} \text{ kg.m/s}^2$$

14. الضبط بعض المساطر الخشبية لا يبدأ صفرها عند الحافة، وإنما بعد عدة ملمترات منها. كيف يؤثر هذا في ضبط المسطرة؟

إذا تلف طرف المسطرة المدرجة من الحافة فإن علامات الملمتر الأول والثاني ستختفي.

تابع الفصل 1

الوحدات هي: المتر، والكيلوجرام، والثانية، والكلفن، والمول، والأمبير، والكانديلا (الشمعة).

24. ماذا تسمى قيم المتر التالية؟ (1-2)

a. $\frac{1}{100} \text{ m}$

(cm)

b. $\frac{1}{1000} \text{ m}$


(mm)

c. 1000 m

(km)

25. في تجربة عملية، قيس حجم الغاز داخل بالون وحُدَّت علاقته بتغير درجة الحرارة. ما المتغير المستقل، والمتغير التابع فيها؟ (دليل الرياضيات 142)
درجة الحرارة متغير مستقل، وحجم الغاز متغير تابع.

26. ما نوع العلاقة الموضحة في الشكل التالي؟ (دليل الرياضيات 143-147)



الشكل 1-11 ■

علاقة تربيعية $y = ax^2 + bx + c$

27. لديك العلاقة التالية $F = \frac{mv^2}{R}$. ما نوع العلاقة بين كل مما يلي؟ (دليل الرياضيات 143-147)

a. F و R

علاقة عكسية

b. F و m

علاقة خطية

c. F و v

علاقة تربيعية


النتيجة لن تتجاوز أقل دقة للقياسات. متوسط زمن الدورة المحسوب يتجاوز دقة القياس المتوقعة من الساعة.

تقويم الفصل

خريطة المفاهيم

صفحة 26

20. أكمل خريطة المفاهيم أدناه باستخدام المصطلحات التالية: جمع المعلومات، تحليل البيانات، يدعم الفرضية، اختبار صحة الفرضية، لا يدعم الفرضية.



إتقان المفاهيم

صفحة 26

21. ما المقصود بالطريقة العلمية؟ (1-1)

الطريقة العلمية تمثل أسلوباً للإجابة عن تساؤلات علمية؛ بهدف تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة. وتبدأ الأسئلة بناءً على مشاهدات، ثم محاولة البحث عن إجابات منطقية لها عن طريق وضع فرضيات.

22. ما أهمية الرياضيات في علم الفيزياء؟ (1-1)

تستخدم الفيزياء الرياضيات باعتبارها لغة قادرة على التعبير عن القوانين والظواهر الفيزيائية بشكل واضح ومفهوم. وتمثل المعادلات الرياضية أداة مهمة في نمذجة المشاهدات ووضع التوقعات لتفسير الظواهر الفيزيائية المختلفة.

23. ما النظام الدولي للوحدات؟ (1-2)

هو نظام دولي للقياس يعتمد على البادئات (الأساس 10 مرفراً لقوة مناسبة) ويحوي سبع كميات أساسية للقياس معتمداً على وحدات معيارية لكل منها، وهذه

إتقان حل المسائل

(صفحتا 27-28)

1-1 الرياضيات والفيزياء

32. يُعبّر عن مقدار قوة جذب الأرض للجسم بالعلاقة

$$F = mg$$

حيث تمثل m كتلة الجسم، و g التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية ($g = 9.80 \text{ m/s}^2$).a. أوجد القوة المؤثرة في جسم كتلته 41.63 kg .

$$408 \text{ N}$$

b. إذا كانت القوة المؤثرة في جسم هي 632 kg.m/s^2 ،

فما كتلة هذا الجسم؟

$$64.5 \text{ kg}$$

33. يقاس الضغط بوحدة الباسكال Pa حيث

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ kg/m.s}^2$$

للمضغط بوحدة صحيحة؟

$$\frac{(0.55 \text{ kg})(2.1 \text{ m/s})}{9.80 \text{ m/s}^2}$$

$$9.80 \text{ m/s}^2$$

لا، إنها بوحدة kg/s^3

1-2 القياس

34. حوّل كلا مما يلي إلى متر:

$$42.3 \text{ cm}$$

$$0.423 \text{ m}$$

$$6.2 \text{ pm}$$

$$6.2 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$21 \text{ km}$$

$$2.1 \times 10^4 \text{ m}$$

$$0.023 \text{ mm}$$

$$2.3 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$214 \text{ } \mu\text{m}$$

$$2.14 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$57 \text{ nm}$$

$$5.7 \times 10^{-8} \text{ m}$$

28. ما الفرق بين النظرية العلمية والقانون العلمي؟ وما

الفرق بين الفرضية والنظرية العلمية؟ أعط أمثلة مناسبة.

القانون العلمي قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة

لوصف ظاهرة طبيعية مثل قانون الانعكاس. بينما

النظرية العلمية تفسير للقانون العلمي بالاعتماد على

المشاهدات. تفسر النظرية العلمية سبب حدوث الحدث،

بينما يصف القانون الحدث نفسه. تختبر النظرية

العلمية أكثر من مرة قبل أن تُقبل. أما الفرضية فهي

فكرة أو تصور عن كيفية حدوث الأشياء. ستختلف

الأمثلة باختلاف استجابات الطلاب.

29. الكثافة تُعرف الكثافة بأنها كتلة وحدة الحجم وتساوي

الكتلة مقسومة على الحجم.

a. ما وحدة الكثافة في النظام الدولي؟

$$\text{kg/m}^3$$

b. هل وحدة الكثافة أساسية أم مشتقة؟

مشتقة

30. قام طالبان بقياس سرعة الضوء؛ فحصل الأول على

$$(3.001 \pm 0.001) \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\text{وحصل الثاني على } (2.999 \pm 0.006) \times 10^8 \text{ m/s}.$$

a. أيهما أكثر دقة؟

$$(3.001 \pm 0.001) \times 10^8 \text{ m/s}$$


b. أيهما أكثر ضبطاً؟ علماً بأن القيمة المعيارية لسرعة

$$\text{الضوء هي: } 2.99792457 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

$$(2.999 \pm 0.006) \times 10^8 \text{ m/s}$$

31. ما طول ورقة الشجر المبينة في الشكل 1-13؟

ضمّن إجابتك خطأ القياس.



الشكل 1-13

$$9.5 \text{ cm} \pm 0.05 \text{ cm} \text{ أو } 95 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$$

تابع الفصل 1

a. ما كتلة 30 cm^3 من كل مادة؟

$$A = 80 \text{ g}, B = 260 \text{ g}, C = 400 \text{ g}$$

b. إذا كان لديك 100 g من كل مادة فما حجم كل منها؟

$$A = 36 \text{ cm}^3, B = 11 \text{ cm}^3, C = 7 \text{ cm}^3$$


c. ماذا يمثل ميل الخطوط المبينة في الرسم؟ وضح ذلك بجملة أو جملتين.

الكثافة، يمثل الميل النسبة بين كتلة الجسم إلى حجمه، وهذا يساوي الكثافة.

39. في تجربة أجريت داخل مختبر المدرسة، وضع معلم الفيزياء كتلة على سطح طاولة مهملة الاحتكاك تقريباً، ثم أثار في هذه الكتلة بقوى أفقية متغيرة، وقاس المسافة التي تقطعها الكتلة في خمس ثوان تحت تأثير كل قوة منها، فحصل على الجدول التالي: (دليل الرياضيات 142-147)

جدول 1-3	
المسافة المقطوعة تحت تأثير قوى مختلفة	
المسافة (cm)	القوة (N)
24	5.0
49	10.0
75	15.0
99	20.0
120	25.0
145	30.0

a. مثل بيانياً القيم المعطاة بالجدول، وارسم خط المواءمة الأفضل (الخط الذي يمر بأغلب النقاط).



b. صف الرسم البياني الناتج.
خط مستقيم

35. وعاء ماء كتلته فارغاً 3.64 kg ، إذا أصبحت كتلته بعد ملئه بالماء 51.8 kg ، فما كتلة الماء فيه؟
 48.2 kg


36. ما دقة القياس التي تستطيع الحصول عليها من الميزان الموضح في الشكل 1-14؟



الشكل 1-14

$$\pm 0.05 \text{ g}$$


37. اقرأ القياس الموضح في الشكل 1-15، وضمّن خطأ القياس في الإجابة:



الشكل 1-15

$$(3.6 \pm 0.1) \text{ A}$$

38. يمثل الشكل 1-16 العلاقة بين كتل ثلاث مواد وحجومها التي تتراوح بين $0-60 \text{ cm}^3$.



الشكل 1-16

تابع الفصل 1

42. صمّم تجربة إلى أي ارتفاع تستطيع رمي كرة؟ وما المتغيرات التي من المحتمل أن تؤثر في إجابة هذا السؤال؟

ستختلف الإجابات. زاوية القذف، وكتلة الكرة، وموضع القدم، والتدريب، والأحوال الجوية.

الكتابة في الفيزياء

صفحة 28

43. اكتب مقالة عن تاريخ الفيزياء توضح فيها كيفية تغير الأفكار حول موضوع أو كشف علمي ما مع مرور الزمن. تأكد من إدراج إسهامات العلماء، وتقويم أثرها في تطور الفكر العلمي، وفي واقع الحياة. ستختلف الإجابات.

44. وضح كيف أن تحسين الدقة في قياس الزمن يؤدي إلى دقة أكثر في التوقعات المتعلقة بكيفية سقوط الجسم. ستختلف الإجابات. كمثال يمكن أن يقترح الطلاب أن يؤدي تحسين دقة قياس الزمن إلى أن تكون الملاحظات أفضل.

مسألة تحفيز

صفحة 21

يعبر عن الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنازل بوحدة كيلواط. ساعة (kWh). فإذا كانت قراءة عداد الكهرباء في منزل 300 kWh خلال شهر فعبر عن كمية الطاقة المستهلكة بوحدة:

1. الجول (J)، إذا علمت أن $1 \text{ kWh} = 3.60 \text{ MJ}$

$$300 \text{ kWh} \left(\frac{3.60 \times 10^6 \text{ J}}{1 \text{ kWh}} \right) = 1.08 \times 10^9 \text{ J}$$

2. الإلكترون فولت (eV)، إذا علمت أن

$$1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$300 \text{ kWh} = 1.08 \times 10^9 \text{ J} \left(\frac{1 \text{ eV}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J}} \right)$$

$$= 6.75 \times 10^{27} \text{ eV}$$

c. استخدم الرسم لكتابة معادلة تربط المسافة مع القوة.

$$d = 4.9 F$$

d. ما الثابت في المعادلة؟ وما وحدته؟

الثابت هو 4.9، ووحدته هي cm/N.

e. توقع المسافة المقطوعة في 5 s عندما تؤثر في الجسم قوة مقدارها 22.0 N.

108 cm أو 110 cm باستخدام رقمين معنويين.

مراجعة عامة

صفحة 28

40. تتكون قطرة الماء في المتوسط من 1.7×10^{21} جزيء. إذا كان الماء يتبخر بمعدل مليون جزيء في الثانية، فاحسب الزمن اللازم لتبخر قطرة الماء تمامًا.

$$\frac{1.7 \times 10^{21} \text{ جزيء}}{\left(\frac{1000000 \text{ جزيء}}{1 \text{ s}} \right)} = 1.7 \times 10^{15} \text{ s}$$

$$(1.7 \times 10^{15} \text{ s}) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) \left(\frac{1 \text{ day}}{24 \text{ h}} \right) \left(\frac{1 \text{ y}}{365 \text{ day}} \right) = 5.4 \times 10^7 \text{ y}$$

ملاحظة: إذا تأملت في الإجابة (54 مليون سنة)؛ لعلك تستنتج أن قطرة الماء تحوي عددًا ضخمًا من الجزيئات، فضلًا عن مدى صغر معدل التبخر الذي يساوي (مليون جزيء في الثانية) مقارنة بسرعة التبخر في الواقع.

التفكير الناقد

صفحة 28

41. احسب كتلة الماء بوحدة kilograms اللازمة لملء وعاء طوله 1.4 m، وعرضه 0.006 m، وعمقه 34.0 cm علمًا بأن كثافة الماء تساوي 1.00 g/cm^3 .

$$\text{حجم الماء} = (140 \text{ cm})(60.0 \text{ cm})(34.0 \text{ cm}) =$$

$$285600 \text{ cm}^3 =$$

$$\text{ولما كانت كثافة الماء} = 1.00 \text{ g/cm}^3 =$$

$$\text{فإن كتلة الماء} = 285600 \text{ g} =$$

$$285.6 \text{ kg} =$$

وهي تساوي 286 kg (تقريبًا)

الفيزياء

الفصل الأول

حمض الفوليك:

$$(400 \text{ mcg})(0.001 \text{ mg/mcg}) = 0.4 \text{ mg}$$


فيتامين B12:

$$(6 \text{ mcg})(0.001 \text{ mg/mcg}) = 0.006 \text{ mg}$$

البيوتين:

$$(30 \text{ mcg})(0.001 \text{ mg/mcg}) = 0.03 \text{ mg}$$

6. حدّد نوع العلاقة الموضحة بالنقاط المعيّنة على الرسم أدناه، ثم اكتب معادلة تُمثّل البيانات.



$$y = \frac{(1.2)}{x} \text{؛ العلاقة عكسية}$$

7. ما عدد الأرقام المعنوية الموجودة في كل من القياسات التالية؟

a. 100 m

1

b. 0.0023 m/s

2

c. 100.1 m

4

d. 2.0023

5

1. يُعبّر عن كثافة (ρ) جسم ما من خلال نسبة كتلة الجسم m إلى حجمه V ، وفقاً للمعادلة $\rho = m/V$. فما كثافة مكعب طول كل ضلعه من أضلاعه 1.2 cm وكتلته 25.6 g؟

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{(25.6 \text{ g})}{(1.2 \text{ cm})^3} = 15 \text{ g/cm}^3$$

2. يتحرك جسم في خط مستقيم بسرعة v ، ويقطع مسافة مقدارها $d = vt$ خلال زمن مقداره t . أعد كتابة المعادلة لإيجاد t بدلالة d و v ، ثم احسب الزمن الذي تحتاج إليه طائرة تتحرك بسرعة 350 km/h لتقطع مسافة مقدارها 1750 km.

$$t = \frac{d}{v} = \frac{(1750 \text{ km})}{(350 \text{ km/h})} = 5.0 \text{ h}$$

3. حوّل المقدار 523 kg ليصبح بوحدته mg.

$$523 \text{ kg} = (523 \text{ kg}) \left(\frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \right) \left(\frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} \right) = 5.23 \times 10^8 \text{ mg}$$

4. إن وحدة الملتر (ml) المستخدمة في قياس حجم السوائل تساوي 1 cm^3 . فما مقدار حجم السائل بوحدته ml الذي يمكن إضافته إلى إناء حجمه 2.5 m^3 ؟


$$2.5 \text{ m}^3 = (2.5 \text{ m}^3) \left(\frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \right)^3 \left(\frac{1 \text{ ml}}{1 \text{ cm}^3} \right) = 2.5 \times 10^6 \text{ ml}$$

5. يوضح الشكل أدناه جزءاً من ملصق مثبت على عبوة فيتامين؛ حيث يشير الاختصار (mcg) إلى وحدة ميكروجرام. حوّل القيم المتضمنة في الملصق لتصبح بوحدته الملجرام (mg).

يحتوي كل قرص على	نسبة حاجة الجسم اليومية
حمض الفوليك 400 mcg	100%
فيتامين B12 6 mcg	100%
بيوتين 30 mcg	10%

الفصل 1 (تابع)

a. مثل بيانياً الزمن الدوري T مقابل الطول l.




b. هل العلاقة بين البيانات خطية؟

لا

c. مثل بيانياً الزمن الدوري مقابل الجذر التربيعي لطول خيط البندول.

\sqrt{l}	T
0.3	0.6
0.4	0.9
0.6	1.3
0.8	1.6
0.9	1.8
1.0	2.0



d. ما العلاقة بين الزمن الدوري والجذر التربيعي لطول خيط البندول؟

إن الرسم البياني خطي؛ لذا يتناسب الزمن الدوري للبندول طردياً مع الجذر التربيعي لطول خيطه.

12. اعتماداً على المسألة السابقة، ما الزمن الدوري لبندول طول خيطه يساوي 0.7 m؟

1.7 s تقريباً

8. عندما يغمر جسم في ماء فإنه يتأثر بقوة طفو إلى أعلى تعطى بالمعادلة $F = \rho Vg$ ، حيث تمثل ρ كثافة الماء ($1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)، و V حجم الجسم بوحدة m^3 ، و g تسارع الجاذبية الأرضية (9.80 m/s^2). وتقاس القوة بوحدة نيوتن N. أعد كتابة المعادلة لإيجاد الحجم V بدلالة القوة F ، ومن ثم استخدم المعادلة الجديدة لحساب حجم برميل مغمور في الماء، إذا كانت قوة الطفو المؤثرة فيه 9200 N.

$$V = \frac{F}{\rho g} = \frac{9200 \text{ N}}{(1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9.80 \text{ m/s}^2)} = 0.94 \text{ m}^3$$

9. أوجد حاصل جمع $2.3 \text{ kg} + 0.23 \text{ g}$

$$2.3 \text{ kg} + 0.23 \text{ g} = 2.3 \times 10^3 \text{ g} + 0.23 \text{ g} = 2.3 \times 10^3 \text{ g} = 2.3 \text{ kg}$$

10. حل المسألتين التاليتين:

a. $15.5 \text{ cm} \times 12.1 \text{ cm} = 188 \text{ cm}^2$

b. $(14.678 \text{ m}) / (3.2 \text{ m/s}) = 4.6 \text{ s}$

11. أُجريت تجربة لتحديد الزمن الدوري لبندول بدلالة طول خيطه. وتمثل البيانات الواردة في الجدول أدناه القياسات التي أُجريت.

الزمن الدوري (s)	الطول (m)
0.6	0.1
0.9	0.2
1.3	0.4
1.6	0.6
1.8	0.8
2.0	1.0


تمثيل الحركة

مراجعة القسم

2-1 تصوير الحركة

صفحة 33

4. التفكير الناقد استخدم نموذج الجسيم النقطي لرسم مخططات الحركة التوضيحية لعداءين في سباق؛ عندما يتجاوز الأول خط النهاية يكون الآخر قد قطع ثلاثة أرباع مسافة السباق فقط.



مراجعة القسم

2-2 الموقع والزمن

صفحة 37

5. الإزاحة يمثل الشكل التالي النموذج الجسيمي النقطي لحركة سيارة على طريق سريع، وقد حددت نقطة الانطلاق كالتالي:

من هنا • • • • • إلى هناك

أعد رسم هذا النموذج الجسيمي النقطي، وارسم متجهًا يمثل إزاحة السيارة من نقطة البداية حتى نهاية الفترة الزمنية الثالثة.

من هنا ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← إلى هناك

6. الإزاحة يمثل النموذج الجسيمي النقطي أدناه حركة طالب يسير من بيته إلى المدرسة:

البيت • • • • • • • • • • المدرسة

أعد رسم الشكل، وارسم متجهات لتمثيل الإزاحة بين كل نقطتين.

البيت ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← المدرسة

7. الموقع قارن طالبان متجهي الموقع اللذين رسماها على مخطط للحركة لتحديد موقع جسم متحرك في اللحظة نفسها، فوجدا أن المتجهين المرسومين لا يشيران إلى الاتجاه نفسه. فسّر ذلك.

يبدأ متجه الموقع من نقطة الأصل إلى موضع الجسم، وعند اختلاف نقاط الأصل تختلف متجهات الموقع. من جهة أخرى ليس للإزاحة علاقة بنقطة الأصل.

1. مخطط توضيحي لحركة درّاج استخدم نموذج الجسيم النقطي لرسم مخطط توضيحي لراكب دراجة هوائية يتحرك بسرعة ثابتة.




2. مخطط توضيحي لحركة طائر استخدم نموذج الجسيم النقطي لرسم نموذج توضيحي مبسط يتناسب مع المخطط التوضيحي لحركة طائر في أثناء طيرانه كما في الشكل 2-4، وما النقطة التي اخترتها على جسم الطائر لتمثله؟



الشكل 2-4

هناك عدة نقاط صحيحة محتملة يمكنك أن تختارها لتمثيل الطائر، على أن تكون النقطة قريبة نسبياً من مركز الطائر؛ أي ليست جزءاً من المنقار أو الجناح أو الأرجل أو الذيل.

3. مخطط توضيحي لحركة سيارة استخدم نموذج الجسيم النقطي لرسم نموذج توضيحي مبسط يتناسب مع المخطط التوضيحي لحركة سيارة ستتوقف عند إشارة مرورية، كما في الشكل 2-5. حدّد النقطة التي اخترتها على جسم السيارة لتمثيلها.



الشكل 2-5

تابع الفصل 2

11. أجب عن الأسئلة التالية حول حركة السيارة: (افترض أن الاتجاه الموجب للإزاحة في اتجاه الشرق والاتجاه السالب في اتجاه الغرب).


a. متى كانت السيارة على بُعد 25.0 m شرق نقطة الأصل؟

عند 4.0 s

b. أين كانت السيارة عند 1.0 s؟

100.0 m

12. صف بالكلمات حركة اثنين من المشاة A و B كما يوضحهما الخطان البيانيان في الشكل 14-2، مفترضاً أن الاتجاه الموجب في اتجاه الشرق على الشارع الفرعي، ونقطة الأصل هي نقطة تقاطع الشارعين الرئيس والفرعي.



الشكل 14-2

بدأ الشخص A الحركة من غرب الشارع الرئيس وسار نحو الشرق (الاتجاه الموجب). أما الشخص B فبدأ الحركة من شرق الشارع الرئيس وسار نحو الغرب (الاتجاه السالب). وفي لحظة ما بعد عبور الشخص B للشارع الرئيس، التقى كل من A و B في نقطة واحدة، وبعد التقائهما قام A بعبور الشارع الرئيس.

13. تحركت سعاد في خط مستقيم من أمام المقصف إلى مختبر العلوم، فقطعت مسافة 100.0 m في هذه الأثناء قامت زميلاتها بتسجيل وتحديد موقعها كل 2.0 s، فلاحظن أنها قد تحركت مسافة 2.6 m كل 2.0 s.

8. التفكير الناقد تتحرك سيارة في خط مستقيم من البقالة إلى مكتب البريد، ولتمثيل حركتها استخدم طالب نظاماً إحداثياً، نقطة الأصل فيه البقالة، واتجاه حركة السيارة هو الاتجاه الموجب. أما زميله فاستخدم نظاماً إحداثياً، نقطة الأصل فيه مكتب البريد، والاتجاه المعاكس لحركة السيارة هو الموجب. هل سيتفان على كل من موقع السيارة والإزاحة والمسافة والفترة الزمنية التي استغرقتها الرحلة؟ وضح ذلك.


سيتفق الطالبان على كل من الإزاحة والمسافة والفترة الزمنية للرحلة؛ لأن هذه الكميات لا علاقة لها بنقطة الأصل في النظام الإحداثي. لكنهما سيختلفان حول موقع السيارة؛ لأن الموقع يقاس من نقطة الأصل في النظام الإحداثي إلى موضع السيارة.

مسائل تدريبية

2-3 منحنى (الموقع-الزمن)

صفحة 39


استعن بالشكل 13-2 على حل المسائل من 9-11:



الشكل 13-2


9. صف حركة السيارة المبينة في الرسم البياني. انطلقت السيارة من موقع على بُعد 125.0 m، وتحركت في اتجاه نقطة الأصل، فوصلت إليها بعد 5.0 s من بدء الحركة، واستمرت في حركتها لما بعد نقطة الأصل.

10. ارسم مخططاً للحركة يتوافق مع الرسم البياني.



تابع الفصل 2

a. مثل بالرسم البياني حركة سعاد.



b. متى كانت سعاد في المواقع التالية:

• على بُعد 25.0 m من المقصف؟


19 s

• على بُعد 25.0 m من مختبر العلوم؟

58 s

صفحة 41

للإجابة عن المسائل 14-17 استعن بالشكل أدناه.



14. ما الحدث الذي وقع عند اللحظة $t = 0.0$ s؟

مرّ العداء A بنقطة الأصل.

15. أي عداء كان متقدماً في اللحظة $t = 48$ s؟

العداء B

16. أين كان العداء B عندما كان العداء A عند النقطة

0.0 m؟


-50.0 m , $t = 0.0$ s

17. ما المسافة الفاصلة بين العداء A والعداء B في اللحظة

$t = 20.0$ s؟

30 m تقريباً

18. خرج أحمد في نزهة مشياً على الأقدام، وبعد وقت ما بدأ صديقه نبيل السير خلفه، وقد تم تمثيل حركتهما بمنحنى (الموقع-الزمن) المبين في الشكل 2-16.



الشكل 2-16

a. ما الزمن الذي سار خلاله أحمد قبل أن يبدأ نبيل المشي؟

(0.1 h) 6.0 min

b. هل سيلحق نبيل بأحمد؟ فسر ذلك.


لا، الخطان الممثلان لحركة كل من أحمد ونبيل يتباعدان كلما ازداد الزمن، لذا فإنهما لن يتقاطعا.

مراجعة القسم


2-3 منحنى (الموقع-الزمن)

صفحة 42

19. منحنى (الموقع-الزمن) يمثل النموذج الجسيمي النقطي في الشكل 2-17 طفلاً يزحف على أرضية غرفة. مثل حركته باستخدام منحنى (الموقع-الزمن)، علماً بأن الفترة الزمنية بين كل نقطتين متتاليتين تساوي 1 s.




الشكل 2-17



تابع الفصل 2

24. التفكير الناقد تفحص النموذج الجسيمي النقطي ومنحنى (الموقع-الزمن) الموضحين في الشكل 19-2. هل يصفان الحركة نفسها؟ كيف تعرف ذلك؟ علمًا بأن الفترات الزمنية في النموذج الجسيمي النقطي تساوي 2 s.



الشكل 19-2 ■


لا، إنهما لا يصفان الحركة نفسها، فبالرغم من أن الجسمين يسيران في الاتجاه الموجب، إلا أن أحدهما يسير أسرع من الآخر. شجع الطلاب على إثبات أن الرسم البياني والنموذج الجسيمي النقطي لا يمثلان الحركة نفسها باستخدام عدة أمثلة.

مسائل تدريبية

2-4 السرعة المتجهة


صفحة 46

25. يصف الرسم البياني في الشكل 22-2 حركة سفينة في البحر. ويعد الاتجاه الموجب للحركة هو اتجاه الجنوب.



الشكل 22-2 ■

20. المخطط التوضيحي للحركة يبين الشكل 18-2 منحنى (الموقع-الزمن) لحركة قرص مطاوي ينزلق على بركة متجمدة في لعبة الهوكي.



الشكل 18-2 ■

استخدم الرسم البياني في الشكل 18-2 لرسم النموذج الجسيمي النقطي لحركة قرص، وحل المسائل 21-23.



21. الزمن متى كان القرص على بُعد 10.0 m عن نقطة الأصل؟

0.5 s

22. المسافة حدد المسافة التي قطعها قرص الهوكي بين اللحظتين 0.0 s و 5.0 s.

100 m

23. الفترة الزمنية حدد الزمن الذي استغرقه قرص الهوكي ليتحرك من موقع يبعد 40 m عن نقطة الأصل إلى موقع يبعد 80 m عنها.

2.0 s

تابع الفصل 2



$$\bar{v} = \left| \frac{10.0 \text{ km} - 0.0 \text{ km}}{15.0 \text{ min} - 0.0 \text{ min}} \right|$$

$\bar{v} = 0.67 \text{ km/min}$ في الاتجاه الموجب

تسير الدراجة في الاتجاه الموجب بسرعة متوسطة تساوي 0.67 km/min . إلا أنه لا يطلب تحديد اتجاه السرعة، على عكس السرعة المتجهة التي يُطلب فيها تحديد الاتجاه، فنقول في الاتجاه الموجب.

28. انطلقت دراجة بسرعة ثابتة مقدارها 0.55 m/s ، ارسم مخططاً توضيحياً للحركة، ومنحنىً بيانياً للموقع - الزمن، تبين فيهما حركة الدراجة لمسافة 19.8 m .

مخطط توضيحي للحركة



مراجعة القسم

2-4 السرعة المتجهة

صفحة 49

استخدم الشكل 2-24 في حل المسائل 29-31.

29. السرعة المتوسطة رتب منحنيات (الموقع - الزمن) وفق السرعة المتوسطة للجسم، من الأكبر إلى الأصغر، وأشر إلى الروابط إن وجدت.

للسرعة نستخدم القيمة المطلقة، ولذلك فإن:

a. ما السرعة المتوسطة للسفينة؟

استخدم النقاط $(0.0 \text{ m}, 0.0 \text{ s})$ و $(-1.0 \text{ m}, 3.0 \text{ s})$

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \left| \frac{\Delta d}{\Delta t} \right| \\ &= \left| \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1} \right| \\ &= \left| \frac{-1.0 \text{ m} - 0.0 \text{ m}}{3.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} \right| \\ &= \left| -0.33 \text{ m/s} \right| \\ &= 0.33 \text{ m/s} \end{aligned}$$

b. ما السرعة المتجهة المتوسطة للسفينة؟


السرعة المتجهة المتوسطة للسفينة تساوي ميل الخط بما في ذلك الإشارة، وعليه فإنها تساوي -0.33 m/s ، أو 0.33 m/s نحو الشمال.

26. صف بالكلمات حركة السفينة في المسألة السابقة.

تتحرك السفينة في اتجاه الشمال بسرعة مقدارها 0.33 m/s .

27. يمثل الرسم البياني في الشكل 2-23 حركة دراجة

هوائية. احسب كلا من السرعة المتوسطة. والسرعة المتجهة المتوسطة للدراجة، ثم صف حركتها بالكلمات.



■ الشكل 2-23

بما أن الدراجة تتحرك في الاتجاه الموجب، فإن السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة المتوسطة هي نفسها.

استخدم النقاط $(0.0 \text{ min}, 0.0 \text{ km})$ و $(15.0 \text{ min}, 10.0 \text{ km})$


$$\begin{aligned} \bar{v} &= \left| \frac{\Delta d}{\Delta t} \right| \\ &= \left| \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1} \right| \end{aligned}$$

تابع الفصل 2

32. السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة المتوسطة وضح العلاقة بين السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة المتوسطة. السرعة المتوسطة هي القيمة المطلقة (العديدية) للسرعة المتجهة المتوسطة. السرعة هي المقدار فقط أما السرعة المتجهة فهي المقدار والاتجاه.

33. التفكير الناقد ما أهمية عمل نماذج مصورة ونماذج فيزيائية للحركة قبل بدء حل معادلة ما؟

ستختلف الإجابات. يساعدك رسم النماذج قبل كتابة المعادلة على تصور المسألة بوضوح. فمن الصعب كتابة المعادلة المناسبة إذا لم يكن لديك تصور واضح عن وضع الأشياء أو حركتها. من جهة أخرى يساعدك رسم النماذج على اختيار النظام الإحداثي المناسب، وهذا أساسي للتأكد من أنك تستخدم الإشارات الصحيحة في تمثيل الكميات التي ستعوض قيمتها في المعادلة لاحقاً.



الشكل 2-24 الزمن (s) ■

$$C = D, B, A$$

$$-2 = A \text{ ميل}$$

$$\frac{3}{2} = B \text{ ميل}$$


$$-1 = C \text{ ميل}$$

$$1 = D \text{ ميل}$$

تقويم الفصل خريطة المفاهيم

صفحة 54

34. أكمل خريطة المفاهيم أدناه باستخدام المصطلحات التالية: الكلمات، التمثيلات المتكافئة، منحني (الموقع - الزمن).



إتقان المفاهيم

صفحة 54

35. ما الهدف من رسم المخطط التوضيحي للحركة؟ (2-1)

يعطي المخطط التوضيحي للحركة صورة عن الحركة تساعد على تصور كل من الإزاحة والسرعة المتجهة.

36. متى يمكن معاملة الجسم كجسيم نقطي؟ (2-1)

يمكن معاملة الجسم بوصفه جسيماً نقطياً إذا كانت حركته الداخلية غير مهمة، وإذا كان الجسم صغيراً مقارنة بالمسافة التي يتحركها.

30. السرعة المتجهة المتوسطة ترتب المنحنيات وفق السرعة المتجهة المتوسطة من السرعة الأكبر إلى السرعة الأقل.

$$A, C, D, B$$

$$-2 = A \text{ ميل}$$

$$\frac{3}{2} = B \text{ ميل}$$

$$-1 = C \text{ ميل}$$

$$1 = D \text{ ميل}$$

31. الموقع الابتدائي ترتب الخطوط البيانية بحسب الموقع الابتدائي للجسم (بدءاً بأكبر قيمة موجبة وانتهاءً بأكبر قيمة سالبة). هل سيكون ترتيبك مختلفاً إذا طلب إليك أن ترتبها بحسب المسافة الابتدائية للجسم من نقطة الأصل؟

A, C, B, D. نعم سيكون الترتيب من الأكبر مسافة إلى الأصغر مسافة A, C, B, D.


تابع الفصل 2

في الإزاحة على الفترة الزمنية يتم حساب السرعة المتجهة المتوسطة. ولكن ليس بالإمكان إيجاد السرعة المتجهة اللحظية.

تطبيق المفاهيم

صفحة 54

43. يمثل الشكل 2-25 رسماً بيانياً لحركة عداءين.



الشكل 2-25 (س) الزمن

a. صف موقع العداء A بالنسبة للعداء B بحسب التقاطع مع المحور الرأسي.

بدأ العداء A السباق متقدماً على العداء B بمقدار 4 وحدات.


b. أي العداءين أسرع؟

العداء B هو الأسرع؛ لأن ميل خطه البياني أكبر من ميل الخط البياني للعداء A.

c. ماذا يحدث عند النقطة P وما بعدها؟

يتجاوز العداء B العداء A عند النقطة P.

44. يبين منحنى (الموقع-الزمن) في الشكل 2-26 حركة أربعة من الطلاب في طريق عودتهم من المدرسة. رتب الطلاب حسب السرعة المتجهة المتوسطة لكل منهم من الأبطأ إلى الأسرع.



الشكل 2-26

جمال، فواز، أحمد، أنور

37. وضح الفرق بين: الموقع والمسافة والإزاحة. (2-2)

يختلف مفهوم كل من الموقع والإزاحة عن مفهوم المسافة؛ لأن كليهما يتضمن معلومات عن الاتجاه الذي يتحرك فيه الجسم، بينما لا تتضمن المسافة الاتجاه. وتختلف كل من المسافة والإزاحة عن الموقع؛ لأنهما تصفان تغير موقع الجسم خلال فترة زمنية محددة، بينما يخبرك الموقع فقط عن موضع الجسم عند زمن محدد.

38. كيف يمكنك استخدام ساعة حائط لتعيين فترة زمنية؟ (2-2)

عين قراءة الساعة عند بداية الفترة ونهايتها، واطرح مقدار وقت البداية من وقت النهاية.

39. خط التزلج وضح كيف يمكنك أن تستخدم منحنى

(الموقع-الزمن) لمتزلجين على مسار التزلج؛ لتحديد ما إذا كان أحدهما سيتجاوز الآخر ومتى؟ (2-3)

ارسم المنحنيين على مجموعة المحاور نفسها. فإذا تقاطع المنحنيان الممثلان لحركتهما فهذا يعني أن أحدهما سيتجاوز الآخر. وتعطي إحداثيات نقطة تقاطع الخطين موقع التجاوز.

40. المشي والركض إذا غادر منزلكم شخصان في الوقت

نفسه؛ أحدهما يعدو والآخر يمشي، وتحركا في الاتجاه نفسه بسرعتين متجهتين منتظمتين، فصف منحنى (الموقع-الزمن) لكل منهما. (2-4)

كلاهما خط مستقيم يبدأ من الموقع نفسه، ولكن ميل الخط الممثل لحركة العداء سيكون أكبر (أكثر انحداراً).

41. ماذا يمثل ميل الخط البياني لمنحنى (الموقع-الزمن)؟ (2-4)

السرعة المتجهة.

42. إذا علمت موقع جسم متحرك عند نقطتين في مسار

حركته، وكذلك الزمن الذي استغرقه الجسم للوصول من النقطة الأولى إلى الأخرى، فهل يمكنك تعيين سرعته المتجهة اللحظية، وسرعته المتجهة المتوسطة؟ فسر ذلك. (2-4)

من الممكن حساب السرعة المتجهة المتوسطة من المعلومات المعطاة، لوجود نقطتين على مسار الحركة، فبقسمة التغير

تابع الفصل 2

49. قيادة السيارة إذا قاد والدك سيارته بسرعة 90.0 km/h، بينما قاد صديقه سيارته بسرعة 95 km/h، فسبق والدك في الوصول إلى نهاية الرحلة، فما الزمن الذي سينتظره صديق والدك في نهاية الرحلة التي يبلغ طولها 50 km؟

$$d = vt$$

$$t_1 = \frac{d}{v} = \frac{50.0 \text{ km}}{90.0 \text{ km/h}}$$

$$= 0.556 \text{ h}$$

$$t_2 = \frac{d}{v} = \frac{50.0 \text{ km}}{95.0 \text{ km/h}}$$

$$= 0.526 \text{ h}$$

$$t_1 - t_2 = (0.556 \text{ h} - 0.526 \text{ h}) \left(\frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} \right)$$

$$= 1.8 \text{ min}$$

مراجعة عامة


صفحتا 55-56

50. يبين الشكل 2-28 نموذج الجسيم النقطي لحركة ولد يعبر طريقاً بشكل عرضي. ارسم منحنى (الموقع - الزمن) المكافئ للنموذج، واكتب المعادلة التي تصف حركة الولد، علماً بأن الفترات الزمنية هي 0.1 s.




الفترة الزمنية 0.1 s

الشكل 2-28



$$\Delta d = \bar{v} \Delta t \text{ هي المعادلة}$$

45. يمثل الشكل 2-27 منحنى (الموقع - الزمن) لأرنب يهرب من كلب. صف كيف يختلف هذا الرسم البياني إذا:



الشكل 2-27

a. ركض الأرنب بضعفي سرعته.

الفرق الوحيد هو أن ميل المنحنى (الخط المستقيم) سيصبح أكبر بمقدار الضعفين.

b. ركض الأرنب في الاتجاه المعاكس.

سيبقى مقدار الميل كما هو، ولكنه سيكون سالباً.

إتقان حل المسائل

صفحة 55

46. تحركت دراجة هوائية بسرعة ثابتة مقدارها 4.0 m/s مدة 0.5 s. ما المسافة التي قطعتها خلال هذه المدة؟

$$d = vt$$

$$= (4.0 \text{ m/s})(5 \text{ s})$$

$$= 20 \text{ m}$$

47. علم الفلك يصل الضوء من الشمس إلى الأرض في 8.3 min، إذا كانت سرعة الضوء 3.00 × 10⁸ m/s فما بُعد الأرض عن الشمس؟

$$d = vt$$

$$= (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})(8.3 \text{ min}) \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right)$$

$$= 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$$

48. تتحرك سيارة في شارع بسرعة 55 km/h، وفجأة ركض أمامها طفل ليعبر الشارع. إذا استغرق سائق السيارة 0.75 s ليستجيب ويضغط على الفرامل، فما المسافة التي تحركتها السيارة قبل أن تبدأ في التباطؤ؟



$$d = vt$$

$$= (55 \text{ km/h})(0.75 \text{ s}) \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right)$$

$$= 11 \text{ m}$$

تابع الفصل 2

51. يبين الشكل 2-29 منحنى (الموقع-الزمن) لحركة كل من زيد و خليل وهما يجدفان في قارين عبر نهر.




الشكل 2-29 ■

b. إذا مرت كلتا السيارتين بمحطة وقود تبعد 120 km عن المدرسة، فمتى مرّت كل منهما بالمحطة؟ حدد ذلك على الرسم.

$$t_A = \frac{d}{v_A} = \frac{120 \text{ km}}{75 \text{ km/h}} = 1.6 \text{ h}$$

$$t_B = \frac{d}{v_B} = \frac{120 \text{ km}}{85 \text{ km/h}} = 1.4 \text{ h}$$

53. ارسم منحنى (الموقع-الزمن) لسيارتين A و B تسيران نحو شاطئ يبعد 50 km عن المدرسة. عند الساعة 12:00 pm تحركت السيارة A بسرعة 40 km/h من متجر يبعد 40 km عن الشاطئ، بينما تحركت السيارة B من المدرسة عند الساعة 12:30 pm بسرعة 100 km/h. متى تصل كل من السيارتين A و B إلى الشاطئ؟



تصل السيارتان إلى الشاطئ الساعة الواحدة.

a. عند أي زمن (s) كان زيد و خليل في المكان نفسه؟

1.0 h

b. ما الزمن الذي يستغرقه زيد في التجديف قبل أن يتجاوز خليلًا؟

45 min

c. في أي موقع من النهر يوجد تيار سريع؟

من 6.0 km إلى 9.0 km من نقطة الأصل.

52. غادرت السيارتان A و B المدرسة عندما كانت قراءة ساعة الايقاف صفراً، وكانت السيارة A تتحرك بسرعة منتظمة 75 km/h، والسيارة B تتحرك بسرعة منتظمة 85 km/h.

a. ارسم منحنى (الموقع-الزمن) لحركة كل من السيارتين، ووضح بُعد كل منهما عن المدرسة عندما تشير ساعة الايقاف إلى 2.0 h. حدد ذلك على الرسم.

$$\begin{aligned} d_A &= v_A t \\ &= (75 \text{ km/h})(2.0 \text{ h}) \\ &= 150 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_B &= v_B t \\ &= (85 \text{ km/h})(2.0 \text{ h}) \\ &= 170 \text{ km} \end{aligned}$$

تابع الفصل 2

$$\bar{v} = \frac{d_f - d_i}{t_f - t_i} = \frac{3.00 \text{ m} - 12.0 \text{ m}}{46.0 \text{ s} - 37.0 \text{ s}}$$

$$= -1.00 \text{ m/s}$$

التفكير الناقد

صفحة 56


55. تصميم تجربة تمرُّ دراجة نارية أمام منزل يعتقد أصحابه أنها تتجاوز حدود السرعة المسموح بها وهي 40 km/h. صف تجربة بسيطة يمكنك إجراؤها لتقرر ما إذا كانت هذه الدراجة تتجاوز السرعة المحددة فعلاً عندما تمر أمام المنزل.

ستختلف الإجابات. من الحلول الممكنة أن تجعل عدة أشخاص يقفون على جانب الطريق وعلى مسافات متساوية بعضهم من بعض (قد تكون 10 m مثلاً)، وتعطي كل واحد منهم ساعة إيقاف، بعد ضبطها، ليقوم بتسجيل زمن مرور الدراجة النارية بجانبه على ألا تقل دقة قياس الزمن عن 1 s. ارسم منحنى (الموقع-الزمن) من المعلومات التي جمعتها، واحسب ميل أفضل خط يمر بالنقاط على الرسم. إذا كانت قيمة الميل تتجاوز 40 km/h فإن الدراجة تتجاوز السرعة المحددة. ومن الحلول الأخرى الممكنة أن تطلب إلى شخص حاصل على رخصة قيادة السيارات أن يقود سيارة على الطريق بسرعة 40 km/h وبالاتجاه نفسه الذي تتوقع أن تسلكه الدراجة النارية، فإذا اقتربت الدراجة النارية من السيارة (أي قلت المسافة بينهما) فعندئذ تكون الدراجة النارية قد تجاوزت السرعة المحددة، وإذا لم تتغير المسافة بين السيارة والدراجة النارية يكون سائق الدراجة النارية ملتزماً بالحد الأقصى للسرعة المقررة على الطريق، أما إذا نقصت المسافة بينهما فإن الدراجة تتحرك بسرعة أقل من الحد الأقصى المسموح به على الطريق.

56. تفسير الرسوم البيانية هل يمكن أن يكون المنحنى البياني لـ (الموقع والزمن) لجسم خطاً أفقيًا؟ وهل يمكن أن يكون خطاً رأسيًا؟ إذا كانت إجابتك "نعم" فصف بالكلمات هذه الحركة.

من الممكن تمثيل العلاقة بخط أفقي على منحنى (الموقع-الزمن)، وهذا يشير إلى أن موقع الجسم لا يتغير، أي أنه لا يتحرك. ولا يمكن تمثيل العلاقة بخط رأسي؛ لأن هذا يعني أن الجسم يتحرك بسرعة لا نهائية.

54. يبين الشكل 2-30 منحنى (الموقع-الزمن) لحركة علي ذهابًا وإيابًا في ممر. افترض أن نقطة الأصل عند أحد طرفي الممر.



الشكل 2-30

a. اكتب فقرة تصف حركة علي في الممر، بحيث تتطابق مع الحركة الممثلة في الرسم البياني أعلاه.

ستختلف الإجابات. (إجابة مقترحة) تحرك علي بسرعة منتظمة لمدة 8 s من نقطة البداية فقطع مسافة 6 m، ثم توقف فجأة حتى الثانية 24. ثم تحرك بسرعة منتظمة لمدة 8 s تقريباً فقطع مسافة 16 m أخرى، ثم توقف لمدة 6 s تقريباً، ثم تحرك بسرعة منتظمة في الاتجاه المعاكس لمدة 8 s فقطع مسافة 9 m، ثم توقف لمدة 5 s، ثم عاد للحركة بسرعة منتظمة في الاتجاه الأول لمدة ثانية واحدة تقريباً فقطع مسافة 3 m، ثم توقف لمدة ثانيتين ثم تحرك بسرعة منتظمة فقطع مسافة 6 m في الاتجاه المعاكس، فعاد إلى نقطة البداية.

b. متى كان موقع علي على بُعد 6.0 m؟

من 8.0 s إلى 25.0 s وعند 44.0 s

ومن 53.0 s إلى 58.0 s

c. ما الزمن بين لحظة دخول علي في الممر، ووصوله إلى موقع يبعد 12.0 m عن نقطة الأصل؟ وما السرعة المتجهة المتوسطة لعلي خلال الفترة الزمنية (37 s - 46 s)؟

$$t = 33.0 \text{ s}$$

استخدم النقاط (37.0s, 12.0m) و (46.0s, 3.00m)

تابع الفصل 2

الكتابة في الفيزياء

صفحة 56

58. حدد علماء الفيزياء سرعة الضوء 3.00×10^8 m/s. كيف توصلوا إلى هذا؟ اقرأ حول سلسلة التجارب التي أجريت لتعيين سرعة الضوء، ثم صف كيف تطورت التقنيات التجريبية لتجعل نتائج التجارب أكثر دقة.

حاول جاليليو تعيين سرعة الضوء، ولكنه لم ينجح في مساعاه. وبعد ذلك تمكن الفلكي الدنماركي (رومر) من قياس سرعة الضوء في عام 1676 م بملاحظة خسوف أقمار المشتري. وكان تقديره للسرعة 225308 km/s، وحاول كثيرون قياس سرعة الضوء بدقة أكبر باستخدام عجلات مسننة دوارة، ومرآيا دوارة.

مراجعة تراكمية

صفحة 56

59. حوّل كلا من قياسات الزمن التالية إلى ما يعادلها بالثواني:

a. 58 ns

b. 5.8×10^{-8} s

c. 0.046 Gs

d. 4.6×10^7 s

e. 9270 ms

f. 9.27 s


g. 12.3 ks

h. 1.23×10^4 s

57. وقف طلاب شعبة الفيزياء في صف واحد، وكانت المسافة بين كل طالبين 25 m، واستخدموا ساعات إيقاف لقياس الزمن الذي تمر عنده سيارة تتحرك على طريق رئيس أمام كل منهم. وتم تدوين البيانات في الجدول 2-3.

الجدول 2-3	
الموقع-الزمن	
الموقع (m)	الزمن (s)
0.0	0.0
25.0	1.3
50.0	2.7
75.0	3.6
100.0	5.1
125.0	5.9
150.0	7.0
175.0	8.6
200.0	10.3

ارسم منحنى (الموقع-الزمن) مستخدمًا البيانات الواردة في الجدول، ثم أوجد ميل الخط البياني في المنحنى، واستنتج سرعة السيارة.



ميل الخط البياني في المنحنى وسرعة السيارة 19.7 m/s.

تابع الفصل 2

مسألة تحفيز

صفحة 41

3. ما المسافة التي تفصل بينهم حينذاك؟

$$d_{\text{يوسف}} = d_{\text{ماجد}}, t = 0.71 \text{ h}$$

$$= (-16.0 \text{ km/h})(0.71 \text{ h}) + 20.0 \text{ km}$$

$$= 8.6 \text{ km} \text{ شمالاً}$$

$$d_{\text{ناصر}} = (-6.5 \text{ km/h})(0.71 \text{ h}) + 20.0 \text{ km}$$

$$= 15.4 \text{ km}$$

سيكون ناصر على مسافة 6.8 km شمال موقع التقاء كل من ماجد ويوسف.


يستمتع كل من ماجد ويوسف وناصر بممارسة الرياضة على طريق يمتد بمحاذاة الشاطئ. حيث بدأ يوسف الركض بسرعة منتظمة مقدارها 16.0 km/h من المرسى A في اتجاه الجنوب في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وفي اللحظة نفسها ومن المكان نفسه بدأ ناصر المشي بسرعة منتظمة مقدارها 6.5 km/h في اتجاه الجنوب. أما ماجد فانطلق بدراجته عند الساعة 12 ظهرًا من مرسى آخر B يبعد 20 km جنوب المرسى A بسرعة منتظمة مقدارها 40.25 km/h في اتجاه الشمال.

1. ارسم منحنيات (الموقع-الزمن) للأشخاص الثلاثة.

$$d_{\text{ماجد}} = (40.25 \text{ km/h})(t - 0.50 \text{ h})$$

$$d_{\text{يوسف}} = (-16.0 \text{ km/h})(t) + 20.0 \text{ km}$$

$$d_{\text{ناصر}} = (-6.5 \text{ km/h})(t) + 20.0 \text{ km}$$



2. متى يصبح الأشخاص الثلاثة أقرب ما يمكن بعضهم إلى بعض؟

عندما يمر ماجد بيوسف،

$$d_{\text{يوسف}} = d_{\text{ماجد}}$$

$$(40.25 \text{ km/h})(t - 0.50 \text{ h}) = (-16.0 \text{ km/h})(t) + 20.0 \text{ km}$$

وبحل المعادلة السابقة بالنسبة لـ t فإن:

$$t = 0.71 \text{ h}$$

يصبح الثلاثة أقرب ما يمكن بعضهم إلى بعض عندما يمر ماجد ويوسف بالنقطة نفسها. وتزداد المسافة الفاصلة بين يوسف وناصر بشكل ثابت، وسيمر ماجد بيوسف قبل مروره بناصر. ويمر ماجد بناصر عند الساعة 12:22 P.M.

الفصل الثاني

b. ما موقع السيارة بعد مرور 2.00 s؟

20.0 m

c. ما المسافة التي قطعتها السيارة في الفترة الزمنية

بين 1.00 s و 3.00 s؟

$$\Delta d = 30.0 \text{ m} - 10.0 \text{ m}$$

$$= 20.0 \text{ m}$$

3. يجري عداء بمعدل ثابت؛ إذ يقطع 10.0 m كل 2.0 s،


وقد بدأ العداء الجري انطلاقاً من نقطة الأصل، وتحرك

في الاتجاه الموجب مدة 3600.0 s. ويوضح الشكل

أدناه منحنى (الموقع - الزمن) لحركة العداء؛ إذ يبين

موقعه من $t = 0.0 \text{ s}$ وحتى $t = 20.0 \text{ s}$. حدد

موقع العداء عند $t = 5.0 \text{ s}$ ، وعند $t = 15.0 \text{ s}$.



عند الزمن $t = 5.0 \text{ s}$ يكون العداء في الموقع 25.0 m.

عند الزمن $t = 15.0 \text{ s}$ يكون العداء في الموقع 75.0 m.


4. غادر قطاران محطة القطارات في اللحظة نفسها؛

فانطلق القطار الأول في اتجاه الشمال الشرقي،


والقطار الثاني في اتجاه الجنوب الشرقي. وقد تم

تمثيل حركة القطارين على منحنى (الموقع - الزمن)

الموضح أدناه.



1. يوضح الشكل أدناه منحنى (الموقع - الزمن) لحركة دراجة هوائية.



a. ما موقع الدراجة الهوائية عند الزمن 1.00 min؟

35.0 m

b. ما موقع الدراجة الهوائية عند الزمن 3.50 min؟

35.0 m

c. ما إزاحة الدراجة الهوائية في الفترة الزمنية بين

1.00 min و 5.00 min؟


0.00 m

d. صف حركة الدراجة الهوائية.

الدراجة الهوائية ثابتة ولا تتحرك.

2. تم تمثيل موقع سيارة بالنسبة للزمن كما هو مبين في

الرسم البياني أدناه.




a. ما موقع السيارة عند اللحظة 0.00 s؟

40.0 m

الفصل 2 (تابع)

- b.** عند أي لحظة تتلاقى السيارتان؟
2.0 min
- c.** ما المسافة بين السيارتين بعد مرور $t = 3.0 \text{ min}$ ؟
0.75 km
- 6.** يوضح الشكل أدناه منحنيي (الموقع - الزمن) لحركة عدّاءين A و B.




- a.** ما المسافة بين العدّاءين بعد مرور 10.0 min ؟
1.50 km
- b.** عند أي لحظة تكون المسافة بين العدّاءين 1.00 km ؟
20.0 min
- c.** كم يبعد أحد العدّاءين عن الآخر بعد مرور 50.0 min ؟
0.50 km
- d.** عند أي لحظة يلتقي العدّاءان؟
40.0 min
- e.** ما المسافة التي يقطعها العدّاء B في الفترة الزمنية بين 30.0 min و 50.0 min ؟
0.00 km

- f.** ما المسافة التي يقطعها العدّاء A في الفترة الزمنية بين 30.0 min و 50.0 min ؟
1.00 km

- a.** ما موقع القطار المتجه إلى الشمال الشرقي بعد مرور 6.0 h من لحظة انطلاقه؟
600.0 km
- b.** ما موقع القطار المتجه إلى الجنوب الشرقي بعد مرور 6.0 h من لحظة انطلاقه؟
300.0 km
- c.** ما المسافة بين القطارين بعد مرور 6.0 h من لحظة انطلاقهما؟ وما المسافة بينهما بعد مرور 10.0 h من لحظة انطلاقهما؟
1500.0 km, 900.0 km
- d.** ما الزمن الذي تصبح عنده المسافة بين القطارين 600.0 km ؟
4.0 h

- e.** أي القطارين يتحرك بسرعة أكبر؟
القطار المتجه إلى الشمال الشرقي


- 5.** انطلقت السيارتان A و B في الاتجاه نفسه؛ بحيث انطلقت السيارة A قبل السيارة B بزمن مقداره 1.0 min . وقد تم تمثيل حركة السيارتين على منحنيي (الموقع - الزمن) الموضحين أدناه.



- a.** ما المسافة بين السيارتين لحظة انطلاق السيارة B عند $t = 1.0 \text{ min}$ ؟
0.75 km

الفصل 2 (تابع)

9. يمثل الشكل أدناه منحنى (الموقع - الزمن) لحركة منطاد في أثناء طيرانه.



a. ما السرعة المتجهة المتوسطة للمنطاد؟

السرعة المتجهة = الميل

$$\bar{v} = \frac{0.00 \text{ km} - (-40.0 \text{ km})}{5.0 \text{ h} - 0.0 \text{ h}}$$

$$= 8.0 \text{ km/h}$$


b. ما السرعة المتوسطة للمنطاد؟

القيمة المطلقة للميل = السرعة

$$\bar{v} = 8.0 \text{ km/h}$$

7. تتحرك لعبة قطار بسرعة ثابتة مقدارها 2.0 cm/s.

a. ارسم منحنى (الموقع - الزمن) لحركة القطار موضحاً عليه موقع القطار لفترة مقدارها 1.0 min.




b. ما ميل الخط البياني الذي يمثل حركة القطار؟

$$\text{الميل} = \frac{\text{التغير في الموقع}}{\text{التغير في الزمن}} = \frac{(120 \text{ cm})}{(60 \text{ s})}$$

$$= 2.0 \text{ cm/s}$$

ويساوي سرعة القطار

8. يوضح الشكل أدناه موقع طائرة بدلالة الزمن.



a. ما السرعة المتجهة المتوسطة للطائرة؟

السرعة المتجهة = ميل الخط

$$\bar{v} = \frac{-800.0 \text{ km} - 0.0 \text{ km}}{5.0 \text{ h} - 1.0 \text{ h}}$$

$$= -2.0 \times 10^2 \text{ km/h}$$

b. ما السرعة المتوسطة للطائرة؟

القيمة المطلقة للسرعة المتجهة تساوي السرعة


$$\bar{v} = 2.0 \times 10^2 \text{ km/h}$$

الحركة المتسارعة

مسائل تدريبية

1-3 التسارع (العجلة) (صفحات 59-69)

صفحة 64



الشكل 3-6 ■

a. متى كان القطار يتحرك بسرعة منتظمة؟

من 5.0 s إلى 15.0 s

b. خلال أي فترات زمنية كان تسارع القطار موجبا؟

من 0.0 s إلى 5.0 s

c. متى اكتسب القطار أكبر تسارع سالب؟

من 15.0 s إلى 20.0 s

4. استعن بالشكل 3-6 لإيجاد التسارع المتوسط للقطار خلال الفترات الزمنية التالية:

a. من 0.0 s إلى 5.0 s .

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{10.0 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}}{5.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 2.0 \text{ m/s}^2$$


b. من 15.0 s إلى 20.0 s .

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{4.0 \text{ m/s} - 10.0 \text{ m/s}}{20.0 \text{ s} - 15.0 \text{ s}} = -1.2 \text{ m/s}^2$$


c. من 0.0 s إلى 40.0 s

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{0.0 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}}{40.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 0.0 \text{ m/s}^2$$


1. ركضت قطة داخل منزل، ثم أبطأت من سرعتها بشكل مفاجئ، وانزلت على الأرضية الخشبية حتى توقفت. لو افترضنا أنها تباطأت بتسارع ثابت فارسم مخططاً توضيحياً للحركة يوضح هذا الموقف، واستخدم متجهات السرعة لإيجاد متجه التسارع.



2. يبين الشكل 3-5 منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) لجزء من رحلة أحمد بسيارته على الطريق. ارسم المخطط التوضيحي للحركة الممثلة في الرسم البياني، وأكمله برسم متجهات السرعة.



الشكل 3-5 ■



3. استعن بالشكل 3-6 الذي يوضح منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) لقطار لعبة؛ لتجيب عن الأسئلة التالية:

تابع الفصل 3

$$\bar{a} = \frac{4.5 \text{ m/s} - (-3.0 \text{ m/s})}{2.5 \text{ s}} = 3.0 \text{ m/s}^2$$

9. تسير حافلة بسرعة 25 m/s، ضغط السائق على الفرامل فتوقفت بعد 3.0 s.

a. ما التسارع المتوسط للحافلة في أثناء الضغط على الفرامل؟

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0.0 \text{ m/s} - 25 \text{ m/s}}{3.0 \text{ s}} = -8.3 \text{ m/s}^2$$

b. كيف يتغير التسارع المتوسط للحافلة إذا استغرقت ضعف الفترة الزمنية السابقة للتوقف؟

النصف كحد أقصى (-4.2 m/s^2)

10. كان خالد يعدو بسرعة 3.5 m/s نحو موقف حافلة لمدة 2.0 min، وفجأة نظر إلى ساعته فلاحظ أن لديه متسعاً من الوقت قبل وصول الحافلة، فأبطأ سرعة عدوه خلال الثواني العشر التالية إلى 0.75 m/s. ما تسارعه المتوسط خلال هذه الثواني العشر؟

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0.75 \text{ m/s} - 3.5 \text{ m/s}}{10.0 \text{ s}} = -0.28 \text{ m/s}^2$$

11. إذا تباطأ معدل الانجراف القاري على نحو مفاجئ من 1.0 cm/yr إلى 0.5 cm/yr خلال فترة زمنية مقدارها سنة، فكم يكون التسارع المتوسط للانجراف القاري؟


$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0.5 \text{ cm/yr} - 1.0 \text{ cm/yr}}{1.0 \text{ yr}} = -0.5 \text{ cm/yr}^2$$

مراجعة القسم

1-3 التسارع (العجلة) (صفحات 59-69) صفحة 69

12. منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) ما المعلومات التي يمكن استخلاصها من منحنى (السرعة المتجهة-الزمن)؟ مقدار السرعة المتجهة عند أي وقت، والزمن الذي يكون للجسم عنده سرعة معينة، وإشارة كل من السرعة المتجهة، والإزاحة.

5. ارسم منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) لحركة مصعد يبدأ من السكون عند الطابق الأرضي في بناية من ثلاثة طوابق، ثم يتسارع إلى أعلى لمدة 2.0 s بمقدار 0.5 m/s^2 . ويستمر في الصعود بسرعة منتظمة 1.0 m/s لمدة 12.0 s، وبعدئذ يتأثر بتسارع ثابت إلى أسفل مقداره 0.25 m/s^2 لمدة 4.0 s حتى يصل إلى الطابق الثالث.



صفحة 68

6. سيارة سباق تزداد سرعتها من 4.0 m/s إلى 36 m/s خلال فترة زمنية مقدارها 4.0 s. أوجد تسارعها المتوسط.

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{36 \text{ m/s} - 4.0 \text{ m/s}}{4.0 \text{ s}}$$

$$= 8.0 \text{ m/s}^2$$

7. إذا تباطأت سرعة سيارة سباق من 36 m/s إلى 15 m/s خلال 3.0 s، فما تسارعها المتوسط؟

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{15 \text{ m/s} - 36 \text{ m/s}}{3.0 \text{ s}} = -7.0 \text{ m/s}^2$$

8. تتحرك سيارة إلى الخلف على منحدر بفعل الجاذبية الأرضية. استطاع السائق تشغيل المحرك عندما كانت سرعتها 3.0 m/s. وبعد مرور 2.50 s من لحظة تشغيل المحرك كانت السيارة تتحرك صاعدة المنحدر بسرعة 4.5 m/s. إذا اعتبرنا اتجاه المنحدر إلى أعلى هو الاتجاه الموجب فما التسارع المتوسط للسيارة؟

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

تابع الفصل 3

13. منحنيات الموقع-الزمن، والسرعة المتجهة-الزمن ركض عداءان بسرعة منتظمة مقدارها 7.5 m/s في اتجاه الشرق، وعند الزمن $t = 0$ ، كان أحدهما على بعد 15 m إلى الشرق من نقطة الأصل، والآخر على بعد 15 m غربها.

a. ما الفرق بين الخطين البيانيين الممثلين لحركة العدائين في منحنى (الموقع-الزمن)؟

سيكون لهما الميل نفسه، ولكن موقعيهما بالنسبة إلى المحور (y) سيختلفان، حيث يكون أحدهما عند $(+15) \text{ m}$ ، والآخر عند $(-15) \text{ m}$.


b. ما الفرق بين الخطين البيانيين الممثلين لحركة العدائين في منحنى (السرعة المتجهة-الزمن)؟

سيكون الخطان البيانيان متماثلين.

14. السرعة المتجهة وضح كيف يمكنك استخدام منحنى (السرعة المتجهة-الزمن)، لتحديد الزمن الذي يتحرك عنده الجسم بسرعة معينة.

ارسم خطاً أفقياً عند السرعة المحددة. وأوجد النقطة التي يتقاطع فيها المنحنى مع هذا الخط، ثم أسقط خطاً رأسياً من نقطة التقاطع على محور الزمن t للحصول على الزمن المطلوب.

15. منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) مثل بيانياً منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) لحركة سيارة تسير في اتجاه الشرق بسرعة 25 m/s مدة 100 s ، ثم في اتجاه الغرب بسرعة 25 m/s مدة 100 s أخرى.



16. السرعة المتوسطة والتسارع المتوسط يتحرك قارب بسرعة 2 m/s في عكس اتجاه جريان نهر، ثم يدور حول نفسه وينطلق في اتجاه جريان النهر بسرعة 4.0 m/s ، إذا كان الزمن الذي استغرقه القارب في الدوران 8.0 s :

a. فما السرعة المتجهة المتوسطة للقارب؟

باعتبار أن الاتجاه الموجب هو اتجاه جريان النهر

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{v_i + v_f}{2} \\ &= \frac{-2 \text{ m/s} + (4 \text{ m/s})}{2} = 1 \text{ m/s}\end{aligned}$$



b. وما التسارع المتوسط للقارب؟

$$\begin{aligned}a &= \frac{\Delta v}{\Delta t} \\ &= \frac{v_f - v_i}{\Delta t} \\ &= \frac{(4 \text{ m/s}) - (-2 \text{ m/s})}{8 \text{ s}} \\ &= +0.8 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$


تابع الفصل 3

17. التفكير الناقد ضبط رجل مرور سائقًا يسير بسرعة تزيد 32 km/h على حد السرعة المسموح به لحظة تجاوزه سيارة أخرى تنطلق بسرعة أقل، فسجل رجل المرور على كلا السائقين إشعار مخالفة لتجاوز السرعة. وقد أصدر القاضي حكمًا على كلا السائقين. وتم اتخاذ الحكم استنادًا إلى فرضية تقول إن السيارتين كانتا تسيران بالسرعة نفسها؛ لأنه تم ملاحظتهما عندما كانت الأولى بجانب الثانية. هل كان كلٌّ من القاضي ورجل المرور على صواب؟ وضح ذلك باستخدام مخطط توضيحي للحركة، ورسم منحنى (الموقع-الزمن).
لا، كان لهما الموقع نفسه لا السرعة نفسها. فحتى يكون لهما السرعة نفسها يجب أن يكون لهما الموقع النسبي نفسه طوال الفترة الزمنية.

الرسم



مخطط توضيحي للحركة



مسائل تدريبية

2-3 الحركة بتسارع ثابت (صفحات 70-78)

صفحة 70

18. تتدحرج كرة جولف إلى أعلى تل في اتجاه حفرة الجولف. افترض أن الاتجاه نحو الحفرة هو الاتجاه الموجب وأجب عما يلي:

a. إذا انطلقت كرة الجولف بسرعة 2.0 m/s، وتباطأت بمعدل ثابت 0.50 m/s² فما سرعتها بعد مضي 2.0 s؟

$$v_f = v_i + at$$

$$= 2.0 \text{ m/s} + (-0.50 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s})$$

$$= 1.0 \text{ m/s}$$

b. ما سرعة كرة الجولف إذا استمر التسارع الثابت مدة 6.0 s؟

$$v_f = v_i + at$$


$$= 2.0 \text{ m/s} + (-0.50 \text{ m/s}^2)(6.0 \text{ s})$$

$$= -1.0 \text{ m/s}$$

تابع الفصل 3

صفحة 73

22. استخدم الشكل 11-3 لتعيين السرعة المتجهة لطائرة تتزايد سرعتها عند كل من الأزمنة التالية:



الشكل 11-3 ■

يمثل الخط B السرعة الثابتة. ولذلك يجب استخدام الخط A للحسابات التالية:

a. 1.0 s

$$v = 74 \text{ m/s} \text{ فإن } 1.0 \text{ s} \text{ عند}$$

b. 2.0 s

$$v = 78 \text{ m/s} \text{ فإن } 2.0 \text{ s} \text{ عند}$$


c. 2.5 s

$$v = 80 \text{ m/s} \text{ فإن } 2.0 \text{ s} \text{ عند}$$

23. تسير سيارة بسرعة منتظمة قدرها 25 m/s لمدة 10.0 min ، ثم ينفذ منها الوقود، فيسير السائق على قدميه في الاتجاه نفسه بسرعة 1.5 m/s لمدة 20.0 min ليصل إلى أقرب محطة وقود. وقد استغرق السائق 2.0 min لملء جالون من البنزين، ثم سار عائداً إلى السيارة بسرعة 1.2 m/s ، وأخيراً تحرك بالسيارة إلى البيت بسرعة 25 m/s في اتجاه معاكس لاتجاه رحلته الأصلية.

a. ارسم منحنى (السرعة المتجهة - الزمن) معتمداً الثانية s وحدة للزمن. إرشاد: احسب المسافة التي قطعها السائق إلى محطة الوقود، لإيجاد الزمن الذي استغرقه حتى يعود إلى السيارة.

c. صف حركة كرة الجولف بالكلمات، ثم باستخدام المخطط التوضيحي للحركة.



تتناقص سرعة الكرة في الحالة الأولى، في حين أنها تتباطأ في الحالة الثانية حتى تقف، ثم تتدحرج إلى الخلف هابطة التل بتسارع (مقدار التباطؤ نفسه).

19. تسير حافلة بسرعة 30.0 km/h ، فإذا زادت سرعتها بمعدل ثابت مقداره 3.5 m/s² فما السرعة التي تصل إليها الحافلة بعد 6.8 s ؟

$$\begin{aligned} v_f &= v_i + at \\ &= 30.0 \text{ km/h} \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) \\ &\quad + (3.5 \text{ m/s}^2)(6.8 \text{ s}) \\ &= 32.1 \text{ m/s} \end{aligned}$$


20. إذا تسارعت سيارة من السكون بمقدار ثابت 5.5 m/s² فما الزمن اللازم لتصل سرعتها إلى 28 m/s ؟ لذا فإن

$$\begin{aligned} v_f &= v_i + at \\ t &= \frac{v_f - v_i}{a} \\ &= \frac{28 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}}{5.5 \text{ m/s}^2} \\ &= 5.1 \text{ s} \end{aligned}$$

21. تتباطأ حركة سيارة سرعتها من 22 m/s بمعدل ثابت مقداره 2.1 m/s² . احسب الزمن الذي تستغرقه السيارة لتصبح سرعتها 3.0 m/s.

$$\begin{aligned} v_f &= v_i + at \\ t &= \frac{v_f - v_i}{a} \\ &= \frac{3.0 \text{ m/s} - 22 \text{ m/s}}{-2.1 \text{ m/s}^2} \\ &= 9.0 \text{ s} \end{aligned}$$

تابع الفصل 3



المسافة التي قطعها السائق إلى محطة الوقود:


$$d = vt = (1.5 \text{ m/s})(20.0 \text{ min}) \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right)$$

$$= 1800 \text{ m} = 1.8 \text{ km}$$


الزمن الذي استغرقه حتى يعود إلى السيارة:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{1800 \text{ m}}{1.2 \text{ m/s}} = 1500 \text{ s} = 25 \text{ min}$$


b. ارسم منحنى (الموقع-الزمن) باستخدام المساحات تحت منحنى (السرعة المتجهة-الزمن).



24. يوضح الشكل 3-12 منحنى (الموقع-الزمن) لحركة حصان في حقل. ارسم منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) المتوافق معه، باستخدام مقياس الزمن نفسه.



■ الشكل 3-12



صفحة 77

25. يتحرك متزلج على لوح تزلج بسرعة منتظمة 1.75 m/s ، وعندما بدأ يصعد مستوى مائلاً تباطأت سرعته وفق تسارع ثابت 0.20 m/s^2 . ما الزمن الذي استغرقه حتى توقف عند نهاية المستوى المائل؟

$$v_f = v_i + at$$

$$t = \frac{v_f - v_i}{a} = \frac{0.0 \text{ m/s} - 1.75 \text{ m/s}}{-0.20 \text{ m/s}^2} = 8.8 \text{ s}$$

26. تسير سيارة سباق في حلبة بسرعة 44 m/s ، وتباطأ بمعدل ثابت بحيث تصل سرعتها إلى 22 m/s خلال 11 s . ما المسافة التي قطعها السيارة خلال هذا الزمن؟

$$a = \frac{v_f - v_i}{t} = \frac{22 \text{ m/s} - 44 \text{ m/s}}{11 \text{ s}} = -2 \text{ m/s}^2$$

$$\Delta d = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a} = \frac{(22 \text{ m/s})^2 - (44 \text{ m/s})^2}{-2 \times 2 \text{ m/s}^2} = 363 \text{ m}$$

27. تسارع سيارة بمعدل ثابت من 15 m/s إلى 25 m/s لتقطع مسافة 125 m . ما الزمن الذي استغرقته السيارة لتصل إلى هذه السرعة؟

$$\Delta d = \bar{v} \Delta t = \left(\frac{v_i + v_f}{2} \right) \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{2\Delta d}{v_i + v_f}$$

$$= \frac{2(125 \text{ m})}{(15 \text{ m/s} + 25 \text{ m/s})} = 6.2 \text{ s}$$

28. يتحرك راكب دراجة هوائية وفق تسارع ثابت ليصل إلى سرعة مقدارها 7.5 m/s خلال 4.5 s . إذا كانت إزاحة الدراجة خلال فترة التسارع تساوي 19 m ، فأوجد السرعة الابتدائية.

$$\bar{v} = \frac{(v_f + v_i)}{2}$$

$$\Delta d = \bar{v} \Delta t = \frac{(v_f + v_i) \Delta t}{2}$$

$$v_i = \frac{2\Delta d}{\Delta t} - v_f$$

$$= \frac{(2)(19 \text{ m})}{4.5 \text{ s}} - 7.5 \text{ m/s}$$


$$= 0.94 \text{ m/s}$$

تابع الفصل 3

29. يركض رجل بسرعة 4.5 m/s مدة 15.0 min، ثم يصعد تلاً يتزايد ارتفاعه تدريجياً، فتتباطأ سرعته بمقدار ثابت 0.05 m/s² مدة 90.0 s حتى يتوقف. أوجد المسافة التي ركضها.

$$\begin{aligned} d &= v_1 t_1 + \frac{1}{2}(v_{2f} + v_{2i}) t_2 \\ &= (4.5 \text{ m/s})(15.0 \text{ min}) \left(\frac{60 \text{ s}}{\text{min}} \right) + \frac{1}{2}(0.0 \text{ m/s} + 4.5 \text{ m/s})(90.0 \text{ s}) \\ &= 4.3 \times 10^3 \text{ m} \end{aligned}$$

30. يتدرب خالد على ركوب الدراجة الهوائية، حيث يدفعه والده فيكتسب تسارعاً ثابتاً مقداره 0.50 m/s² لمدة 6.0 s، ثم يقود خالد الدراجة بمفرده بسرعة 3.0 m/s مدة 6.0 s قبل أن يسقط أرضاً. ما مقدار إزاحة خالد؟
إرشاد: حل هذه المسألة ارسم منحني (السرعة المتجهة - الزمن)، ثم احسب المساحة المحصورة تحته.



$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{1}{2}(3.0 \text{ m/s})(6.0 \text{ s}) \\ &= 9.0 \text{ m} \end{aligned}$$

الجزء 1: التسارع الثابت

$$\begin{aligned} d_2 &= (3.0 \text{ m/s})(12.0 \text{ s} - 6.0 \text{ s}) \\ &= 18 \text{ m} \end{aligned}$$

الجزء 2: السرعة المتجهة الثابتة

$$\begin{aligned} d &= d_1 + d_2 = 9.0 \text{ m} + 18 \text{ m} \\ &= 27 \text{ m} \end{aligned}$$

وعليه، فإن:

31. بدأت ركوب دراجتك الهوائية من قمة تل، ثم هبطت إلى أسفل بتسارع ثابت 2.00 m/s²، وعندما وصلت إلى أسفل التل كانت سرعتك قد بلغت 18.0 m/s. وواصلت استخدام دواسات الدراجة لتحافظ على هذه السرعة مدة 1.00 min. ما بُعدك عن قمة التل؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(d_f - d_i) \text{ و } d_i = 0.00 \text{ m}$$

الجزء 1: التسارع الثابت

ولذلك فإن:

$$d_f = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a}$$

$$v_i = 0.00 \text{ m/s}$$

وبما أن:

$$\begin{aligned} d_f &= \frac{v_f^2}{2a} \\ &= \frac{(18.0 \text{ m/s})^2}{(2)(2.00 \text{ m/s}^2)} \\ &= 81.0 \text{ m} \end{aligned}$$

الجزء 2: السرعة المتجهة الثابتة

$$\begin{aligned} d_2 &= vt = (18.0 \text{ m/s})(60.0 \text{ s}) \\ &= 1.08 \times 10^3 \text{ m} \end{aligned}$$

تابع الفصل 3

وعليه، فإن:

$$\begin{aligned} d &= d_1 + d_2 \\ &= 81.0 \text{ m} + 1.08 \times 10^3 \text{ m} \\ &= 1.16 \times 10^3 \text{ m} \end{aligned}$$

32. يتدرب حسن استعداداً للمشاركة في سباق الـ 5.0 km، فبدأ تدريباته بالركض بسرعة منتظمة مقدارها 4.3 m/s لمدة 19 min، ثم تسارع بمعدل ثابت حتى اجتاز خط النهاية بعد مضي 19.4 s. ما مقدار تسارعه خلال الجزء الأخير من التدريب؟

$$\begin{aligned} d &= vt \\ &= (4.3 \text{ m/s})(19 \text{ min}) \left(\frac{60 \text{ s}}{\text{min}} \right) \\ &= 4902 \text{ m} \end{aligned}$$

الجزء 2: التسارع الثابت

$$\begin{aligned} d_f &= d_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2 \\ a &= \frac{2(d_f - d_i - v_i t)}{t^2} \\ &= \frac{(2)(5.0 \times 10^3 \text{ m} - 4902 \text{ m} - (4.3 \text{ m/s})(19.4 \text{ s}))}{(19.4 \text{ s})^2} \\ &= 0.077 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

مراجعة القسم

2-3 الحركة بتسارع ثابت (صفحات 78-70)

صفحة 78

33. التسارع في أثناء قيادة رجل سيارته بسرعة 23 m/s شاهد غزالاً يقف وسط الطريق، فاستخدم الفرامل عندما كان على بُعد 210 m من الغزال. فإذا لم يتحرك الغزال، وتوقفت السيارة تمامًا قبل أن تمس جسمه، فما مقدار التسارع الذي أحدثته فرامل السيارة؟

$$\begin{aligned} v_f^2 &= v_i^2 + 2a(d_f - d_i) \\ a &= \frac{v_f^2 - v_i^2}{2(d_f - d_i)} \\ &= \frac{(0.0 \text{ m/s})^2 - (23 \text{ m/s})^2}{(2)(210 \text{ m})} \\ &= -1.3 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

34. الإزاحة إذا أعطيت السرعتين المتجهتين الابتدائية والنهائية، والتسارع الثابت لجسم، وطلب منك إيجاد الإزاحة، فما المعادلة التي ستستخدمها؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(d_f - d_i)$$

35. المسافة بدأ متزلج حركته من السكون في خط مستقيم، وزادت سرعته إلى 5.0 m/s خلال 4.5 s، ثم استمر في التزلج بهذه السرعة المنتظمة مدة 4.5 s أخرى. ما المسافة الكلية التي تحركها المتزلج على مسار التزلج؟

تابع الفصل 3

التسارع

$$\begin{aligned}d_f &= \bar{v}t_f = \frac{v_i + v_f}{2}(t_f) \\ &= \left(\frac{0.0 \text{ m/s} + 5.0 \text{ m/s}}{2}\right)(4.5 \text{ s}) \\ &= 11.25 \text{ m}\end{aligned}$$

السرعة الثابتة

$$\begin{aligned}d_f &= v_f t_f \\ &= (5.0 \text{ m/s})(4.5 \text{ s}) = 22.5 \text{ m} \\ \text{المسافة الكلية} &= 11.25 \text{ m} + 22.5 \text{ m} \\ &= 34 \text{ m}\end{aligned}$$

36. السرعة النهائية تسارع طائرة بانتظام من السكون بمقدار 5.0 m/s^2 . ما سرعة الطائرة بعد قطعها مسافة $5.0 \times 10^2 \text{ m}$ ؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(d_f - d_i) \text{ و } d_i = 0$$

وعليه فإن:

$$\begin{aligned}v_f^2 &= v_i^2 + 2ad_f \\ v &= \sqrt{(0.0 \text{ m/s})^2 + 2(5.0 \text{ m/s}^2)(5.0 \times 10^2 \text{ m})} \\ &= 71 \text{ m/s}\end{aligned}$$

37. السرعة النهائية تسارعت طائرة بانتظام من السكون بمقدار 5.0 m/s^2 لمدة 14 s ، ما السرعة النهائية التي تكتسبها الطائرة؟

$$\begin{aligned}v_f &= v_i + at_f \\ &= 0 + (5.0 \text{ m/s}^2)(14 \text{ s}) \\ &= 7.0 \times 10^1 \text{ m/s}\end{aligned}$$

38. المسافة بدأت طائرة حركتها من السكون، وتسارعت بمقدار ثابت 3.00 m/s^2 لمدة 30.0 s قبل أن ترتفع عن سطح الأرض.

a. ما المسافة التي قطعتها الطائرة؟

$$\begin{aligned}d_f &= v_i t_f + \frac{1}{2}at_f^2 \\ &= (0.0 \text{ m/s})(30.0 \text{ s}) + \left(\frac{1}{2}\right)(3.00 \text{ m/s}^2)(30.0 \text{ s})^2 \\ &= 1.35 \times 10^3 \text{ m}\end{aligned}$$

b. ما سرعة الطائرة لحظة إقلاعها؟

$$\begin{aligned}v_f &= v_i + at_f \\ &= 0.0 \text{ m/s} + (3.0 \text{ m/s}^2)(30.0 \text{ s}) \\ &= 90.0 \text{ m/s}\end{aligned}$$

تابع الفصل 3

b. ما المسافة التي تقطعها القطعة خلال هذا الزمن؟

$$d = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$= (0.0 \text{ m/s})(4.0 \text{ s}) + \left(\frac{1}{2}\right)(-9.80 \text{ m/s}^2)(4.0 \text{ s})^2$$

$$= -78 \text{ m}$$

تسقط قطعة القرميد مسافة 78 m

c. كيف تختلف إجابتك عن المسألة إذا قمت باختيار النظام الإحداثي بحيث يكون الاتجاه المعاكس هو الاتجاه الموجب.

سرعة القطعة بعد 4.0 s:

افتراض الآن أن الاتجاه نحو أسفل هو الموجب،

$$v_f = v_i + at, a = g = 9.80 \text{ m/s}^2$$

$$v_f = 0.0 \text{ m/s} + (9.80 \text{ m/s}^2)(4.0 \text{ s})$$

باعتبار الاتجاه الموجب إلى الأسفل +39 m/s

المسافة التي تقطعها القطعة خلال هذا الزمن:

$$d = v_i t + \frac{1}{2} a t^2, a = g = 9.80 \text{ m/s}^2$$

$$= (0.0 \text{ m/s})(4.0 \text{ s}) + \left(\frac{1}{2}\right)(9.80 \text{ m/s}^2)(4.0 \text{ s})^2$$

$$= +78 \text{ m}$$

ما زالت قطعة القرميد تسقط مسافة تساوي 78 m

42. أسقط طالب كرة من نافذة ترتفع 3.5 m عن الرصيف.

ما سرعتها لحظة ملامستها أرضية الرصيف؟


$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad, a = g \text{ و } v_i = 0$$

$$v_f = \sqrt{2gd}$$

$$= \sqrt{(2)(9.80 \text{ m/s}^2)(3.5 \text{ m})}$$

$$= 8.3 \text{ m/s}$$

39. الرسوم البيانية يسير عداء نحو خط البداية بسرعة منتظمة، ويأخذ موقعه قبل بدء السباق، وينتظر حتى يسمع صوت طلقة البداية، ثم ينطلق فيتسارع حتى يصل إلى سرعة منتظمة. فيحافظ على هذه السرعة حتى يجتاز خط النهاية، ثم يتباطأ إلى أن يمشي، فيستغرق في ذلك وقتاً أطول مما استغرقه لزيادة سرعته في بداية السباق. مثل حركة العداء باستخدام الرسم البياني لكل من منحنى (السرعة المتجهة-الزمن)، ومنحنى (الموقع-الزمن). ارسم الرسمين أحدهما فوق الآخر باستخدام مقياس الزمن نفسه، وبيّن على منحنى (الموقع-الزمن) مكان كل من نقطة البداية وخط النهاية.



40. التفكير الناقد صف كيف يمكنك أن تحسب تسارع سيارة، مبيناً أدوات القياس التي ستستخدمها.

يقرأ شخص قياس ساعة الإيقاف ويعلن بصوت مرتفع الفترات الزمنية، ويقرأ شخص آخر قياس عداد السرعة عند كل زمن ويسجله. ويرسم منحنى (السرعة المتجهة-الزمن)، ثم يوجد الميل.

مسائل تدريبية

3-3 السقوط الحر (صفحات 82-79)

صفحة 82

41. أسقط عامل بناء قطعة قرميد من سطح بناء.

a. ما سرعة القطعة بعد 4.0 s؟

افتراض أن الاتجاه نحو أعلى هو الموجب،

$$v_f = v_i + at, a = -g = -9.80 \text{ m/s}^2$$

$$v_f = 0.0 \text{ m/s} + (-9.80 \text{ m/s}^2)(4.0 \text{ s})$$

باعتبار الاتجاه الموجب إلى الأعلى -39 m/s

تابع الفصل 3

b. إذا أمسكت الكرة عند عودتها إلى الارتفاع نفسه الذي أطلقت منه، فما الزمن الذي استغرقته في الهواء؟
 $v_f = v_i + at$

ولما كانت $a = -g$ ، فإن:

$$v_i = 2.2 \text{ m/s}$$

$$v_f = -2.2 \text{ m/s} \quad \text{و}$$

$$t = \frac{v_f - v_i}{-g}$$

$$= \frac{-2.2 \text{ m/s} - 2.2 \text{ m/s}}{-9.80 \text{ m/s}^2}$$

$$= 0.45 \text{ s}$$

مراجعة القسم

3-3 السقوط الحر (صفحات 82-79)
 صفحة 82

45. أقصى ارتفاع وزمن التحليق إذا كان تسارع الجاذبية على سطح المريخ يساوي $\left(\frac{1}{3}\right)$ تسارع الجاذبية على سطح الأرض، ثم قذفت كرة إلى أعلى من فوق سطح كل من المريخ والأرض بالسرعة نفسها:

a. قارن بين أقصى ارتفاع تصله الكرة على سطح المريخ وسطح الأرض.

عند أقصى ارتفاع تكون: $v_f = 0$

ولذلك فإن:

$$d_f = \frac{v_i^2}{2g}$$

أو ثلاثة أمثال الارتفاع فوق سطح الأرض.

b. قارن بين زمني التحليق.

يحسب زمن التحليق بواسطة:

$$d_f = \frac{1}{2}gt_f^2$$

أو

$$t_f = \sqrt{\frac{2d_f}{g}}$$

تضرب المسافة في 3 وتقسم g على 3، وعليه سيكون زمن التحليق ثلاثة أمثال زمن التحليق فوق سطح الأرض.

43. قُذفت كرة تنس رأسياً إلى أعلى بسرعة ابتدائية 22.5 m/s ، وتم الإمساك بها عند عودتها إلى الارتفاع نفسه الذي قُذفت منه.

a. احسب الارتفاع الذي وصلت إليه الكرة.

$a = -g$ وعند أقصى ارتفاع $v_f = 0$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad$$

تصبح

$$v_i^2 = 2gd$$

$$d = \frac{v_i^2}{2g} = \frac{(22.5 \text{ m/s})^2}{(2)(9.80 \text{ m/s}^2)}$$

$$= 25.8 \text{ m}$$

b. ما الزمن الذي استغرقته الكرة في الهواء؟ إرشاد: الزمن الذي تستغرقه الكرة في الصعود يساوي الزمن الذي تستغرقه في الهبوط.

احسب زمن الصعود باستخدام $v_f = v_i + at$

علمًا أن: $a = -g$ و $v_f = 0$

$$t = \frac{v_i}{g} = \frac{22.5 \text{ m/s}}{9.80 \text{ m/s}^2}$$

$$= 2.30 \text{ s}$$

زمن السقوط يساوي زمن الصعود، لذا يكون الزمن الذي استغرقته الكرة في الهواء:

$$t_{\text{الهواء}} = 2t_{\text{الصعود}} = (2)(2.30 \text{ s}) = 4.60 \text{ s}$$

44. رميت كرة بشكل رأسي إلى أعلى. وكان أقصى ارتفاع وصلت إليه 0.25 m :

a. ما السرعة الابتدائية للكرة؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta d$$

$$v_i = \sqrt{v_f^2 - 2g\Delta d}$$

حيث إن:

$$a = -g$$

و $v_f = 0$ عند أقصى ارتفاع، ولذلك فإن:

$$v_i = \sqrt{(0.0 \text{ m/s})^2 - (2)(-9.80 \text{ m/s}^2)(0.25 \text{ m})}$$

$$= 2.2 \text{ m/s}$$

تابع الفصل 3

b. ما الارتفاع الذي وصلت إليه الكرة بعد أن ركلها الطالب؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(\Delta d)$$

حيث إن: $a = -g$


$$\begin{aligned} \Delta d &= \frac{v_f^2 - v_i^2}{-2g} \\ &= \frac{(0.0 \text{ m/s})^2 - (15 \text{ m/s})^2}{(-2)(9.80 \text{ m/s}^2)} \\ &= 11 \text{ m} \end{aligned}$$

49. التفكير الناقد عند قذف كرة رأسياً إلى أعلى، تستمر في الارتفاع حتى تصل إلى موقع معين، ثم تسقط إلى أسفل، وتكون سرعتها المتجهة اللحظية عند أقصى ارتفاع صفراً. هل تتسارع الكرة عند أقصى ارتفاع؟ صمم تجربة لإثبات صحة أو خطأ إجابتك.

الكرة تتسارع؛ لأن سرعتها تتغير. التقط صوراً للكرة في أثناء سقوطها باستخدام تقنية خاصة (المصباح الومض)، ثم استخدم هذه الصور في قياس موقع الكرة وحساب سرعتها.

تقويم الفصل خريطة المفاهيم صفحة 87

50. أكمل خريطة المفاهيم أدناه باستخدام الرموز والمصطلحات التالية: v , m , d , m/s^2 ، التسارع، السرعة المتجهة.



46. السرعة والتسارع افترض أنك قذفت كرة إلى أعلى. صف التغيرات في كل من سرعة الكرة المتجهة وتسارعها.

تتناقص السرعة بمعدل ثابت في أثناء صعود الكرة إلى أعلى. ويكون مقدار السرعة مساوياً للصفر عند أقصى ارتفاع. وعندما تأخذ الكرة في السقوط، تبدأ سرعتها بالازدياد في الاتجاه السالب حتى تصل إلى الارتفاع الذي انطلقت منه. وعند هذه النقطة يكون للكرة مقدار السرعة نفسه الذي اكتسبته عندما قذفت إلى الأعلى. أما التسارع فيبقى منتظماً طوال فترة تحليق الكرة.

47. السرعة النهائية أسقط أخوك -بناءً على طلبك- مفاتيح المنزل من نافذة الطابق الثاني. فإذا التقطتها على بُعد 4.3 m من نقطة السقوط، فاحسب سرعة المفاتيح عند التقاطك لها.

الاتجاه نحو الأعلى هو الموجب.

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta d$$

ولما كانت $a = -g$ ، فإن:

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_i^2 - 2g\Delta d} \\ &= \sqrt{(0.0 \text{ m/s})^2 - (2)(9.80 \text{ m/s}^2)(-4.3 \text{ m})} \\ &= 9.2 \text{ m/s} \end{aligned}$$

48. السرعة المتجهة الابتدائية وأقصى ارتفاع يتدرب طالب على ركل كرة القدم رأسياً إلى أعلى، وتعود الكرة إثر كل ركلة لتصطدم بقدمه. إذا استغرقت الكرة من لحظة ركلها حتى اصطدامها بقدمه 3.0 s:

a. فما السرعة المتجهة الابتدائية للكرة؟

اختر النظام الإحداثي على أن يكون الاتجاه الموجب نحو الأعلى، ونقطة الأصل عند النقطة التي تركل فيها الكرة. واختر الزمن الابتدائي في اللحظة التي تركل فيها الكرة، والزمن النهائي في اللحظة التي تصل فيها الكرة إلى نقطة أقصى ارتفاع في مسار تحليقها.

$$v_f = v_i + at_f$$

ولما كانت $a = -g$ ، فإن:

$$\begin{aligned} v_i &= v_f + gt_f \\ &= 0.0 \text{ m/s} + (9.80 \text{ m/s}^2)(1.5 \text{ s}) \\ &= 15 \text{ m/s} \end{aligned}$$

نعم، تكون السرعة المتجهة للسيارة موجبة أو سالبة حسب اتجاه حركتها من نقطة مرجعية ما. ويكون الجسم خاضعاً لتسارع موجب عندما تزداد سرعته في الاتجاه الموجب، أو عندما تنقص سرعته في الاتجاه السالب. ويمكن أن تتغير إشارة سرعة السيارة في أثناء حركتها بتسارع منتظم. فمثلاً، ربما تكون سائراً في اتجاه اليمين، في حين يكون التسارع في اتجاه اليسار. تخفض السيارة من سرعتها، ثم تتوقف، ثم تأخذ بالتسارع في اتجاه اليسار.

56. هل يمكن أن تتغير السرعة المتجهة لجسم عندما يكون تسارعه ثابتاً؟ إذا أمكن ذلك فأعط مثلاً، وإذا لم يمكن، فوضح ذلك. (3-1)

نعم، يمكن أن تتغير السرعة المتجهة للجسم عندما يكون تسارعه ثابتاً. مثال: إسقاط كتاب. كلما زاد زمن السقوط، ازدادت سرعته أكثر، ويبقى التسارع ثابتاً g .

57. إذا كان منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) لجسم ما خطاً مستقيماً يوازي محور الزمن t ، فماذا يمكنك أن تستنتج عن تسارع الجسم؟ (3-1)

عندما يكون منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) خطاً مستقيماً موازياً لمحور الزمن t فإن التسارع يكون صفراً، والجسم يتحرك بسرعة ثابتة.

58. ماذا تمثل المساحة تحت منحنى (السرعة المتجهة-الزمن)؟ (3-2) التغيير في الإزاحة.

59. اكتب معادلات كل من الموقع والسرعة المتجهة والزمن لجسم يتحرك وفق تسارع ثابت. (3-2)

$$\Delta d = \left(\frac{v_f + v_i}{2} \right) t_f$$

$$v_f = v_i + at_f$$

$$t_f = \frac{(v_f - v_i)}{a}$$

60. عند إسقاط كرتين متماثلتين في الحجم إحداهما من الألومنيوم والأخرى من الفولاذ من الارتفاع نفسه فإنهما تصلان سطح الأرض عند اللحظة نفسها. لماذا؟ (3-3)

تتسارع الأجسام جميعها في اتجاه الأرض بالمقدار نفسه.

51. ما العلاقة بين السرعة المتجهة والتسارع؟ (3-1)

التسارع هو التغير في السرعة المتجهة مقسوماً على الفترة الزمنية التي حدث فيها التغير؛ إنه معدل التغير في السرعة المتجهة.

52. أعط مثلاً على كل مما يلي: (3-1)


a. جسم تتناقص سرعته وله تسارع موجب.

سيارة تتحرك إلى الخلف بسرعة متناقصة، باعتبار الاتجاه إلى الأمام موجباً.

b. جسم تتزايد سرعته، وله تسارع سالب.

سيارة تتحرك إلى الخلف بسرعة متزايدة في النظام الإحداثي نفسه.

53. يبين الشكل 3-16 منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) لسيارة تتحرك على طريق. صف كيف تتغير السرعة مع الزمن. (3-1)



الشكل 3-16 ■

تبدأ السيارة حركتها من السكون وتزيد من سرعتها. ومع ازدياد سرعة السيارة يغير السائق ناقل الحركة (الجير).

54. ماذا يمثل ميل المماس لمنحنى (السرعة المتجهة-الزمن)؟ (3-1)

التسارع اللحظي

55. هل يمكن أن يكون لسيارة تتحرك على طريق عام سرعة متجهة سالبة وتسارع موجب في الوقت نفسه؟ وضح ذلك. وهل يمكن أن تتغير إشارة السرعة المتجهة لسيارة في أثناء حركتها بتسارع ثابت؟ وضح ذلك. (3-1)

تابع الفصل 3


68. تظهر في منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) في الشكل 16-3 ثلاثة مقاطع نتجت عندما غير السائق ناقل الحركة. صف التغيرات في السرعة المتجهة للسيارة وتسارعها أثناء المقطع الأول. هل التسارع قبل لحظة تغيير الناقل أكبر أم أصغر من التسارع في اللحظة التي تلي التغيير؟ وضح إجابتك.

تتزايد السرعة في البداية بشكل مطرد، ثم تتزايد ببطء. ويكون التسارع كبيراً عند البداية، ولكنه يتناقص كلما ازدادت السرعة المتجهة للجسم. وأخيراً، فمن الضروري للسائق أن ينقل ناقل الحركة إلى الغيار الثاني، ويكون التسارع أصغر قبل لحظة تغيير ناقل الحركة؛ لأن الميل يكون أقل عند هذه النقطة على المنحنى. وعند كل مرة يغير السائق ناقل الحركة (الجير) وتُعشَق التروس، يزداد التسارع ويزداد ميل المنحنى.

69. استخدم الرسم البياني في الشكل 16-3 لتعيين الفترة الزمنية التي يكون التسارع خلالها أكبر ما يمكن، والفترة الزمنية التي يكون التسارع خلالها أصغر ما يمكن.

يكون التسارع أكبر ما يمكن في الفترة الزمنية التي تبدأ من $t = 0$ وتنتهي عند $t = \frac{1}{2}s$ وأقل ما يمكن عند $t = 33s$.

70. وضح كيف تسير بحيث تمثل حركتك كلاً من منحنيني (الموقع-الزمن) الموضحين في الشكل 17-3.



الشكل 17-3 ■

أتحرك في الاتجاه الموجب بسرعة منتظمة، ثم أتحرك في الاتجاه الموجب بسرعة متزايدة لزمناً قصيراً، أستمّر في السير بسرعة متوسطة لفترة زمنية تساوي ضِعْفِي الفترة السابقة، وأخفّض سرعتي لفترة زمنية قصيرة، ثم أتوقف. وأستمّر في التوقف، ثم استدير إلى الخلف، وأكرر الخطوات حتى أصل إلى الموقع الأصلي.

61. اذكر بعض الأمثلة على أجسام تسقط سقوطاً حرّاً ولا يمكن إهمال تأثير مقاومة الهواء فيها. (3-3) ستختلف إجابات الطلاب. بعض الأمثلة: ورق، مظلة هبوط، أوراق الشجر، الريش.

62. اذكر بعض الأمثلة لأجسام تسقط سقوطاً حرّاً يمكن إهمال تأثير مقاومة الهواء فيها. (3-3) ستختلف إجابات الطلاب. بعض الأمثلة: كرة فولاذية، صخرة، وشخص يسقط من ارتفاع منخفض.

تطبيق المفاهيم (صفحتا 87-88)

63. هل للسيارة التي تتباطأ تسارع سالب دائماً؟ فسّر إجابتك.

لا، إذا كان المحور الموجب يشير إلى اتجاه يعاكس السرعة المتجهة، فإن التسارع سيكون موجباً.

64. تندرج كرة كريكت بعد ضربها بالمضرب، ثم تتباطأ وتتوقف. هل لسرعة الكرة المتجهة وتسارعها الإشارة نفسها؟ لا، لأن لهما إشارتين مختلفتين.

65. إذا كان تسارع جسم يساوي صفراً فهل هذا يعني أن سرعته المتجهة تساوي صفراً؟ أعط مثالاً. لا، عندما تكون السرعة منتظمة فإن التسارع يساوي صفراً.

66. إذا كانت السرعة المتجهة لجسم عند لحظة ما تساوي صفراً فهل من الضروري أن يساوي تسارعه صفراً؟ أعط مثالاً.

لا، عندما تندرج الكرة صاعدة تلة، تكون سرعتها المتجهة لحظة تغيير اتجاه تدرجها صفراً ولكن تسارعها لا يساوي صفراً.

67. إذا أعطيت جدولاً يبين السرعة المتجهة لجسم عند أزمنة مختلفة، كيف يمكنك أن تكتشف إذا كان التسارع ثابتاً أم غير ثابت؟

أرسم منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) وألاحظ إذا كان المنحنى خطاً مستقيماً، أو أحسب التسارع باستخدام $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ وأقارن بين الإجابات لأرى إذا كانت متساوية.

تابع الفصل 3

74. لكوكب المشتري ثلاثة أمثال التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية تقريباً. افترض أن كرة قذفت رأسياً بالسرعة المتجهة الابتدائية نفسها على كل من الأرض والمشتري، مع إهمال تأثير مقاومة الغلاف الجوي للأرض وللمشتري، وبافتراض أن قوة الجاذبية هي القوة الوحيدة المؤثرة في الكرة:

a. قارن بين أقصى ارتفاع تصله الكرة على كل من المشتري والأرض.

العلاقة عكسية بين d_f و g

$$d_f = \frac{(v_f^2 - v_i^2)}{2g}$$

فإذا ازدادت (g) بثلاثة أضعاف، أي أن:

$$d_f = \frac{(v_f^2 - v_i^2)}{2(3g)}$$

فإن d_f تتغير بمقدار $\frac{1}{3}$. بسبب العلاقة العكسية بين d_f و g .

b. إذا قذفت الكرة على المشتري بسرعة متجهة ابتدائية تساوي ثلاثة أمثال السرعة المتجهة في الفقرة a، فكيف سيؤثر ذلك في إجابتك؟

من العلاقة السابقة $d_f = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2g}$ وعندما تكون $v_f = 0 \text{ m/s}$ ، فإن أقصى ارتفاع على الأرض يكون $d_f = \frac{-v_i^2}{2g}$. أما على المشتري - حيث التسارع يساوي ثلاثة أمثال تسارع الجاذبية الأرضية - فإذا قذفت الكرة بسرعة تساوي $3v_i$ يكون أقصى ارتفاع لها هو:

$$d_f = \frac{-(3v_i)^2}{2(3g)} = \frac{-9v_i^2}{2(3g)} = \frac{-3v_i^2}{2g}$$


أي أن أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة على المشتري يساوي ثلاثة أمثال أقصى ارتفاع تصل إليه على الأرض.

75. أسقطت الصخرة A من تل، وفي اللحظة نفسها قذفت الصخرة B إلى الأعلى من الموقع نفسه:


a. أي الصخرتين ستكون سرعتها المتجهة أكبر لحظة الوصول إلى أسفل التلة؟

ستصطدم الصخرة B بالأرض بسرعة أكبر.

71. ارسم منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) لكل من الرسوم البيانية في الشكل 18-3.



الشكل 18-3



72. قذف جسم رأسياً إلى أعلى فوصل أقصى ارتفاع له بعد مضي 7.0 s، وسقط جسم آخر من السكون فاستغرق 7.0 s للوصول إلى سطح الأرض. قارن بين إزاحتي الجسمين خلال هذه الفترة الزمنية.

تحرك كلا الجسمين مقدار الإزاحة نفسها، حيث يرتفع الجسم الذي قذف رأسياً إلى أعلى إلى الارتفاع نفسه الذي سقط منه الجسم الآخر.

73. التسارع الناتج عن جاذبية القمر (g_m) يساوي $\frac{1}{6}$ التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية (g).

a. إذا أسقطت كرة من ارتفاع ما على سطح القمر، فهل تصطدم بسطح القمر بسرعة أكبر أم مساوية أم أقل من سرعة الكرة نفسها إذا أسقطت من الارتفاع نفسه على سطح الأرض؟

ستصطدم الكرة بسطح القمر بسرعة أقل؛ لأن التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية على سطح القمر أقل.

b. هل الزمن الذي تستغرقه الكرة لتصل إلى سطح القمر أكبر، أم أقل، أم مساوٍ للزمن الذي تستغرقه للوصول إلى سطح الأرض؟


ستستغرق الكرة زمناً أكبر في سقوطها على سطح القمر.

تابع الفصل 3

78. سيارة سرعتها المتجهة 22 m/s تسارعت بانتظام بمقدار 1.6 m/s^2 لمدة 6.8 s . ما سرعتها النهائية؟

$$\begin{aligned} v_f &= v_i + at_f \\ &= 22 \text{ m/s} + (1.6 \text{ m/s}^2)(6.8 \text{ s}) \\ &= 33 \text{ m/s} \end{aligned}$$

79. بالاستعانة بالشكل 19-3 أوجد تسارع الجسم المتحرك في الأزمنة التالية:



الشكل 19-3 ■

a. خلال الثواني الخمس الأولى من الرحلة (5.0 s).

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \frac{\Delta v}{\Delta t} \\ &= \frac{30.0 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}}{5.0 \text{ s}} \\ &= 6.0 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

b. بين 5.0 s و 10.0 s .

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \frac{\Delta v}{\Delta t} \\ &= \frac{30.0 \text{ m/s} - 30.0 \text{ m/s}}{5.0 \text{ s}} \\ &= 0.0 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

c. بين 10.0 s و 15.0 s .

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \frac{\Delta v}{\Delta t} \\ &= \frac{20.0 \text{ m/s} - 30.0 \text{ m/s}}{5.0 \text{ s}} \\ &= -2.0 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

d. بين 20.0 s و 25.0 s .

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \frac{\Delta v}{\Delta t} \\ &= \frac{0.0 \text{ m/s} - 20.0 \text{ m/s}}{5.0 \text{ s}} \\ &= -4.0 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

b. أي الصخرتين لها تسارع أكبر؟

لهما التسارع نفسه (التسارع الناتج عن الجاذبية الأرضية).

c. أيهما تصل أولاً؟

الصخرة A.

إتقان حل المسائل

(صفحتا 90-89)

1-3 التسارع

76. تحركت سيارة مدة 2.0 h بسرعة 40.0 km/h ، ثم تحركت مدة 2.0 h أخرى بسرعة 60.0 km/h في الاتجاه نفسه.

a. ما السرعة المتوسطة للسيارة؟

المسافة الكلية:

$$80.0 \text{ km} + 120.0 \text{ km} = 200.0 \text{ km}$$

الزمن الكلي يساوي 4.0 hours ، وعليه فإن:

$$\bar{v} = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{200.0 \text{ km}}{4.0 \text{ h}} = 5.0 \times 10^1 \text{ km/h}$$

b. ما السرعة المتوسطة للسيارة إذا قطعت مسافة $1.0 \times 10^2 \text{ km}$ بسرعة 40.0 km/h ومسافة $1.0 \times 10^2 \text{ km}$ أخرى بسرعة 60.0 km/h ؟

المسافة الكلية تساوي 200 km

$$\text{الزمن الكلي} = \frac{1.0 \times 10^2 \text{ km}}{40.0 \text{ km/h}} + \frac{1.0 \times 10^2 \text{ km}}{60.0 \text{ km/h}}$$

$$= 4.2 \text{ h}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{2.0 \times 10^2 \text{ km}}{4.2 \text{ h}}$$

$$= 48 \text{ km/h}$$

77. أوجد التسارع المنتظم الذي يسبب تغيراً في سرعة سيارة من 32 m/s إلى 96 m/s خلال فترة زمنية مقدارها 8.0 .

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \frac{\Delta v}{\Delta t} \\ &= \frac{v_2 - v_1}{\Delta t} \\ &= \frac{96 \text{ m/s} - 32 \text{ m/s}}{8.0 \text{ s}} = 8.0 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

تابع الفصل 3

80. احسب السرعة المتجهة النهائية لبروتون سرعته المتجهة الابتدائية $2.35 \times 10^5 \text{ m/s}$ تم التأثير فيه بمجال كهربائي، بحيث يتسارع بانتظام بمقدار $(-1.10 \times 10^{12} \text{ m/s}^2)$ مدة $1.50 \times 10^{-7} \text{ s}$.


$$v_f = v_i + at_f$$

$$= 2.35 \times 10^5 \text{ m/s} + (-1.10 \times 10^{12} \text{ m/s}^2)(1.50 \times 10^{-7} \text{ s})$$

$$= 7.0 \times 10^4 \text{ m/s}$$

الجدول 3-4	
السرعة المتجهة - الزمن	
السرعة المتجهة (m/s)	الزمن (s)
4.00	0.00
8.00	1.00
12.0	2.00
14.0	3.00
16.0	4.00
16.0	5.00
14.0	6.00
12.0	7.00
8.00	8.00
4.00	9.00
0.00	10.0
-4.00	11.0
-8.00	12.0

81. ارسم منحنى (السرعة المتجهة-الزمن) باستخدام البيانات في الجدول 3-4، وأجب عن الأسئلة التالية:



a. خلال أي الفترات الزمنية:

- تزداد سرعة الجسم.
 - تقل سرعة الجسم.
- يزيد الجسم سرعته خلال الفترة من 0.0 s حتى 4.0 s، وبين 10.0 s حتى 12.0 s. ويقلل سرعته من 5.0 s إلى 10.0 s.

b. متى يعكس الجسم اتجاه حركته؟ عند 10.0 s

c. كيف يختلف التسارع المتوسط للجسم في الفترة الزمنية بين 0.0 s و 2.0 s عن التسارع المتوسط في الفترة الزمنية بين 7.0 s و 12.0 s؟

التسارع بين 0.0 s و 2.0 s يساوي:

$$\bar{a} = \frac{12.0 \text{ m/s} - 4.0 \text{ m/s}}{2.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 4.0 \text{ m/s}^2$$

والتسارع بين 7.0 s و 12.0 s يساوي:

$$\bar{a} = \frac{-8.0 \text{ m/s} - 12.0 \text{ m/s}}{12.0 \text{ s} - 7.0 \text{ s}}$$

$$= -4.0 \text{ m/s}^2$$

تابع الفصل 3

2-3 الحركة بتسارع ثابت

صفحة 90

84. استعن بالشكل 19-3 لإيجاد الإزاحة المقطوعة خلال الفترات الزمنية الآتية:

a. $t=0.0\text{ s}$ إلى $t=5.0\text{ s}$

$$\text{Area I} = \frac{1}{2}bh$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)(5.0\text{ s})(30.0\text{ m/s})$$

$$= 75\text{ m}$$

b. $t=5.0\text{ s}$ إلى $t=10.0\text{ s}$

$$\text{Area II} = bh$$

$$= (10.0\text{ s} - 5.0\text{ s})(30.0\text{ m/s})$$

$$= 150\text{ m}$$

c. $t=10.0\text{ s}$ إلى $t=15.0\text{ s}$

$$\text{Area III} + \text{Area IV} = bh + \frac{1}{2}bh$$

$$= (15.0\text{ s} - 10.0\text{ s})(20.0\text{ m/s}) + \left(\frac{1}{2}\right)(15.0\text{ s} - 10.0\text{ s})(10.0\text{ m/s})$$

$$= 125\text{ m}$$

d. $t=0.0\text{ s}$ إلى $t=25.0\text{ s}$

$$\text{Area I} + \text{Area II} + (\text{Area III} + \text{Area IV}) + \text{Area V} + \text{IV}$$

$$= 75\text{ m} + 150\text{ m} + 125\text{ m} + bh + \frac{1}{2}bh$$

$$= 75\text{ m} + 150\text{ m} + 125\text{ m}$$

$$+ (20.0\text{ s} - 15.0\text{ s})(20.0\text{ m/s})$$

$$+ \left(\frac{1}{2}\right)(25.0\text{ s} - 20.0\text{ s})(20.0\text{ m/s})$$

$$= 5.0 \times 10^2\text{ m}$$

82. يمكن زيادة سرعة السيارة A من 0 m/s إلى 17.9 m/s

خلال 4.0 s ، والسيارة B من 0 m/s إلى 22.4 m/s

خلال 3.5 s ، والسيارة C من 0 m/s إلى 26.8 m/s

خلال 6.0 s . رتب السيارات الثلاث من الأكبر إلى

الأقل تسارعاً، مع الإشارة إلى العلاقة التي قد تربط بين تسارع كل منها.

السيارة A

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{17.9\text{ m/s} - 0\text{ m/s}}{4.0\text{ s} - 0.0\text{ s}}$$

$$= 4.5\text{ m/s}^2$$

السيارة B

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{22.4\text{ m/s} - 0\text{ m/s}}{3.5\text{ s} - 0.0\text{ s}}$$

$$= 6.4\text{ m/s}^2$$

السيارة C

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{26.8\text{ m/s} - 0\text{ m/s}}{6.0\text{ s} - 0.0\text{ s}}$$

$$= 4.5\text{ m/s}^2$$

للسيارة B أكبر تسارع 6.4 m/s^2 وباستخدام الأرقام المعنوية، ترتبط السيارة A، والسيارة C بتسارع 4.5 m/s^2 .

83. تطير طائرة نفاثة بسرعة 145 m/s وفق تسارع ثابت

مقداره 23.1 m/s^2 لمدة 20.0 s .

a. ما سرعتها النهائية؟

$$v_f = v_i + at_f$$

$$= 145\text{ m/s} + (23.1\text{ m/s}^2)(20.0\text{ s})$$

$$= 607\text{ m/s}$$

b. إذا كانت سرعة الصوت في الهواء 331 m/s ، فما

سرعة الطائرة بدلالة سرعة الصوت؟

$$N = \frac{607\text{ m/s}}{331\text{ m/s}}$$

$$= 1.83$$

مضروباً في سرعة الصوت

تابع الفصل 3

$$d_f = \frac{(0.0 \text{ m/s})^2 - (110 \text{ m/s})^2}{(2)(-11 \text{ m/s}^2)}$$

$$= 550 \text{ m}$$

وهي تساوي أربعة أضعاف المسافة في الفرع a.

88. ما المسافة التي تطيرها طائرة خلال 15s، بينما تتغير سرعتها المتجهة بمعدل منتظم من 145 m/s إلى 75 m/s؟

$$d = \bar{v} t = \frac{(v_f + v_i)t}{2}$$

$$= \frac{(75 \text{ m/s} + 145 \text{ m/s})(15 \text{ m/s})}{2}$$

$$= 1.6 \times 10^3 \text{ m}$$

89. تتحرك سيارة شرطة من السكون بتسارع ثابت مقداره 7.0 m/s²، لتلحق بسيارة تتجاوز حد السرعة المسموح به وتسير بسرعة منتظمة مقدارها 30.0 m/s. كم تكون سرعة سيارة الشرطة عندما تلحق بالسيارة المخالفة؟

$$d_{\text{المخالفة}} = v_{\text{المخالفة}} t$$

$$d_{\text{الشرطة}} = v_{\text{الشرطة}} t + \frac{1}{2} a_{\text{الشرطة}} t^2$$

$$v_{\text{المخالفة}} t = v_{\text{الشرطة}} t + \frac{1}{2} a_{\text{الشرطة}} t^2$$

وبما أن:

$$v_{\text{الشرطة}} = 0$$

فإن:

$$v_{\text{المخالفة}} t = \frac{1}{2} a_{\text{الشرطة}} t^2$$

$$0 = \frac{1}{2} a_{\text{الشرطة}} t^2 - v_{\text{المخالفة}} t$$

$$0 = t \left(\frac{1}{2} a_{\text{الشرطة}} t - v_{\text{المخالفة}} \right)$$

وعليه،

$$t = 0 \text{ و } \frac{1}{2} a_{\text{الشرطة}} t - v_{\text{المخالفة}} = 0$$

$$t = \frac{2v_{\text{المخالفة}}}{a_{\text{الشرطة}}}$$

$$= \frac{(2)(30.0 \text{ m/s})}{7.0 \text{ m/s}^2}$$

$$= 8.6 \text{ s}$$

بعد زمن مقداره $t = 8.6 \text{ s}$ تكون السرعة المتجهة لسيارة الشرطة:

$$v_f = v_i + at$$

$$= 0.0 \text{ m/s} + (7.0 \text{ m/s}^2)(8.6 \text{ s})$$

$$= 6.0 \times 10^1 \text{ m/s}$$

85. بدأ متزلج حركته من السكون بتسارع مقداره 49 m/s²، ما سرعته عندما يقطع مسافة 325 m؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(d_f - d_i)$$

$$v_f = \sqrt{v_i^2 + 2a(d_f - d_i)}$$

$$= \sqrt{(0.0 \text{ m/s})^2 + (2)(49 \text{ m/s}^2)(325 \text{ m} - 0.0 \text{ m})}$$

$$= 180 \text{ m/s}$$

86. تتحرك سيارة بسرعة 12 m/s صاعدة تلاً بتسارع ثابت (-1.6 m/s²). ما إزاحتها بعد 6 s وبعد 9 s؟

الإزاحة بعد 6.0 s

$$d_f = v_i t_f + \frac{1}{2} a t_f^2$$

$$= (12 \text{ m/s})(6.0 \text{ s}) + \frac{1}{2} (-1.6 \text{ m/s}^2)(6.0 \text{ s})^2$$

$$= 43 \text{ m}$$

الإزاحة بعد 9.0 s

$$d_f = v_i t_f + \frac{1}{2} a t_f^2$$

$$= (12 \text{ m/s})(9.0 \text{ s}) + \frac{1}{2} (-1.6 \text{ m/s}^2)(9.0 \text{ s})^2$$

$$= 43 \text{ m}$$

تكون السيارة في طريق العودة نحو أسفل التل. وسيبين عداد المسافة أن السيارة قد قطعت 45 m عند صعودها التل + 2m عند عودتها نحو أسفل التل = 47 m.

87. تتباطأ سيارة سباق بمقدار ثابت (11 m/s²). أجب عما يأتي:

a. إذا كانت السيارة منطلقة بسرعة 55 m/s فما المسافة التي تقطعها بالأمتار قبل أن تقف؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad_f$$

$$d_f = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a}$$

$$= \frac{(0.0 \text{ m/s})^2 - (+55 \text{ m/s})^2}{(2)(-11 \text{ m/s}^2)}$$

$$= 1.4 \times 10^2 \text{ m}$$

b. ما المسافة التي تقطعها السيارة قبل أن تقف إذا كانت سرعتها مثلي السرعة السابقة؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad_f$$

$$d_f = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a}$$

تابع الفصل 3

3-3 السقوط الحر

صفحة 90

91. أسقط رائد فضاء ريشة من نقطة على ارتفاع 1.2 m فوق سطح القمر. إذا كان تسارع الجاذبية على سطح القمر 1.62 m/s^2 ، فما الزمن الذي تستغرقه الريشة حتى تصطدم بسطح القمر؟

$$d_f = v_i t_f + at_f^2 = (0 \text{ m/s}) t_f + at_f^2$$

$$t_f = \sqrt{\frac{2d_f}{a}} = \sqrt{\frac{(2)(1.2 \text{ m})}{(1.62 \text{ m/s}^2)}} = 1.2 \text{ s}$$

92. يسقط حجر سقوطاً حرّاً. ما سرعته بعد 8.0 s؟ وما إزاحته؟

$$v_f = v_i + at_f$$

ولما كانت $a = -g$ ، فإن:

$$\begin{aligned} v_f &= v_i - gt_f \\ &= 0.0 \text{ m/s} - (9.80 \text{ m/s}^2)(8.0 \text{ s}) \\ &= -78 \text{ m/s} \end{aligned}$$

وتساوي 78 m/s إلى أسفل

اختر النظام الإحداثي على أن تكون نقطة الأصل في المكان الذي كان فيه الحجر ساكناً، والاتجاه نحو أعلى هو الاتجاه الموجب.

$$d_f = v_i t + \frac{1}{2} at_f^2$$

ولما كانت $a = -g$ ، فإن:

$$\begin{aligned} d_f &= v_i t - \frac{1}{2} gt_f^2 \\ &= 0.0 \text{ m} - \left(\frac{1}{2}\right)(9.80 \text{ m/s}^2)(8.0 \text{ s})^2 \\ &= -3.1 \times 10^2 \text{ m} \end{aligned}$$

93. قذفت كرة بسرعة 2.0 m/s رأسياً إلى أسفل من نافذة منزل. ما سرعتها حين تصل إلى رصيف المشاة الذي يبعد 2.5 m أسفل نقطة القذف؟

اختر النظام الإحداثي على أن يكون الاتجاه نحو الأسفل هو الاتجاه الموجب ونقطة الأصل في المكان الذي انفصلت فيه الكرة عن يدك.

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad_f$$

ولما كانت $a = g$ ، فإن:

$$\begin{aligned} v_f &= \sqrt{v_i^2 + 2gd_f} \\ d_f &= \sqrt{(2.0 \text{ m/s})^2 + (2)(9.80 \text{ m/s}^2)(2.5 \text{ m})} \\ &= 7.3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

الفيزياء

90. شاهد سائق سيارة تسير بسرعة 90.0 km/h فجأة أضواءً حاجزاً على بُعد 40.0 m أمامه. فإذا استغرق السائق 0.75 s حتى يضغط على الفرامل، وكان التسارع المتوسط للسيارة في أثناء ضغطه على الفرامل (-10.0 m/s^2) :

a. فحدد ما إذا كانت السيارة ستصطدم بالحاجز أم لا؟ قبل أن يضغط السائق على الفرامل؛ ستقطع السيارة مسافة تساوي:

$$\begin{aligned} d &= vt \\ &= (25.0 \text{ m/s})(0.75 \text{ s}) \\ &= 18.8 \text{ m} \end{aligned}$$

حوّل km/h إلى m/s

$$\begin{aligned} v_i &= \frac{(90.0 \text{ km/h})\left(\frac{1000 \text{ m}}{\text{km}}\right)}{3600 \text{ s/h}} \\ &= 25.0 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(d_f - d_i)$$

$$\begin{aligned} d_f &= \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a} + d_i \\ &= \frac{(0.0 \text{ m/s})^2 - (25.0 \text{ m/s})^2}{(2)(-10.0 \text{ m/s}^2)} + 18.8 \text{ m} \\ &= 5.0 \times 10^1 \text{ m} \end{aligned}$$

نعم، ستصطدم بالحاجز $5.0 \times 10^1 \text{ m}$

b. ما أقصى سرعة يمكن أن تسير بها السيارة دون أن تصطدم بالحاجز؟ (بافتراض أن التسارع لم يتغير).

$$\begin{aligned} d_{\text{كلية}} &= d_{\text{الثابت}} + d_{\text{التباطؤ}} \\ &= 40.0 \text{ m} \end{aligned}$$

$$d_c = vt = (0.75 \text{ s})v$$

$$\begin{aligned} d_d &= \frac{0^2 - v^2}{2a} = \frac{-v^2}{2(-10.0 \text{ m/s}^2)} \\ &= \frac{v^2}{20.0 \text{ m/s}^2} \end{aligned}$$

$$40 \text{ m} = (0.75 \text{ s})v + \frac{v^2}{20.0 \text{ m/s}^2}$$

$$v^2 + (15 \text{ m/s})v - 800 \text{ m}^2/\text{s}^2 = 0$$

باستخدام المعادلة التربيعية:

$$v = 22 \text{ m/s}$$

لأن السياق المنطقي للمسألة لا يأخذ بالقيمة السالبة.

تابع الفصل 3

b. ما السرعة المتجهة الابتدائية للكرة؟

$$v_i = 11 \text{ m/s}$$

مراجعة عامة

صفحة 91

96. تتحرك سفينة فضائية بتسارع ثابت وتتغير سرعتها

من 65.0 m/s إلى 162.0 m/s خلال 10.0 s.

ما المسافة التي ستقطعها؟

اختر نظاماً إحداثياً على أن تكون نقطة الأصل في المكان

الذي تكون فيه سرعة السفينة تساوي 65.0 m/s.

وباستخدام المعطيات التالية:

$$v_i = 65.0 \text{ m/s}, v_f = 162.0 \text{ m/s}, t_f = 10.0 \text{ s}$$

وبما أننا نريد حساب d_f فإننا نستخدم المعادلة:

$$d_f = d_i + \frac{1}{2}(v_i + v_f) t_f$$


$$d_f = 0 + \frac{1}{2}(65.0 \text{ m/s} + 162.0 \text{ m/s})(10.0 \text{ s})$$

$$= 1.14 \times 10^3 \text{ m}$$

97. يبين الشكل 20-3 صورة ستروبية لكرة تتحرك أفقياً.

ما المعلومات التي تحتاج إليها حول الصورة؟ وما

القياسات التي ستجريها حتى تقدر التسارع؟



الشكل 20-3 ■

تحتاج أن تعرف الزمن بين الومضات والمسافة بين أول

صورتين، والمسافة بين آخر صورتين. وتحصل من هذه

على سرعتين متجهتين. توجد بين هاتين سرعتين فترة

زمنية t ثانية. اقسم الفرق بين سرعتين على الزمن t .

98. يطير بالون أرصاد جوية على ارتفاع ثابت فوق سطح

الأرض. سقطت منه بعض الأدوات واصطدمت

بالأرض بسرعة متجهة (-73.5 m/s). ما الارتفاع

الذي سقطت منه هذه الأدوات؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad_f$$

$$d_f = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a}$$

$$= \frac{(-73.5 \text{ m/s})^2 - (0.00 \text{ m/s})^2}{2(-9.80 \text{ m/s}^2)}$$

$$d_f = -276 \text{ m}$$

94. في السؤال السابق، إذا قذفت الكرة رأسياً إلى أعلى

بدلاً من الأسفل فما السرعة التي تصل بها الكرة إلى

الرصيف؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad_f$$

ولما كانت $a = g$ ، فإن:

$$v_f = \sqrt{v_i^2 + 2gd_f}$$

$$= \sqrt{(2.0 \text{ m/s})^2 + (2)(9.80 \text{ m/s}^2)(2.5 \text{ m})}$$

$$= 7.3 \text{ m/s}$$

d_f هي الإزاحة وليست المسافة الكلية المقطوعة.

95. إذا قذفت كرة مضرب في الهواء والتقطتها بعد 2.2 s،

فأجب عما يأتي:

a. ما الارتفاع الذي وصلت إليه الكرة؟

اختر النظام الإحداثي على أن يكون الاتجاه نحو

أعلى هو الاتجاه الموجب، وأن نقطة الأصل في النقطة

التي غادرت فيها كرة المضرب يدك. افترض أنك

التقطت كرة المضرب في المكان نفسه الذي قذفتها

منه. وعليه يكون الزمن اللازم لوصول الكرة إلى

أقصى ارتفاع يساوي نصف زمن التحليق في الهواء.

اختر الزمن t_i في اللحظة التي تركت فيها الكرة و t_f

في اللحظة التي تصل فيها الكرة إلى أقصى ارتفاع.

كل المعادلات التي تعرفها تتضمن v_i ، لذا سيتعين

عليك حساب v_i أولاً.

$$v_f = v_i + at_f$$

ولما كانت $a = -g$ ، فإن:

$$v_i = v_f + gt_f$$

$$= 0.0 \text{ m/s} + (9.80 \text{ m/s}^2)(1.1 \text{ s})$$

$$= 11 \text{ m/s}$$

والآن يمكنك استخدام المعادلة التي تتضمن الإزاحة.

$$d_f = d_i + v_i t_f + \frac{1}{2} at_f^2$$

ولما كانت $a = -g$ ، فإن:

$$d_f = d_i + v_i t_f - \frac{1}{2} gt_f^2$$


$$= 0.0 \text{ m} + (11 \text{ m/s})(1.1 \text{ s})$$

$$- \left(\frac{1}{2}\right) (9.80 \text{ m/s}^2) (1.1 \text{ s})^2$$

$$d_f = 6.2 \text{ m}$$

تابع الفصل 3

a. مثل بيانياً العلاقة بين السرعة المتجهة - الزمن.



b. ما إزاحة السيارة خلال ثاني ثوان؟

أوجد المساحة تحت منحنى (السرعة المتجهة - الزمن)

$$d = \frac{1}{2}bh + bh$$

$$d = \frac{1}{2}(5.0 \text{ s})(20.0 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}) + (8.0 \text{ s} - 5.0 \text{ s})(20.0 \text{ m/s})$$

$$= 110 \text{ m}$$

c. أوجد ميل الخط البياني بين الثانية $t = 0.0 \text{ s}$ و $t = 4.0 \text{ s}$. ماذا يمثل هذا الميل؟

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{16.0 \text{ m/s} - 0.00 \text{ m/s}}{4.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 4.0 \text{ m/s}^2, \text{ التسارع}$$

d. أوجد ميل الخط البياني بين $t = 5.0 \text{ s}$ و $t = 7.0 \text{ s}$. ما الذي يدل عليه هذا الميل؟

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20.0 \text{ m/s} - 20.0 \text{ m/s}}{7.0 \text{ s} - 5.0 \text{ s}} = 0.0 \text{ m/s}^2$$

التسارع صفر يدل على أن السرعة منتظمة.

101. توقفت شاحنة عند إشارة ضوئية، وعندما تحولت الإشارة إلى اللون الأخضر تسارعت الشاحنة بمقدار 2.5 m/s^2 ، وفي اللحظة نفسها تجاوزتها سيارة تتحرك بسرعة منتظمة 15 m/s . أين ومتى ستلحق الشاحنة بالسيارة؟

السيارة:


$$d_f = d_i + vt_f$$

$$d_{\text{السيارة}} = d_i + v_{\text{السيارة}} t_f = v_{\text{السيارة}} t_f = 0 + (15 \text{ m/s}) t_f$$

99. يبين الجدول 3-5 المسافة الكلية التي تتدحرجها كرة إلى أسفل مستوى مائل في أزمنة مختلفة.

الجدول 3-5	
المسافة - الزمن	
المسافة (m)	الزمن (s)
0.0	0.0
2.0	1.0
8.0	2.0
18.0	3.0
32.0	4.0
50.0	5.0

a. مثل بيانياً العلاقة بين الموقع والزمن.



b. احسب المسافة التي تدحرجتها الكرة بعد مرور 2.2 s.

بعد 2.2 s تتدحرج الكرة 10 m تقريباً.

100. تتغير سرعة سيارة خلال فترة زمنية مقدارها 8.0 s كما يبين الجدول 3-6.

الجدول 3-6	
السرعة المتجهة - الزمن	
السرعة المتجهة (m/s)	الزمن (s)
0.0	0.0
4.0	1.0
8.0	2.0
12.0	3.0
16.0	4.0
20.0	5.0
20.0	6.0
20.0	7.0
20.0	8.0

b. المسافة التي قطعها الكيس .

$$d_f = v_i t_f + \frac{1}{2} a t_f^2$$

ولما كانت $a = -g$ ، فإن :

$$\begin{aligned} d_f &= v_i t_f - \frac{1}{2} g t_f^2 \\ &= (5.0 \text{ m/s})(2.0 \text{ s}) - \left(\frac{1}{2}\right)(9.80 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s})^2 \\ &= -1.0 \times 10^1 \text{ m} \end{aligned}$$

سقط الكيس مسافة تساوي $1.0 \times 10^1 \text{ m}$

c. بُعد الكيس عن الطائرة لحظة وصوله سطح الأرض .

لقد ارتفعت المروحية إزاحة مقدارها :

$$\begin{aligned} d_f &= v_i t_f = (5.0 \text{ m/s})(2.0 \text{ s}) \\ &= 1.0 \times 10^1 \text{ m} \end{aligned}$$

الكيس على بُعد $1.0 \times 10^1 \text{ m}$ أسفل نقطة الأصل وعلى بُعد $2.0 \times 10^1 \text{ m}$ أسفل المروحية .

التفكير الناقد

صفحة 92

103. صمم تجربة لقياس المسافة التي يتحركها جسم متسارع خلال فترات زمنية متساوية باستخدام الأدوات التالية: كاشف للحركة (CBL) (أو بوابة ضوئية)، وعربة مختبر، وخيط، وبكرة، وماسك على شكل حرف C. ثم ارسم منحنى (السرعة المتجهة - الزمن) ومنحنى (الموقع - الزمن) باستخدام أقال مختلفة. وضح كيف يؤثر تغيير الثقل في رسمك البياني.

سكون تجارب الطلاب مختلفة، وعليهم أن يجدوا أن تغير الكتلة فوق حافة الطاولة لن يغير المسافة التي تتحركها العربة؛ لأن التسارع دائماً متساوٍ ويساوي g .

$$d_f = d_i + v_i t_f + \frac{1}{2} a t_f^2$$

$$d_{\text{الشاحنة}} = \frac{1}{2} a_{\text{الشاحنة}} t_f^2$$

$$\begin{aligned} d_{\text{الشاحنة}} &= \frac{1}{2} a_{\text{الشاحنة}} t_f^2 \\ &= 0 + 0 + \left(\frac{1}{2}\right)(2.5 \text{ m/s}^2) t_f^2 \end{aligned}$$

عندما تلحق الشاحنة بالسيارة ستتساوى إزاحتهما

$$v_{\text{السيارة}} t_f = \frac{1}{2} a_{\text{الشاحنة}} t_f^2$$

$$0 = \frac{1}{2} a_{\text{الشاحنة}} t_f^2 - v_{\text{السيارة}} t_f$$

$$0 = t_f \left(\frac{1}{2} a_{\text{الشاحنة}} t_f - v_{\text{السيارة}} \right)$$

ولذلك

$$t_f = 0 \text{ و } \frac{1}{2} a_{\text{الشاحنة}} t_f - v_{\text{السيارة}} = 0$$

$$\begin{aligned} t_f &= \frac{2v_{\text{السيارة}}}{a_{\text{الشاحنة}}} \\ &= \frac{(2)(15 \text{ m/s})}{2.5 \text{ m/s}} \\ &= 12 \text{ s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d_f &= (15 \text{ m/s}) t_f \\ &= (15 \text{ m/s})(12 \text{ s}) \\ &= 180 \text{ m} \end{aligned}$$

تلحق الشاحنة بالسيارة بعد 12 s وعلى بُعد 180 m من الإشارة.

102. ترتفع طائرة مروحية رأسياً بسرعة 5.0 m/s عندما سقط كيس من حمولتها. إذا وصل الكيس سطح الأرض خلال 2 s فاحسب:

a. سرعة الكيس المتجهة لحظة وصوله الأرض .

$$v_f = v_i + a t_f$$

ولما كانت $a = -g$ ، فإن :

$$\begin{aligned} v_f &= v_i - g t_f \\ &= 5.0 \text{ m/s} - (9.80 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s}) \\ &= -15 \text{ m/s} \end{aligned}$$

تابع الفصل 3

104. حلل واستنتج أيهما له تسارع أكبر: سيارة تزيد سرعتها من 50 km/h إلى 60 km/h ، أم دراجة هوائية تنطلق من 0 km/h إلى 10 km/h خلال الفترة الزمنية نفسها؟ وضح إجابتك.

$$a = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}$$

للسيارة :

$$a = \frac{60 \text{ km/h} - 50 \text{ km/h}}{\Delta t} = \frac{10 \text{ km/h}}{\Delta t}$$

للدراجة الهوائية :

$$a = \frac{10 \text{ km/h} - 0 \text{ km/h}}{\Delta t} = \frac{10 \text{ km/h}}{\Delta t}$$

سيكون التغيير في السرعة متساوياً، وبالتالي يكون التسارع متساوياً.

105. حلل واستنتج يتحرك قطار سريع بسرعة 36.0 m/s ، ثم طرأ ظرف اقتضى تحويل مساره إلى سكة قطار محلي. اكتشف سائق القطار السريع أن أمامه (على السكة نفسها) قطاراً محلياً يسير ببطء في الاتجاه نفسه وتفصله عن القطار السريع مسافة قصيرة (1.00 × 10² m). لم ينتبه سائق القطار المحلي للكارثة الوشيكة وتابع سيره بالسرعة نفسها، فضغط سائق القطار السريع على الفرامل، وأبطأ سرعة القطار بمعدل ثابت مقداره 3.00 m/s². إذا كانت سرعة القطار المحلي 11.0 m/s فهل يتوقف القطار السريع في الوقت المناسب أم سيصدامان؟

لحل هذه المسألة اعتبر موقع القطار السريع لحظة اكتشاف سائقه القطار المحلي نقطة أصل. وتذكر دائماً أن القطار المحلي كان يسبق القطار السريع بمسافة 1.00 × 10² m بالضبط، واحسب بُعد كل من القطارين عن نقطة الأصل في نهاية الـ 12.0 s التي يستغرقها القطار السريع حتى يتوقف (التسارع = -3.00 m/s²، والسرعة تتغير من 36 m/s إلى 0 m/s).

a. استناداً إلى حساباتك، هل سيحدث تصادم؟

القطار السريع :

$$\begin{aligned} d_f &= v_i t_f + \frac{1}{2} a t_f^2 \\ &= (36.0 \text{ m/s})(12.0 \text{ s}) + \left(\frac{1}{2}\right)(-3.00 \text{ m/s}^2)(12.0 \text{ s})^2 \\ &= 432 \text{ m} - 216 \text{ m} \\ &= 216 \text{ m} \end{aligned}$$

القطار المحلي :


$$\begin{aligned} d_f &= d_i + v_i t_f + a t_f^2 \\ &= 100 \text{ m} + (11.0 \text{ m/s})(12.0 \text{ s}) + 0 \\ &= 232 \text{ m} \end{aligned}$$

وعلى هذا الأساس لن يحدث تصادم.

تابع الفصل 3

b. احسب موقع كل قطار عند نهاية كل ثانية بعد المشاهدة. اعمل جدولاً تبين فيه بُعد كل من القطارين عن نقطة الأصل في نهاية كل ثانية، ثم اعمل رسماً بيانياً لمنحنى (الموقع - الزمن) لكل من القطارين (رسمين بيانيين على النظام الإحداثي نفسه). استخدم رسمك البياني للتأكد من صحة جوابك في a.

d (المحلي) (m)	d (السرّيع) (m)	t (s)
35	111	1
66	122	2
95	133	3
120	144	4
145	155	5
162	166	6
179	177	7
192	188	8
203	199	9
210	210	10
215	221	11
216	232	12



سيتصادمان بين 6 s و 7 s.

الكتابة في الفيزياء

صفحة 92

106. ابحث في مساهمات هبة الله بن ملكا البغدادي في الفيزياء.

ستختلف إجابات الطلاب. يجب أن تتضمن الإجابات ما توصل إليه هبة الله بن ملكا البغدادي من علاقة بين القوة والسرعة فقد توصل إلى أنه كلما زادت قوة الدفع زادت سرعة الجسم المتحرك، وقصر الزمن لقطع المسافة المحددة. وقد قام بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه أرسطو عندما قال بسقوط الأجسام الثقيلة أسرع من الأجسام الخفيفة. وقد سبق جاليليو في إثبات الحقيقة العلمية التي تقضي بأن سرعة الجسم الساقط سقوطاً حراً تحت تأثير الجاذبية الأرضية لا تعتمد على كتلته عندما تخلو الحركة من أية عوائق خارجية.

107. ابحث في الحد الأقصى للتسارع الذي يتحملة الإنسان دون أن يفقد وعيه. ناقش كيف يؤثر هذا في تصميم ثلاثٍ من وسائل التسلية أو النقل.

ستختلف الإجابات؛ نظراً إلى أن الناس يمكن أن يلاقوا تأثيرات سلبية، كفقدان الوعي، لذا يحتاج مصممو سكة الحديد الأفعوانية في مدينة الألعاب إلى بناء المنحدرات بطريقة لا تصل فيها العربات إلى تسارعات تسبب فقدان الوعي للراكب. وتُصمم القطارات المقذوفة والمساعد والطائرات بالطريقة نفسها؛ بحيث يتسارع الجسم بشكل كبير جداً ليصل إلى سرعة عالية، دون التسبب في إغماء الركاب.

تابع الفصل 3

مراجعة تراكمية

صفحة 92

108. تصف المعادلة التالية حركة جسم:

$$d = (35.0 \text{ m/s}) t - 5.0 \text{ m}$$

ارسم منحنى (الموقع-الزمن) والمخطط التوضيحي للحركة، ثم اكتب مسألة فيزياء يمكن حلها باستخدام المعادلة. يشير كل من الرسم البياني والشكل التخطيطي إلى الحركة بسرعة متجهة منتظمة مقدارها 35 m/s وموقع ابتدائي عند -5.0 m . وستختلف إجابات الطلاب في كتابة المسائل.

مسألة تحفيز

صفحة 81

شاهدت بالوناً مملوئاً بالماء يسقط أمام نافذة صفك. فإذا استغرق البالون t ثانية، ليسقط مسافة تساوي ارتفاع النافذة ومقدارها y متر. افترض أن البالون بدأ حركته من السكون، فما الارتفاع الذي يسقط منه قبل أن يصل إلى الحافة العليا للنافذة بدلالة كل من g و y و t وثوابت عددية؟

الاتجاه الموجب إلى أسفل. يتم حل هذه المسألة على مرحلتين، الأولى: سقوط البالون المسافة D إلى مستوى أعلى النافذة ثم إلى أسفلها.

الخطوة الأولى: نقطة الأصل عند قمة السقوط.

$$v_{\text{fi}}^2 = v_{\text{ii}}^2 + 2a(d_{\text{fi}} - d_{\text{ii}})$$

$$= 0 + 2g(D - 0)$$

$$v_{\text{fi}} = \sqrt{2gD}$$

الخطوة الثانية: نقطة الأصل عند قمة النافذة:

$$d_{\text{f2}} = d_{\text{ii}} + v_{\text{ii}} t_{\text{f2}} + \frac{1}{2} a t_{\text{f2}}^2$$

$$y = 0 + v_{\text{fi}} t + \frac{1}{2} g t^2$$


$$= 0 + (\sqrt{2gD}) t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$\sqrt{2gD} = \frac{y}{t} - \frac{gt}{2}$$

$$D = \frac{1}{2g} \left(\frac{y}{t} - \frac{gt}{2} \right)^2$$

الفصل الثالث

1. يقود قاسم وأخوه محمد دراجتين هوائيتين، ويحاول قاسم اللحاق بأخيه الذي انطلق قبله بفترة زمنية مقدارها 10.0 s.



a. ما تسارع قاسم؟

$$a_{\text{قاسم}} = \frac{8.0 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}}{30.0 \text{ s} - 10.0 \text{ s}} = 0.40 \text{ m/s}^2$$


b. ما تسارع محمد؟

$$a_{\text{محمد}} = \frac{8.0 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}}{40.0 \text{ s} - 0.0 \text{ s}} = 0.20 \text{ m/s}^2$$

c. عند أي لحظة يكون لهما السرعة المتجهة نفسها؟

20.0 s

2. تحتوي بعض سيارات السباق على مظلة تساعدها على التوقف. إذا بدأ سائق إحدى تلك السيارات الحركة من السكون بتسارع مقداره 5.0 m/s^2 لمدة 4.0 s، ثم تحرك بسرعة ثابتة لمدة 2.5 s، وبعد ذلك فتح السائق المظلة فتباطأت السيارة بمعدل ثابت حتى توقفت خلال 2.0 s، فارسم منحنى (السرعة المتجهة - الزمن) الذي يمثل الحركة الكاملة للسيارة.



3. تتحرك سيارة على طريق رئيس بسرعة 21 m/s وأثناء القيادة غفل السائق فاصطدمت السيارة بحواجز السلامة الموضوعة على جانب الطريق، وتوقفت تمامًا بعد مرور 0.55 s .
- a. ما مقدار التسارع المتوسط للسيارة؟

$$\bar{a} = \frac{(v_f - v_i)}{(t_f - t_i)} = \frac{0.00 \text{ m/s} - 21 \text{ m/s}}{0.55 \text{ s}} = -38 \text{ m/s}^2$$

- b. إذا كانت حواجز الأمان على جانب الطريق تتكوّن من قضبان صلبة فستتوقف السيارة خلال 0.15 s . فكم سيكون التسارع في هذه الحالة؟

$$\bar{a} = \frac{(v_f - v_i)}{(t_f - t_i)} = \frac{0.00 \text{ m/s} - 21 \text{ m/s}}{0.15 \text{ s}} = -1.4 \times 10^2 \text{ m/s}^2$$

4. ركب جمال سيارته متجهًا إلى المدرسة، وبينما كانت السيارة تتحرك في اتجاه الشمال بسرعة 24.0 m/s ، تذكر أنه نسي الواجب المنزلي لمبحث الفيزياء في البيت، فاحتاج إلى زمن مقداره 35.5 s حتى يدور عائداً بسيارته لتتحرك في اتجاه الجنوب بسرعة 15.0 m/s . فإذا كان اتجاه الشمال يمثل الاتجاه الموجب، فما التسارع المتوسط للسيارة خلال تلك الفترة الزمنية (35.5 s)؟

$$\bar{a} = \frac{(v_f - v_i)}{(t_f - t_i)} = \frac{-15.0 \text{ m/s} - 24.0 \text{ m/s}}{35.5 \text{ s}} = -1.10 \text{ m/s}^2$$

5. يمكن للفهد بلوغ سرعته القصوى التي تساوي 27.8 m/s خلال 5.2 s . فما التسارع المتوسط للفهد؟

$$\bar{a} = \frac{(v_f - v_i)}{(t_f - t_i)} = \frac{27.8 \text{ m/s} - 0.0 \text{ m/s}}{5.2 \text{ s}} = 5.3 \text{ m/s}^2$$

الفصل 3 (تابع)

a. ما إزاحة العداء في الفترة الزمنية بين $t = 0.00$ s و $t = 20.0$ s ؟

$$\Delta d = \left(\frac{1}{2}\right)(8.0 \text{ m/s})(20.0 \text{ s})$$

$$= 8.0 \times 10^1 \text{ m}$$

b. ما إزاحة العداء في الفترة الزمنية بين $t = 20.0$ s و $t = 50.0$ s ؟

$$\Delta d = (8.0 \text{ m/s})(50.0 \text{ s} - 20.0 \text{ s})$$

$$= 240 \text{ m}$$

c. ما إزاحة العداء في الفترة الزمنية بين $t = 50.0$ s و $t = 60.0$ s ؟

$$\Delta d = \left(\frac{1}{2}\right)(8.0 \text{ m/s})(60.0 \text{ s} - 50.0 \text{ s})$$

$$= 4.0 \times 10^1 \text{ m}$$


10. ارسم منحنى (السرعة المتجهة - الزمن) لحركة

سيارة تتسارع بانتظام من السكون عند $t = 0.00$ s وتقطع مسافة 180.0 m خلال 12.0 s.

لما كان تسارع السيارة منتظماً، فإن منحنى (السرعة المتجهة - الزمن) يكون خطاً مستقيماً. وعند البدء من نقطة الأصل ستكون المساحة تحت المنحنى عبارة عن مثلث، لذا فإن:

$$\Delta d = \frac{1}{2} v_{\text{max}} \Delta t$$

$$v_{\text{max}} = \frac{2\Delta d}{\Delta t} = \frac{(2)(180.0 \text{ m})}{12.0 \text{ s}} = 30.0 \text{ m/s}$$



6. بعد عملية إطلاق صاروخ، كانت كمية الوقود في المحرك تكفيه لبلوغ سرعة 122 m/s قبل أن تنفذ منه كلياً. فإذا افترضت أن تسارع الصاروخ ثابت ويساوي 32.2 m/s^2 ، فكم يستغرق من الوقت لاستهلاك الوقود تماماً؟

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \Delta v / a = \frac{122 \text{ m/s} - 0.00 \text{ m/s}}{32.2 \text{ m/s}^2} = 3.79 \text{ s}$$

7. يتحرك الجسم الساقط سقوطاً حراً بتسارع مقداره 9.80 m/s^2 ، وذلك بإهمال مقاومة الهواء. فإذا أسقط جسم سقوطاً حراً من قمة مرتفع فما سرعته بعد مرور 3.50 s من لحظة إسقاطه؟

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\Delta v = \bar{a} \Delta t = g \Delta t = (9.80 \text{ m/s}^2)(3.50 \text{ s})$$

$$= 34.3 \text{ m/s}$$

8. يتحرك قطار بسرعة متجهة مقدارها 51 m/s إلى الشرق، وعند اقترابه من مدينة تسارع بمقدار -2.3 m/s^2 . فما السرعة المتجهة للقطار بعد 5.2 s من لحظة البدء بتسارعه؟


$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(v_f - v_i)}{\Delta t}$$

$$v_f = \bar{a} \Delta t + v_i$$

$$= (-2.3 \text{ m/s}^2)(5.2 \text{ s}) + 51 \text{ m/s}$$

$$= 39 \text{ m/s}$$

9. يوضح الشكل أدناه منحنى (السرعة المتجهة - الزمن) لحركة عداء.



الإزاحة تساوي المساحة تحت المنحنى.

13. سقط مظلي سقوطاً حرّاً، وفي اللحظة التي أصبحت فيها سرعته 65.2 m/s فتح مظلته، فأبطأت سرعته إلى 7.30 m/s ، وبتباطؤ ثابت مقداره 29.4 m/s^2 . فما المسافة التي قطعها المظلي خلال فترة تسارعه؟

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(d_f - d_i)$$

$$\begin{aligned} d_f - d_i &= \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a} \\ &= \frac{(-7.30 \text{ m/s})^2 - (-65.2 \text{ m/s})^2}{(2)(29.4 \text{ m/s}^2)} \\ &= -71.4 \text{ m} \end{aligned}$$

قطع المظلي 71.4 m خلال فترة تسارعه.

14. يدحرج طفل كرة إلى أعلى تل بتزويدها بسرعة 3.24 m/s . فإذا كان التسارع المؤثر في الكرة في اتجاه أسفل التل يساوي 2.32 m/s^2 ، فما المسافة التي تقطعها الكرة حتى تصبح سرعتها المتجهة 1.23 m/s في اتجاه أسفل التل؟ افترض أن الاتجاه الموجب إلى أعلى التل.

$$v_f = v_i + at_f$$


$$\begin{aligned} t_f &= \frac{(v_f - v_i)}{a} \\ &= \frac{-1.23 \text{ m/s} - 3.24 \text{ m/s}}{-2.32 \text{ m/s}^2} \\ &= 1.93 \text{ s} \end{aligned}$$

15. يستطيع حيوان الفهد أن يتسارع من السكون إلى سرعة 27.8 m/s خلال 5.20 s ، ويمكنه المحافظة على هذه السرعة مدة 9.70 s قبل أن يستنفد طاقته ويتوقف. فما المسافة التي يقطعها الفهد منذ بدء حركته حتى يتوقف؟ أي خلال 14.9 s ؟ خلال فترة التسارع:

$$v_f = v_i + at_f$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{v_f - v_i}{t_f} = \frac{27.8 \text{ m/s} - 0.00 \text{ m/s}}{5.20 \text{ s}} \\ &= 5.35 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

11. يمثل الشكل أدناه منحنى (السرعة المتجهة - الزمن) لحركة سيارة. ما إزاحة السيارة في الفترة الزمنية بين $t = 0.00 \text{ s}$ و $t = 15.0 \text{ s}$ ؟



الإزاحة تساوي المساحة تحت منحنى (السرعة المتجهة - الزمن).

الإزاحة الكلية تساوي مجموع الإزاحات خلال الفترات الزمنية بين $t = 0.00 \text{ s}$ و $t = 4.00 \text{ s}$ ، وبين $t = 4.00 \text{ s}$ و $t = 6.00 \text{ s}$ ، وبين $t = 6.00 \text{ s}$ و $t = 8.00 \text{ s}$ ، وبين $t = 8.00 \text{ s}$ و $t = 10.0 \text{ s}$ ، وبين $t = 10.0 \text{ s}$ و $t = 15.0 \text{ s}$ ؛

$$\begin{aligned} \Delta d_{\text{كليه}} &= \Delta d_1 + \Delta d_2 + \Delta d_3 + \Delta d_4 + \Delta d_5 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) (30.0 \text{ m/s})(4.00 \text{ s}) \\ &\quad + (30.0 \text{ m/s})(2.00 \text{ s}) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2}\right) (30.0 \text{ m/s})(2.00 \text{ s}) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2}\right) (-30.0 \text{ m/s})(2.00 \text{ s}) \\ &\quad + (-30.0 \text{ m/s})(5.00 \text{ s}) \\ &= -30.0 \text{ m} \end{aligned}$$

12. افترض أن سيارة تتحرك من السكون في موقف سيارات أرضيته مائلة. فإذا توقفت نتيجة اصطدامها بسور الموقف بعد أن قطعت مسافة 52.0 m خلال 11.25 s ، فما تسارع السيارة قبل أن تصطدم بالسور؟

$$d_f = d_i + v_i t_f + \frac{1}{2} at_f^2$$

لأن السيارة بدأت حركتها من السكون فإن $v_i = 0.00 \text{ m/s}$

$$a = \frac{2(d_f - d_i)}{t_f^2} = \frac{(2)(52.0 \text{ m})}{(11.25 \text{ s})^2} = 0.823 \text{ m/s}^2$$

وخلال الفترة الثانية من التسارع:

$$\begin{aligned} v_f^2 &= v_i^2 + 2a(d_f - d_i) \\ d_f - d_i &= \frac{(v_f^2 - v_i^2)}{2a} \\ &= \frac{(0.00 \text{ m/s})^2 - (23.8 \text{ m/s})^2}{(2)(-9.60 \text{ m/s}^2)} \\ &= 29.5 \text{ m} \end{aligned}$$

عندئذ المسافة الكلية المقطوعة تساوي مجموع المسافتين.

$$\begin{aligned} \Delta d_{\text{كلية}} &= 41.6 \text{ m} + 29.5 \text{ m} \\ &= 71.1 \text{ m} \end{aligned}$$

17. قاد متسابق دراجته الهوائية بسرعة ثابتة مقدارها 12.0 m/s لمدة 1.20 min، ثم بدأت سرعة الدراجة تتناقص بمقدار ثابت حتى توقفت تمامًا بعد 21.2 s. فإذا كانت المسافة الكلية التي قطعها الدراجة تساوي 1321 m، فما مقدار تسارع الدراجة بينما كانت سرعتها تتناقص إلى أن توقفت تمامًا؟
خلال الفترة الأولى من الحركة، كان سائق الدراجة يتحرك بسرعة ثابتة؛ أي أن:

$$a = 0.00 \text{ m/s}^2.$$

لذا فإن المسافة المقطوعة خلال هذه الفترة تساوي:

$$\begin{aligned} d &= vt \\ &= (12.0 \text{ m/s})(72 \text{ s}) \\ &= 864 \text{ m} \end{aligned}$$

المسافة المقطوعة خلال فترة تناقص السرعة بمقدار ثابت تساوي:

$$1321 \text{ m} - 864 \text{ m} = 457 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} v_f^2 &= v_i^2 + 2a(d_f - d_i) \\ a &= \frac{(v_f^2 - v_i^2)}{2(d_f - d_i)} \\ &= \frac{(0.00 \text{ m/s})^2 - (12.0 \text{ m/s})^2}{(2)(457 \text{ m})} \\ &= -0.158 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

وبهذا التسارع يمكن تحديد المسافة التي يقطعها الفهد خلال فترة تسارعه كالتالي:

$$\begin{aligned} v_f^2 &= v_i^2 + 2a(d_f - d_i) \\ d_f - d_i &= \frac{(v_f^2 - v_i^2)}{2a} \\ &= \frac{(27.8 \text{ m/s})^2 - (0.00 \text{ m/s})^2}{(2)(5.35 \text{ m/s}^2)} \\ &= 72.3 \text{ m} \end{aligned}$$

وخلال فترة السرعة الثابتة تكون المسافة المقطوعة:

$$a = 0.00 \text{ m/s}^2$$

$$\begin{aligned} d &= vt = (27.8 \text{ m/s})(9.70 \text{ s}) \\ &= 2.70 \times 10^2 \text{ m} \end{aligned}$$

وعليه تكون المسافة الكلية هي مجموع المسافتين:

$$\begin{aligned} \Delta d_{\text{كلية}} &= 2.70 \times 10^2 \text{ m} + 72.3 \text{ m} \\ &= 342 \text{ m} \end{aligned}$$

16. أوقف سائق سيارته - وهو في عجلة من أمره - عند إشارة ضوئية حمراء، وعندما أضاء اللون الأخضر للإشارة انطلق بتسارع مقداره 6.80 m/s² لمدة 3.50 s، ثم واجه السائق إشارة ضوئية تالية لا تزال حمراء، لذا ضغط المكابح بقوة، فتسارعت السيارة بمقدار 9.60 m/s² - حتى توقفت عند الإشارة. فما المسافة الكلية التي قطعها السائق خلال رحلته هذه؟
خلال الجزء الأول من الرحلة:

$$\begin{aligned} d_f &= d_i + v_i t_f + \frac{1}{2} a t_f^2 \\ d_f - d_i &= \frac{1}{2} a t_f^2 = \left(\frac{1}{2}\right)(6.80 \text{ m/s}^2)(3.50 \text{ s})^2 \\ &= 41.6 \text{ m} \end{aligned}$$

وبالنسبة للجزء الثاني من الرحلة، حدد في البداية سرعة السيارة عند نهاية الفترة الأولى من التسارع:

$$\begin{aligned} v_f &= v_i + a t_f \\ &= (0.00 \text{ m/s}) + (6.80 \text{ m/s}^2)(3.50 \text{ s}) \\ &= 23.8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

الفصل 3 (تابع)

b. المسافة التي ارتفعها المدرب عن المنصة أثناء قفزه. عند أقصى ارتفاع يصله المدرب، تكون سرعته 0.00 m/s

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(d_f - d_i)$$

$$a = -g \quad \text{حيث إن:}$$

$$\begin{aligned} (d_f - d_i) &\equiv \frac{(v_f^2 - v_i^2)}{2(-g)} \quad \text{فإن} \\ &= \frac{(0.00 \text{ m/s})^2 - (3.24 \text{ m/s})^2}{2(-9.80 \text{ m/s}^2)} \\ &= 0.536 \text{ m} \end{aligned}$$

18. قذف رجل فوق تل حجراً نحو بركة في أسفل الوادي، فسمع صوت ارتطام الحجر بالماء بعد مرور 4.78 s . فكم يبعد سطح الماء عن الرجل؟ افترض أن الاتجاه إلى أسفل هو الاتجاه الموجب.

$$\begin{aligned} d_f &= d_i + v_i t_f + \frac{1}{2} a t_f^2 \\ &= 0.00 \text{ m} + (0.00 \text{ m/s})(4.78 \text{ s}) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2}\right)(9.80 \text{ m/s}^2)(4.78 \text{ s})^2 \\ &= 112 \text{ m} \end{aligned}$$

19. قُذف حجر إلى أعلى بسرعة 26 m/s . ما الزمن المستغرق بعد قذف الحجر حتى تصبح سرعته المتجهة 48 m/s في اتجاه سطح الأرض؟ افترض أن الاتجاه إلى أعلى هو الاتجاه الموجب.

$$v_f = v_i + a t_f$$

$$a = -g \quad \text{حيث إن:}$$

$$\begin{aligned} t_f &= \frac{(v_f - v_i)}{(-g)} \quad \text{فإن} \\ &= \frac{-48 \text{ m/s} - 26 \text{ m/s}}{-9.80 \text{ m/s}^2} \\ &= 7.6 \text{ s} \end{aligned}$$

20. يبلغ ارتفاع منصة القفز في معظم برك السباحة 3.00 m فوق سطح الماء. فإذا قفز مدرب الغطس عن المنصة فلامس سطح الماء بعد مرور 1.18 s ، فحدد: **a.** السرعة المتجهة الابتدائية للمدرب الغطس.

$$d_f = d_i + v_i t_f + \frac{1}{2} a t_f^2$$

$$a = -g \quad \text{حيث إن:}$$

$$\begin{aligned} v_i &= \frac{d_f - d_i - \left(\frac{1}{2}\right)(-g) t_f^2}{t_f} \quad \text{فإن} \\ &= \frac{(-3.00 \text{ m}) - \left(\frac{1}{2}\right)(-9.80 \text{ m/s}^2)(1.18 \text{ s})^2}{(1.18 \text{ s})} \\ &= 3.24 \text{ m/s} \end{aligned}$$

القوى في بُعد واحد


مسائل تدريبية

4-1 القوة والحركة (صفحات 104-95)


صفحة 98

حدد النظام، وارسم مخطط الحركة، ومخطط الجسم الحر لكل من الحالات الآتية بتمثيل جميع القوى ومسبباتها، وتعيين اتجاه التسارع والقوة المحصلة، مراعيًا رسم المتجهات بأطوال مناسبة:




1. سقوط أصيص أزهار سقوطًا حرًا (أهمل أي قوى تنشأ عن مقاومة الهواء).




2. هبوط مظلي خلال الهواء، وبسرعة متجهة منتظمة (يؤثر الهواء في المظلي بقوة إلى أعلى).




3. سلك يسحب صندوقًا بسرعة منتظمة على سطح أفقي (يؤثر السطح بقوة تقاوم حركة الصندوق).



4. رُفِع دلو بحبل بسرعة منتظمة (أهمل مقاومة الهواء).



5. إنزال دلو بحبل بسرعة منتظمة (أهمل مقاومة الهواء).



صفحة 102

6. قوتان أفقيتان إحداهما 225 N والأخرى 165 N، تؤثران في قارب في الاتجاه نفسه. أوجد القوة الأفقية المحصلة التي تؤثر في القارب مقدارًا واتجاهًا.

$$F_{\text{المحصلة}} = 225 \text{ N} + 165 \text{ N} = 3.90 \times 10^2 \text{ N}$$

في اتجاه القوتين


7. إذا أثرت القوتان السابقتان في القارب في اتجاهين متعاكسين، فما القوة الأفقية المحصلة التي تؤثر فيه؟ تأكد من تحديد اتجاه القوة المحصلة.

$$F_{\text{المحصلة}} = 225 \text{ N} - 165 \text{ N} = 6.0 \times 10^1 \text{ N}$$

في اتجاه القوة الكبرى

تابع الفصل 4

12. مخطط الجسم الحر ارسم مخطط الجسم الحر لدلو ماء تُرفع بحبل. حدد النظام، ثم سمِّ جميع القوى مع مسبباتها، وارسم أسهمًا بأطوال صحيحة.



13. اتجاه السرعة المتجهة إذا دفعت كتابًا نحو الأمام، فهل يعني هذا أن سرعته المتجهة ستكون في الاتجاه نفسه؟ لا، من الممكن أنه يتحرك إلى الخلف وتقوم بتقليل سرعته عند دفعه إلى الأمام.

14. التفكير الناقد تؤثر قوة مقدارها 1 N في مكعب خشبي فتكسبه تسارعًا معلومًا. عندما تؤثر القوة نفسها في مكعب آخر فتكسبه تسارعًا أكبر بثلاثة أمثال، فماذا تستنتج حول كتلة كل من هذين المكعبين؟
بما أن $m = \frac{F}{a}$ والقوى هي نفسها، لذا فإن كتلة المكعب الثاني تساوي $\frac{1}{3}$ كتلة المكعب الأول.

مسائل تدريبية

- 4-2 استخدام قوانين نيوتن (صفحات 111-105) صفحة 106

15. ما وزن بطيخة كتلتها 4.0 kg؟

تمثل قراءة تدرج الميزان وزن البطيخة

$$F_g = mg = (4.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 39 \text{ N}$$

16. يتعلم أحمد التزلج على الجليد، ويساعده أبوه بأن يسحبه بحيث يكتسب تسارعًا مقداره 0.80 m/s^2 . فإذا كانت كتلة أحمد 27.2 kg، فما مقدار القوة التي يسحبه بها أبوه؟ (أهمل المقاومة بين الجليد وحذاء التزلج).

$$F_{\text{الحصلة}} = ma = (27.2 \text{ kg})(0.80 \text{ m/s}^2) = 22 \text{ N}$$

17. تمسك أمل وسارة معًا بقطعة حبل كتلتها 0.75 kg، وتشد كل منهما في الاتجاه المعاكس للأخرى. فإذا

الفيزياء

8. تحاول ثلاثة خيول سحب عربة؛ أحدها يسحب إلى الغرب بقوة 35 N، والثاني يسحب إلى الغرب أيضًا بقوة 42 N، أما الأخير فيسحب إلى الشرق بقوة 53 N. احسب القوة المحصلة التي تؤثر في العربة.

حدد الاتجاه نحو الشرق على أنه الاتجاه الموجب، والعربة تمثل النظام.

$$\begin{aligned} F_{\text{الحصلة}} &= F_{\text{الحصان الأول في العربة}} + F_{\text{الحصان الثاني في العربة}} - F_{\text{الحصان الثالث في العربة}} \\ &= 35 \text{ N} + 42 \text{ N} - 53 \text{ N} \\ &= 24 \text{ N} \end{aligned}$$

$$F_{\text{الحصلة}} = 24 \text{ N} \text{ في اتجاه الغرب}$$

مراجعة القسم

1-4 القوة والحركة (صفحات 104-95)


صفحة 104

9. القوة صُنِّف كلاً من: الوزن، الكتلة، القصور الذاتي، الدفع باليد، الدفع، المقاومة، مقاومة الهواء، قوة النابض، التسارع إلى:
a. قوة تلامس b. قوة مجال c. ليست قوة
الوزن (b)، الكتلة (c)، القصور الذاتي (c)، الدفع باليد (a)، الدفع (a)، المقاومة (b)، مقاومة الهواء (a)، قوة النابض (a)، التسارع (c).

10. القصور الذاتي هل يمكن أن تشعر بالقصور الذاتي لقلم رصاص أو كتاب؟ إذا كنت تستطيع فصف ذلك.

نعم، يمكن أن تشعر بالقصور الذاتي لكلا الجسمين، وذلك باستعمال يدك لإعطاء الجسم تسارعًا، في محاولة لتغيير سرعته المتجهة.

11. مخطط الجسم الحر ارسم مخطط الجسم الحر لكيس مليء بالسكر ترفعه بيدك بسرعة منتظمة. حدد النظام، وسمِّ جميع القوى مع مسبباتها، وارسم أسهمًا بأطوال صحيحة.



تابع الفصل 4

الميزان السفلي 29 N والميزان العلوي 41 N.

صفحة 109

19. يبين ميزانك المنزلي أن وزنك 585 N.

a. ما كتلتك؟

تكون قراءة الميزان 585 N، وبما أنه لا يوجد تسارع فإن وزنك يساوي قوة الجاذبية نحو الأسفل.

$$F_g = mg$$

لذا فإن:

$$m = \frac{F_g}{g} = \frac{585 \text{ N}}{9.80 \text{ m/s}^2} = 59.7 \text{ kg}$$

b. كيف ستكون قراءة الميزان نفسه على سطح القمر؟ (تسارع الجاذبية على القمر = 1.6 m/s²).

تتغير قيمة g على سطح القمر.

$$F_g = mg_{\text{القمر}}$$

$$= (59.7 \text{ kg})(1.60 \text{ m/s}^2)$$

$$= 95.5 \text{ N}$$

20. استخدم نتائج المثال 2 للإجابة عن مسائل حول

ميزان داخل مصعد. ما القوة التي يؤثر بها الميزان في شخص يقف داخله، في الحالات التالية؟

a. يتحرك المصعد بسرعة منتظمة.

السرعة ثابتة، لذا فإن: $a = 0$

$$F_{\text{الحملة}} = 0$$

$$F_{\text{الميزان}} = F_g$$

$$= mg = (75.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$= 735 \text{ N}$$

b. يتباطأ المصعد بمقدار 2.00 m/s² في أثناء حركته إلى أعلى.

يحدث تباطؤ في أثناء الحركة نحو الأعلى، لذا فإن:

$$a = -2.00 \text{ m/s}^2$$

سحبت أمل بقوة 16.0 N، وتسارع الحبل بالمقدار 1.25 m/s² مبتعداً عنها، ما القوة التي تسحب بها سارة الحبل؟

حدد اتجاه سارة على أنه الاتجاه الموجب، وأن الحبل يمثل النظام.


$$F_{\text{الحملة}} = F_{\text{سارة في الحبل}} - F_{\text{أمل في الحبل}} = ma$$

$$F_{\text{سارة في الحبل}} = ma + F_{\text{أمل في الحبل}}$$

$$= (0.75 \text{ kg})(1.25 \text{ m/s}^2) + 16.0 \text{ N}$$

$$= 17 \text{ N}$$

18. يبين الشكل 4-8 مكعباً خشبياً كتلته 1.2 kg، وكرة كتلتها 3.0 kg، ما قراءة كل من الميزانين؟ (أهمل كتلة الميزانين).



الشكل 4-8 ■

الميزان السفلي: حدد الكرة على أنها تمثل النظام، وأن الاتجاه إلى أعلى هو الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{الحملة}} = F_{\text{الميزان في الكرة}} - F_{\text{كتلة في الكرة}} = ma = 0$$

$$F_{\text{الميزان في الكرة}} = F_{\text{كتلة في الكرة}}$$

$$= m_{\text{الكرة}} g$$

$$= (3.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$= 29 \text{ N}$$

الميزان العلوي: حدد المكعب على أنه يمثل النظام، وأن الاتجاه نحو أعلى هو الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{الحملة}} = F_{\text{الميزان العلوي في المكعب}} - F_{\text{الميزان السفلي في المكعب}} - F_{\text{كتلة الأرض في المكعب}}$$

$$= ma = 0$$

$$F_{\text{الميزان العلوي في المكعب}} = F_{\text{الميزان السفلي في المكعب}} + F_{\text{كتلة الأرض في المكعب}}$$

$$= F_{\text{الميزان السفلي في المكعب}} + m_{\text{المكعب}} g$$

$$= 29 \text{ N} + (1.2 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$= 41 \text{ N}$$

مراجعة القسم

2-4 استخدام قوانين نيوتن (صفحات 111-105)

صفحة 111

21. جاذبية القمر قارن بين القوة اللازمة لرفع صخرة كتلتها 10 kg على سطح الأرض، وتلك القوة اللازمة لرفع الصخرة نفسها على سطح القمر. علمًا بأن تسارع الجاذبية على القمر يساوي 1.62 m/s^2 .
لرفع الصخرة على سطح الأرض:

$$\begin{aligned} F_{\text{المحصلة}} &= F_{\text{الرفع في الصخرة}} - F_{\text{القمر في الصخرة}} = 0 \\ F_{\text{الرفع في الصخرة}} &= F_{\text{الأرض في الصخرة}} = mg \\ &= (10.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 98.0 \text{ N} \end{aligned}$$

لرفع الصخرة على سطح القمر:

$$\begin{aligned} F_{\text{المحصلة}} &= F_{\text{القمر في الصخرة}} - F_{\text{الرفع في الصخرة}} = 0 \\ F_{\text{الرفع في الصخرة}} &= F_{\text{القمر على الصخرة}} = mg \\ &= (10.0 \text{ kg})(1.62 \text{ m/s}^2) \\ &= 16.2 \text{ N} \end{aligned}$$

22. الوزن الحقيقي والظاهري إذا كنت تقف على ميزان في مصعد سريع يصعد بك إلى أعلى بناية، ثم يهبط بك إلى حيث انطلقت. خلال أي من مراحل رحلتك كان وزنك الظاهري مساويًا لوزنك الحقيقي؟ وأكثر من وزنك الحقيقي؟ وأقل من وزنك الحقيقي؟ ارسم مخطط الجسم الحر لكل حالة لدعم إجاباتك.

يتساوى الوزن الحقيقي والوزن الظاهري في أثناء حركة المصعد بسرعة منتظمة إلى أعلى أو إلى أسفل. ويصبح الوزن الظاهري أقل من الوزن الحقيقي عندما يتباطأ المصعد في أثناء حركته إلى أعلى أو عند زيادة سرعته في أثناء حركته إلى أسفل. والوزن الظاهري يصبح أكبر من الوزن الحقيقي عند زيادة سرعته في أثناء حركته إلى أعلى أو عندما يتباطأ في أثناء حركته إلى أسفل.

$$\begin{aligned} F_{\text{الميزان}} &= F_{\text{المحصلة}} + F_g \\ &= ma + mg \\ &= m(a + g) \\ &= (75.0 \text{ kg})(-2.00 \text{ m/s}^2 + 9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 585 \text{ N} \end{aligned}$$

c. تزداد سرعته بمقدار 2.00 m/s^2 في أثناء حركته إلى أسفل.

التسارع نحو الأسفل لذا فإن: $a = -2.00 \text{ m/s}^2$

$$\begin{aligned} F_{\text{الميزان}} &= F_{\text{المحصلة}} + F_g \\ &= ma + mg \\ &= m(a + g) \\ &= (75.0 \text{ kg})(-2.00 \text{ m/s}^2 + 9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 585 \text{ N} \end{aligned}$$

d. يتحرك المصعد إلى أسفل بسرعة منتظمة.

السرعة ثابتة، لذا فإن: $a = 0$ و $F_{\text{المحصلة}} = 0$

$$\begin{aligned} F_{\text{الميزان}} &= F_g = mg \\ &= (75.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 735 \text{ N} \end{aligned}$$

e. يتباطأ المصعد بمقدار ثابت حتى يتوقف.

التسارع الثابت $a =$

على الرغم من أن إشارة التسارع تعتمد على اتجاه الحركة.

$$\begin{aligned} F_{\text{الميزان}} &= F_{\text{المحصلة}} + F_g \\ &= ma + mg \\ &= (75.0 \text{ kg})(a) + (75.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= (75.0 \text{ kg})(a) + 735 \text{ N} \end{aligned}$$

24. حركة المصعد ركبت مصعداً وأنت تمسك بميزان علق فيه جسم كتلته 1 kg ، وعندما نظرت إلى الميزان كانت قراءته 9.3 N ، ماذا تستنتج بشأن حركة المصعد في تلك اللحظة؟

إذا كان المصعد ثابتاً أو متحركاً بسرعة متجهة ثابتة، فينبغي أن تكون قراءة الميزان 9.80 N؛ لأن الميزان يقرأ وزناً أقل فيجب أن يكون المصعد متسارعاً نحو أسفل. ولإيجاد التسارع بصورة دقيقة، حدد الاتجاه إلى أعلى على أنه الاتجاه الموجب، والجسم الذي كتلته 1 kg على أنه النظام.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{الميزان في الجسم}} - F_{\text{كتلة الأرض في الجسم}} = ma$$

$$a = \frac{F_{\text{الميزان في الجسم}} - F_{\text{كتلة الأرض في الجسم}}}{m}$$

$$= \frac{9.3 \text{ N} - 9.80 \text{ N}}{1 \text{ kg}}$$

$$= -0.5 \text{ m/s}^2$$

إلى أسفل 0.5 m/s^2

25. كتلة تلعب نورة مع زميلتها لعبة شد الحبل مستخدمة دمية. وفي لحظة ما خلال اللعبة سحبت نورة الدمية بقوة 22 N وسحبت زميلتها الدمية بقوة معاكسة تساوي 19.5 N ، فكان تسارع الدمية 6.25 m/s^2 . ما كتلة الدمية؟

حدد الدمية على أنها تمثل النظام، والاتجاه نحو زميلتها على أنه الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{نورة في الدمية}} - F_{\text{زميلتها في الدمية}} = ma$$

$$m = \frac{F_{\text{نورة في الدمية}} - F_{\text{زميلتها في الدمية}}}{a}$$


$$= \frac{22 \text{ N} - 19.5 \text{ N}}{6.25 \text{ m/s}^2}$$

$$= 0.40 \text{ kg}$$

26. تسارع هبط مظلي بسرعة منتظمة متخذاً هيئة الصقر المجنح. هل يتسارع المظلي بعد فتح مظلته؟ إذا كانت إجابتك نعم ففي أي اتجاه؟ فسر إجابتك باستخدام قوانين نيوتن.

نعم يتسارع إلى أعلى لبرهة من الزمن؛ وذلك بسبب تأثير قوة إضافية في اتجاه أعلى، وهي ناتجة عن مقاومة الهواء التي تؤثر في المظلة. والتسارع إلى أعلى يقلل من السرعة إلى أسفل.


السرعة المتجهة الثابتة



زيادة السرعة في أثناء الهبوط / التباطؤ في أثناء الصعود



زيادة السرعة في أثناء الصعود / التباطؤ في أثناء الهبوط



23. التسارع يقف شخص كتلته 65 kg فوق لوح تزلج على الجليد. إذا اندفع هذا الشخص بقوة 9.0 N فما تسارعه؟

حدد الشخص على أنه يمثل النظام، والاتجاه مبتعداً عن اللوح على أنه الاتجاه الموجب، ويمكن اعتبار الجليد سطحاً مهملاً المقاومة.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{اللوح في الشخص}} = ma$$


$$a = \frac{F_{\text{الشخص في اللوح}}}{m}$$

$$= \frac{9.0 \text{ N}}{65.0 \text{ kg}}$$

بعيداً عن الألواح الجانبية 0.14 m/s^2

تابع الفصل 4

30. قذفت كرة إلى أعلى في الهواء، ارسم مخطط الجسم الحر الذي يمثل الكرة أثناء حركتها إلى أعلى، وحدد القوى التي تؤثر في الكرة، والقوى التي تؤثر بها الكرة، والأجسام التي تؤثر فيها هذه القوى.




القوة الوحيدة المؤثرة في الكرة هي قوى الجاذبية الناتجة عن كتلة الأرض. وتؤثر الكرة في الأرض بقوة مساوية ومضادة في الاتجاه.

31. وضعت حقيبة سفر على عربة أمتعة ساكنة كما في الشكل 13-4، ارسم مخطط الجسم الحر لكل جسم، وبين أزواج التأثير المتبادل حيثما وجدت.



الشكل 13-4



تؤثر الحقيبة بقوة مساوية لوزنها في العربة، وبما أن النظام ساكن فإن العربة تؤثر في الحقيبة بقوة مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه.

27. التفكير الناقد يعمل حسن في مستودع، ومهمته تحميل المخزون في شاحنات حمولة كل منها 10000 N، يتم وضع الصناديق واحداً تلو الآخر فوق حزام متحرك قليل الاحتكاك لينقلها إلى الميزان، وعند وضع أحد الصناديق الذي يزن 1000 N، تعطل الميزان. اذكر طريقة يمكن بواسطتها تطبيق قوانين نيوتن لتحديد الكتل التقريبية للصناديق المتبقية.

ستختلف الإجابات، واحدى هذه الإجابات المحتملة تتمثل في إهمال مقاومة الهواء إذا كنت تستخدم الحزام المتحرك. استخدم الصندوق الذي وزنه 1000 N على أنه مقياس. اسحب الصندوق بقوة معينة لمدة ثانية، ثم قدر سرعته، واحسب التسارع. اسحب صندوقاً كتلته مجهولة بالقوة السابقة نفسها ولمدة ثانية، ثم قدر سرعته، واحسب تسارعه. إن القوة التي سحبت بها كل صندوق تمثل القوة المحصلة.

$$F_{\text{المحصلة على الصندوق المجهول الوزن}} = F_{\text{المحصلة على الصندوق المعلوم الوزن}}$$

$$(a_{\text{الصندوق المجهول الوزن}})(m_{\text{الصندوق المجهول الوزن}}) = (a_{\text{الصندوق المعلوم الوزن}})(1000 \text{ N})$$

$$m_{\text{الصندوق المجهول الوزن}} = \frac{(1000 \text{ N})(a_{\text{الصندوق المعلوم الوزن}})}{a_{\text{الصندوق المجهول الوزن}}}$$

مسائل تدريبية

3-4 قوى التأثير المتبادل (صفحات 120 – 112) صفحة 115

28. ترفع بيدك كرة بولينج خفيفة نسبياً وتسارعها إلى أعلى. ما القوى المؤثرة في الكرة؟ وما القوى التي تؤثر بها الكرة؟ وما الأجسام التي تؤثر فيها هذه القوى؟ إن القوى التي تؤثر في الكرة، هي: قوة يدك وقوة الجاذبية الناتجة عن كتلة الأرض. تؤثر الكرة بقوة في يدك وقوة جاذبية في الأرض. وتؤثر جميع هذه القوى في كل من يدك والكرة والأرض.

29. تسقط طوبة من فوق سقالة بناء. حدد القوى التي تؤثر في الطوبة، وتلك التي تؤثر بها الطوبة، ثم حدد الأجسام التي تؤثر فيها هذه القوى (بإهمال تأثير مقاومة الهواء).

القوة الوحيدة التي تؤثر في الطوبة هي قوة الجاذبية الأرضية الناتجة عن كتلة الأرض. وتؤثر الطوبة في الأرض بقوة مساوية لها في المقدار ومعاكسة في الاتجاه.

مراجعة القسم

3-4 قوى التأثير المتبادل (صفحات 120-112)

صفحة 120

34. القوة مُدّ ذراعك أمامك في الهواء، وأسند كتابًا إلى راحة يدك بحيث يكون مستقرًا. حدد القوى، وأزواج التأثير المتبادل التي تؤثر في الكتاب.

القوة التي تؤثر في الكتاب هي قوة الجاذبية الأرضية التي تؤثر إلى أسفل بتأثير كتلة الكتاب، وقوة اليد التي تؤثر إلى الأعلى. القوة التي يؤثر بها الكتاب في قوة الجاذبية الأرضية والقوة التي يؤثر بها في اليد هي الأنصاف الأخرى لأزواج التأثير المتبادل.

35. القوة إذا خفضت الكتاب الوارد في المسألة السابقة بتحريك يدك إلى أسفل بسرعة متزايدة، فهل يتغير أي من القوى، أو أزواج التأثير المتبادل المؤثرة في الكتاب؟ وضح ذلك.

نعم، تصبح القوة التي تؤثر بها اليد في الكتاب أصغر، وعليه يوجد تسارع إلى أسفل، كما أن القوة التي يؤثر بها الكتاب تصبح أصغر، ويمكن أن تشعر بذلك. وتبقى كل قوة تشترك في أزواج التأثير المتبادل كما هي.

36. قوة الشد تتدلى من السقف قطعة طوب مربوطة بحبل مهمل الكتلة، ومربوط بها من أسفل قطعة طوب أخرى بحبل مهمل الكتلة أيضًا. ما قوة الشد في كل من الحبلين إذا كانت كتلة كل قطعة 5.0 kg؟ بالنسبة للحبل السفلي، فإن الاتجاه نحو أعلى هو الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{الحبل السفلي في قطعة الطوب السفلية}} - F_{\text{كتلة الأرض في قطعة الطوب السفلية}}$$

$$= ma = 0$$

$$F_{\text{كتلة الأرض في قطعة الطوب السفلية}} = F_{\text{الحبل السفلي في قطعة الطوب السفلية}}$$

$$= mg$$

$$= (5.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$= 49 \text{ N}$$

بالنسبة للحبل العلوي، فإن الاتجاه نحو أعلى هو الاتجاه الموجب.

32. وضعت معدات في دلو فأصبحت كتلته 42 kg، فإذا رفع الدلو إلى سطح منزل بواسطة حبل يتحمل شدًا لا يتجاوز 450 N، فما أقصى تسارع يمكن أن يكتسبه الدلو أثناء سحبه إلى أعلى السطح؟ حدد الدلو على أنه يمثل النظام، وأن الاتجاه نحو الأعلى يمثل الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{كتلة الأرض في الدلو}} - F_{\text{الحبل في الدلو}} = F_{\text{المحصلة}}$$

$$= ma$$

$$a = \frac{F_{\text{الحبل في الدلو}} - F_{\text{كتلة الأرض في الدلو}}}{m}$$

$$= \frac{F_{\text{الحبل في الدلو}} - mg}{m}$$

$$= \frac{450 \text{ N} - (42 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)}{42 \text{ kg}}$$

$$= 0.91 \text{ m/s}^2$$

33. حاول سالم وأحمد إصلاح إطار السيارة، لكنهما واجها صعوبة كبيرة في نزع الإطار المطاطي عن الدولاب، فقاما بسحبه معًا؛ حيث سحب أحمد بقوة 23 N، وسالم بقوة 31 N، وعندئذ تمكنا من زحزحة الإطار. ما مقدار القوة بين الإطار المطاطي والدولاب؟ حدد الإطار على أنه يمثل النظام، وأن اتجاه قوة السحب يمثل الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{سالم في الإطار المطاطي}} - F_{\text{أحمد في الإطار المطاطي}} - F_{\text{الدولاب في الإطار المطاطي}} = F_{\text{المحصلة}}$$

$$= ma = 0$$

$$F_{\text{سالم في الإطار المطاطي}} = F_{\text{أحمد في الإطار المطاطي}} + F_{\text{الدولاب في الإطار المطاطي}}$$

$$= 23 \text{ N} + 31 \text{ N}$$

$$= 54 \text{ N}$$

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{الجبل العلوي في قطعة الطوب العلوية}} - F_{\text{الجبل السفلي في قطعة الطوب العلوية}} - F_{\text{كتلة الأرض في قطعة الطوب العلوية}}$$

$$= ma = 0$$

$$F_{\text{الجبل العلوي في قطعة الطوب العلوية}} = F_{\text{كتلة الأرض في قطعة الطوب العلوية}} + F_{\text{الجبل السفلي في قطعة الطوب العلوية}}$$

$$= mg + F_{\text{الجبل السفلي في قطعة الطوب العلوية}}$$

$$= (5.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) + 49 \text{ N}$$

$$= 98 \text{ N}$$

37. الشد إذا كانت كتلة قطعة الطوب السفلية الواردة في المسألة السابقة 3.0 kg، وقوة الشد في الجبل العلوي 63.0 N، فاحسب كلا من قوة الشد في الجبل السفلي، وكتلة قطعة الطوب. بالنسبة للجبل السفلي، فإن الاتجاه نحو أعلى هو الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{الجبل السفلي في قطعة الطوب السفلية}} - F_{\text{كتلة الأرض في قطعة الطوب السفلية}}$$

$$= ma = 0$$

$$F_{\text{الجبل السفلي في قطعة الطوب السفلية}} = F_{\text{كتلة الأرض في قطعة الطوب السفلية}}$$

$$= (3.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$= 29 \text{ N}$$

بالنسبة للجبل العلوي، فإن الاتجاه نحو أعلى هو الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{الجبل العلوي في قطعة الطوب العلوية}} - F_{\text{الجبل السفلي في قطعة الطوب العلوية}} - F_{\text{كتلة الأرض في قطعة الطوب العلوية}}$$

$$= ma = 0$$

$$F_{\text{كتلة الأرض في قطعة الطوب العلوية}} = mg$$

$$= F_{\text{الجبل العلوي في قطعة الطوب العلوية}} - F_{\text{الجبل السفلي في قطعة الطوب العلوية}}$$

$$m = \frac{F_{\text{الجبل العلوي في قطعة الطوب العلوية}} - F_{\text{الجبل السفلي في قطعة الطوب العلوية}}}{g}$$

$$= \frac{63.0 \text{ N} - 29 \text{ N}}{9.80 \text{ m/s}^2} = 3.5 \text{ kg}$$

38. القوة العمودية يُسلم صالح صندوقاً كتلته 13 kg إلى شخص كتلته 61 kg يقف على منصة. ما القوة العمودية التي تؤثر بها المنصة في هذا الشخص؟

حدد الشخص على أنه يمثل النظام، وأن الاتجاه نحو أعلى هو الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{المنصة في الشخص}} - F_{\text{الصندوق في الشخص}} - F_{\text{كتلة الأرض في الشخص}}$$

$$F_{\text{كتلة الأرض في الشخص}} = F_{\text{الصندوق في الشخص}} + F_{\text{المنصة في الشخص}}$$

$$= m_{\text{الصندوق}} g + m_{\text{الشخص}} g$$

$$= (13 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) + (61 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$


$$= 7.3 \times 10^2 \text{ N}$$

تابع الفصل 4

43. تسقط صخرة من جسر إلى واد، فتؤثر الأرض فيها بقوة جذب وتجعلها تتسارع إلى أسفل، وحسب قانون نيوتن الثالث فإن الصخرة تؤثر أيضًا في الأرض بقوة جذب، ولكن لا يبدو أن الأخيرة تتسارع إلى أعلى. فسّر ذلك. (4-3)

إن الصخرة تسحب الأرض، ولكن بسبب كتلة الأرض الضخمة فإنها تكتسب تسارعًا قليلًا جدًا نتيجة لهذه القوة الصغيرة، ولذا لا يمكن أن نلاحظ مثل هذا التسارع، بعكس الصخرة.

44. يبين الشكل 17-4 كتلة في أربعة أوضاع مختلفة. رتب هذه الأوضاع بحسب مقدار القوة العمودية بين الكتلة والسطح، من الأكبر إلى الأصغر. أشر إلى أي علاقة بين نتائج الإجابة. (4-3)



الشكل 17-4

الرابع < الأول < الثالث < الثاني

45. فسّر لماذا يكون الشد ثابتًا في كل نقاط حبل مهمل الكتلة؟ (4-3)

إذا رسمت مخطط الجسم الحر لأي نقطة في الحبل، فستكون هناك قوتان شديتان تؤثران في اتجاهين متضادين (لأنه مهمل الكتلة) $ma = 0 = F_{\text{أسفل}} - F_{\text{أعلى}} = F_{\text{الحصلة}}$ لذا فإن $F_{\text{أسفل}} = F_{\text{أعلى}}$ ، وبحسب قانون نيوتن الثالث فإن القوة التي تؤثر بها قطعة من الحبل في هذه النقطة تساوي وتعاكس القوة التي تؤثر بها هذه النقطة في القطعة، مع ثبات القوة خلال الحبل.


39. التفكير الناقد وضعت ستارة بين فريقين لشد الحبل بحيث تمنع كل فريق من رؤية الفريق الآخر. فإذا ربط أحد الفريقين طرف الحبل الذي من جهته بشجرة، فما قوة الشد المتولدة في الحبل إذا سحب الفريق الآخر بقوة 500 N؟ وضح ذلك. يجب أن يكون الشد 500 N، فيكون الحبل متزنًا، لذا فإن القوة المحصلة المؤثرة فيه تساوي صفرًا. ويؤثر الفريق والشجرة بقوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه.

تقويم الفصل

خريطة المفاهيم

صفحة 125

40. أكمل خريطة المفاهيم التالية باستخدام المصطلحات والرموز الآتية: F_g ، القوة العمودية، F_T ، F_N



إتقان المفاهيم

صفحة 125

41. افترض أن تسارع جسم يساوي صفرًا، فهل يعني هذا عدم وجود أي قوى تؤثر فيه؟ (4-2)

لا، هذا يعني فقط أن القوى المؤثرة فيه متزنة، وأن القوة المحصلة تساوي صفرًا. فعلى سبيل المثال، إذا وضع كتاب على سطح طاولة، فإنه يبقى ساكنًا على الرغم من أن قوة الجاذبية تسحبه إلى أسفل، والقوة العمودية التي تؤثر بها الطاولة في الكتاب تدفعه إلى أعلى، وهذه القوى متزنة.

42. إذا كان كتابك متزنًا، فما القوى التي تؤثر فيه؟ (4-2)

إذا كان الكتاب متزنًا فإن القوة المحصلة تساوي صفرًا؛ أي أن كلا من القوى المؤثرة في الكتاب والمتمثلة في وزنه والقوة العمودية عليه تكون متزنة.

تابع الفصل 4

إتقان حل المسائل 1-4 القوة والحركة صفحة 125

48. ما القوة المحصلة التي تؤثر في كرة كتلتها 1.0 kg وتسقط سقوطاً حراً؟

$$\begin{aligned} F_{\text{المحصلة}} &= F_g = mg \\ &= (1.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 9.8 \text{ N} \end{aligned}$$

49. تتباطأ سيارة كتلتها 2300 kg بمقدار 3.0 m/s^2 عندما تقترب من إشارة مرور. ما مقدار القوة المحصلة التي تجعلها تتباطأ وفق المقدار المذكور؟

$$\begin{aligned} F &= ma \\ &= (2300 \text{ kg})(3.0 \text{ m/s}^2) \\ &= 6.9 \times 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

2-4 استخدام قوانين نيوتن (صفحتا 125-126)

50. ما وزنك بوحدة النيوتن؟

$$F_g = mg = (9.80 \text{ m/s}^2)(m)$$

ستختلف الإجابات


51. تزن دراجتك النارية 2450 N ، فما كتلتها بالكيلو جرام؟

$$\begin{aligned} F_g &= mg \\ m &= \frac{F_g}{g} = \frac{2450 \text{ N}}{9.80 \text{ m/s}^2} \\ &= 2.50 \times 10^2 \text{ N} \end{aligned}$$

52. وضع تلفاز كتلته 7.50 kg على ميزان نابض. إذا كانت قراءة الميزان 78.4 N ، فما تسارع الجاذبية الأرضية في ذلك المكان؟

$$\begin{aligned} F_g &= mg \\ g &= \frac{F_g}{m} \\ &= \frac{78.4 \text{ N}}{7.50 \text{ kg}} \\ &= 10.5 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$


46. يقف طائر على قمة مبنى. ارسم مخطط الجسم الحر لكل من الطائر والمبنى. وأشر إلى أزواج التأثير المتبادل بين المخططين. (3-4)



تطبيق المفاهيم (صفحة 125)

47. قذفت كرة في الهواء إلى أعلى في خط مستقيم:

a. ارسم مخطط الجسم الحر للكرة عند ثلاث نقاط في مسار حركتها: في طريقها إلى أعلى، وعند القمة، وفي طريقها إلى أسفل، وحدد القوى التي تؤثر في الكرة.



b. ما سرعة الكرة عند أعلى نقطة وصلت إليها؟

$$0 \text{ m/s}$$

c. ما تسارع الكرة عند هذه النقطة؟

لأن القوة الوحيدة التي تؤثر فيها هي قوة جذب الأرض لها، لذا، $a = 9.80 \text{ m/s}^2$

تابع الفصل 4

e. إذا تباطأ المصعد في أثناء حركته إلى أسفل بتسارع ثابت حتى يتوقف.

يعتمد ذلك على مقدار التسارع

$$\begin{aligned} F_{\text{الميزان}} &= F_g + F_{\text{التباطؤ}} \\ &= mg + ma \\ &= m(g + a) \\ &= (53 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2 + a) \end{aligned}$$

54. فلك إذا كان تسارع الجاذبية على سطح عطارد يعادل 0.38 من قيمته على سطح الأرض:

a. فما وزن جسم كتلته 6.0 kg على سطح عطارد؟

$$\begin{aligned} F_g &= mg(0.38) \\ &= (6.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(0.38) \\ &= 22 \text{ N} \end{aligned}$$

b. إذا كان تسارع الجاذبية على سطح بلوتو يساوي 0.08 من مثيله على سطح عطارد، فما وزن كتلة 7.0 kg على سطح بلوتو؟

$$\begin{aligned} F_g &= mg(0.38)(0.08) \\ &= (7.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(0.38)(0.08) \\ &= 2.1 \text{ N} \end{aligned}$$

55. قفز غواص كتلته 65 kg من منصة ارتفاعها 10.0 m.

a. أوجد سرعة الغواص لحظة ارتطامه بسطح الماء.

$$\begin{aligned} v_f^2 &= v_i^2 + 2gd \\ v_i &= 0 \text{ m/s} \\ v_f &= \sqrt{2gd} \\ &= \sqrt{2(9.80 \text{ m/s}^2)(10.0 \text{ m})} \\ &= 14.0 \text{ m/s} \end{aligned}$$

53. وضع ميزان داخل مصعد. ما القوة التي يؤثر بها الميزان في شخص يقف عليه كتلته 53 kg ، وذلك في الحالات الآتية:

a. إذا تحرك المصعد بسرعة منتظمة إلى أعلى.

$$\begin{aligned} F_{\text{الميزان}} &= F_g \\ &= mg \\ &= (53 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 5.2 \times 10^2 \text{ N} \end{aligned}$$

b. إذا تباطأ المصعد بمقدار 2.0 m/s² في أثناء حركته إلى أعلى.

يتباطأ في أثناء الصعود أو يتسارع في أثناء الهبوط.

$$\begin{aligned} F_{\text{الميزان}} &= F_g + F_{\text{التباطؤ}} \\ &= mg + ma \\ &= m(g + a) \\ &= (53 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2 - 2.0 \text{ m/s}^2) \\ &= 4.1 \times 10^2 \text{ N} \end{aligned}$$

c. إذا تسارع المصعد بمقدار 2.0 m/s² في أثناء حركته إلى أسفل.

يتباطأ في أثناء الصعود أو يتسارع في أثناء الهبوط.

$$\begin{aligned} F_{\text{الميزان}} &= F_g + F_{\text{التسارع}} \\ &= mg + ma \\ &= m(g + a) \\ &= (53 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2 + 2.0 \text{ m/s}^2) \\ &= 4.1 \times 10^2 \text{ N} \end{aligned}$$

d. إذا تحرك المصعد إلى أسفل بسرعة منتظمة.

$$\begin{aligned} F_{\text{الميزان}} &= F_g \\ &= mg \\ &= (53 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 5.2 \times 10^2 \text{ N} \end{aligned}$$

3-4 قوى التأثير المتبادل

صفحة 126

57. وضع مكعب من الحديد كتلته 6.0 kg على سطح مكعب آخر كتلته 7.0 kg يستقر بدوره على سطح طاولة أفقية، احسب:

a. مقدار واتجاه القوة التي يؤثر بها المكعب الذي كتلته 7.0 kg في المكعب الآخر.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_N - mg$$

$$F_N = F_{\text{المكعب الثاني في المكعب الأول}}$$

$$= mg$$

$$= (6.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$= 59 \text{ N}; \text{ إلى الأعلى}$$

b. مقدار واتجاه القوة التي يؤثر بها المكعب الذي كتلته 6.0 kg في المكعب الذي كتلته 7.0 kg

59 N، إلى أسفل.

58. تسقط قطرة مطر كتلتها 2.45 mg على الأرض. ما مقدار القوة التي تؤثر بها في الأرض؟

$$F_{\text{قطرة المطر في الأرض}} = F_g$$

$$= mg$$

$$= (0.00245 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$= 2.40 \times 10^{-2} \text{ N}$$

59. يلعب شخصان لعبة شد الحبل. أحدهما كتلته 90.0 kg يشد الحبل بحيث يكتسب الشخص الآخر وكتلته 55 kg تسارعاً مقداره 0.025 m/s². ما القوة التي يؤثر بها الحبل في الشخص ذي الكتلة الكبرى؟

بالمقدار نفسه للقوة التي يؤثر بها الحبل في الشخص الذي كتلته تساوي 55 kg:

$$F = ma = (55 \text{ kg})(0.025 \text{ m/s}^2) = 1.4 \text{ N}$$

b. إذا توقفت الغواص على بُعد 2.0 m تحت سطح الماء، فأوجد محصلة القوة التي يؤثر بها الماء في الغواص.

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad$$

$$v_f = 0 \text{ m/s},$$

$$a = \frac{-v_i^2}{2d}$$

$$F = ma \text{ و}$$

$$= \frac{-mv_i^2}{2d}$$

$$= \frac{-(65 \text{ kg})(14.0 \text{ m/s})^2}{2(2.0 \text{ m})}$$

$$= -3.2 \times 10^3 \text{ N}$$

لذا فإن

56. بدأت سيارة سباق كتلتها 710 kg حركتها من السكون وقطعت مسافة 40.0 m في 3.0 s. فإذا كان تسارع السيارة ثابتاً خلال هذه الفترة، فما القوة المحصلة التي تؤثر فيها؟

$$d = v_0 t + \left(\frac{1}{2}\right)at^2$$

وبما أن:

$$v_0 = 0,$$

فإن:

$$a = \frac{2d}{t^2}$$

و

$$F = ma,$$

ولذلك فإن:

$$F = \frac{2md}{t^2} = \frac{(2)(710 \text{ kg})(40.0 \text{ m})}{(3.0 \text{ s})^2} = 6.3 \times 10^3 \text{ N}$$

تابع الفصل 4

b. ما القوة التي يؤثر بها الجسم الذي كتلته 4.3 kg في الجسم الذي كتلته 5.4 kg؟

حدد الجسم الذي كتلته 5.4 kg على أنه يمثل النظام، وأن الاتجاه نحو اليمين هو الاتجاه الموجب.

$$\begin{aligned} F_{\text{المحصلة}} &= F_{5.4 \text{ kg في الجسم الذي كتلته 4.3 kg}} \\ &= ma \\ &= (5.4 \text{ kg})(2.3 \text{ m/s}^2) \\ &= 12 \text{ N إلى اليمين} \end{aligned}$$

c. ما القوة التي يؤثر بها الجسم الذي كتلته 5.4 kg في الجسم الذي كتلته 4.3 kg؟

وفقاً للقانون الثالث لنيوتن، يجب أن تكون هذه القوة مساوية ومعاكسة للقوة التي حسبت في الفرع **b**، ولذلك يكون مقدار هذه القوة 12 N، أما اتجاهها فيكون إلى اليسار.

62. جسمان كتلة الأول 5.0 kg، وكتلة الثاني 3.0 kg، مربوطان بحبل مهملة الكتلة (انظر الشكل 19-4). يمر الحبل فوق بكرة ملساء مهملة الكتلة. إذا انطلق الجسمان من السكون، فأوجد ما يأتي:

- قوة الشد في الحبل.
- تسارع الجسمين.

تلميح: ستحتاج إلى حل المعادلتين آنياً.



الشكل 19-4 ■

يمكن الحصول على المعادلة الأولى من مخطط الجسم الحر للجسم الأول الذي كتلته تساوي 5.0 kg، والاتجاه نحو أسفل هو الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{كتلة الأرض في الجسم الأول}} - F_{\text{الحبل في الجسم الأول}} - m_{\text{الجسم الأول}} a \quad (1)$$

دليل حلول المسائل 63

60. تسارع طائرة مروحية كتلتها 4500 kg إلى أعلى بمقدار 2.0 m/s^2 . احسب القوة التي يؤثر بها الهواء في المرواح؟


$$ma = F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{الهواء في المرواح}} + F_g = F_{\text{الهواء في المرواح}} + mg$$

ولذلك:

$$\begin{aligned} F_{\text{الهواء في المرواح}} &= ma - mg = m(a - g) \\ &= (4500 \text{ kg})((2.0 \text{ m/s}^2) - (-9.8 \text{ m/s}^2)) \\ &= 5.3 \times 10^4 \text{ N} \end{aligned}$$

مراجعة عامة
(صفحتا 126-127)

61. يُدفع جسمان كتلة أحدهما 4.3 kg، وكتلة الآخر 5.4 kg بقوة أفقية مقدارها 22.5 N، على سطح مهمل الاحتكاك (انظر الشكل 18-4).



الشكل 18-4 ■

a. ما تسارع الجسمين؟

حدّد الجسمين معاً على أنهما يمثلان النظام، وأن الاتجاه نحو اليمين هو الاتجاه الموجب.

$$\begin{aligned} F_{\text{المحصلة}} &= ma, \\ m &= m_1 + m_2 \\ a &= \frac{F}{m_1 + m_2} \\ &= \frac{22.5 \text{ N}}{4.3 \text{ kg} + 5.4 \text{ kg}} \\ &= 2.3 \text{ m/s}^2 \text{ إلى اليمين} \end{aligned}$$

تابع الفصل 4

a. تسارع كل كتلة.

سيكون التسارع هو نفسه للكتل الثلاث ما دامت الكتل جميعها تتحرك معاً.

$$F = ma$$

$$= (m_1 + m_2 + m_3) a$$

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$= \frac{36 \text{ N}}{2.0 \text{ kg} + 4.0 \text{ kg} + 6.0 \text{ kg}}$$

$$= 3.0 \text{ m/s}^2$$

b. قوة الشد في كل خيط.

$$F_{\text{المحصلة}} = ma$$

$$F - F_{T2} = m_3 a$$

$$F_{T2} - F_{T1} = m_2 a$$

$$F_{T1} = m_1 a$$

$$= (2.0 \text{ kg})(3.0 \text{ m/s}^2)$$

$$= 6.0 \text{ N}$$

$$F_{T2} = m_2 a + F_{T1}$$

$$= (4.0 \text{ kg})(3.0 \text{ m/s}^2) + 6.0 \text{ N}$$

$$= 18 \text{ N}$$

الكتابة في الفيزياء

صفحة 127

64. ابحث عن إسهامات نيوتن في الفيزياء واكتب عن ذلك موضوعاً. هل تعتقد أن قوانينه الثلاثة في الحركة كانت من أهم إنجازاته؟ وضح إجابتك.

ستختلف الإجابات، يجب أن تشمل إسهامات نيوتن أعماله في: الضوء واللون، والتلسكوبات، والفلك، وقوانين الحركة، والجاذبية، والحساب. وتعتبر قوانين نيوتن الثلاثة من أهم إنجازاته؛ إذ إنها الأساس الذي بني على علم الكيمياء. وقد تكون محاولاته لفهم الجاذبية من أعظم إنجازاته.

يمكن الحصول على المعادلة الثانية من مخطط الجسم الحر للجسم الثاني الذي كتلته تساوي 3.0 kg، والاتجاه نحو الأعلى هو الاتجاه الموجب.

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{الجبل في الجسم الثاني}} - F_{\text{كتلة الأرض في الجسم الثاني}} = m_{\text{الجسم الثاني}} a \quad (2)$$

ستكون قوى الجبل المؤثرة في كل جسم هي نفسها أو تكون متساوية في مقدار؛ وذلك لأن الشد خلال الجبل ثابت، وتسمى هذه القوة الشد (F_T).

$$F_{\text{الجسم الأول}} - F_{T1} = m_{\text{الجسم الأول}} a \quad (1)$$

$$F_{T2} - F_{\text{كتلة الأرض في الجسم الثاني}} = m_{\text{الجسم الثاني}} a \quad (2)$$

حل المعادلة 2 بالنسبة لـ T و عوضها في المعادلة 1.

$$m_{\text{الجسم الأول}} a = F_{\text{كتلة الأرض في الجسم الأول}} - F_{\text{كتلة الأرض في الجسم الثاني}} - m_{\text{الجسم الثاني}} a$$

$$a = \frac{F_{\text{كتلة الأرض في الجسم الأول}} - F_{\text{كتلة الأرض في الجسم الثاني}}}{m_{\text{الجسم الأول}} + m_{\text{الجسم الثاني}}}$$

$$= \frac{(m_{\text{الجسم الأول}} - m_{\text{الجسم الثاني}})g}{m_{\text{الجسم الأول}} + m_{\text{الجسم الثاني}}}$$

$$= \frac{(5.0 \text{ kg} - 3.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)}{3.0 \text{ kg} + 5.0 \text{ kg}}$$

$$= 2.4 \text{ m/s}^2$$

حل المعادلة 2 بالنسبة لـ T .

$$F_{T2} = F_{\text{كتلة الأرض على الجسم الثاني}} + m_{\text{الجسم الثاني}} a$$

$$= m_{\text{الجسم الثاني}} g + m_{\text{الجسم الثاني}} a$$

$$= m_{\text{الجسم الثاني}} (g + a)$$


$$= (3.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2 + 2.4 \text{ m/s}^2)$$

$$= 37 \text{ N}$$

التفكير الناقد

صفحة 127

63. ثلاث كتل متصلة بخيوط مهملة الكتل. سحب الكتل بقوة أفقية على سطح أملس كما في الشكل 4-20. أوجد:



الشكل 4-20

مسألة تحفيز

تنطلق عربة كتلتها 0.50 kg ، وتعبّر من خلال بوابة كهروضوئية (PHOTOELECTRIC GATE) بسرعة ابتدائية مقدارها 0.25 m/s ، وتؤثر فيها لحظة عبورها قوة ثابتة مقدارها 0.40 N في اتجاه حركتها نفسه.

1. ما تسارع العربة؟

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m} = \frac{0.40 \text{ N}}{0.50 \text{ kg}} = 0.80 \text{ m/s}^2$$

2. إذا استغرقت العربة 1.3 s حتى عبورها للبوابة الثانية، فما المسافة بين البوابتين؟

$$d_f = d_i + v_i t + \frac{1}{2} at^2$$

$$= 0.0 \text{ m} + (0.25 \text{ m/s})(1.3 \text{ s}) + \frac{1}{2} (0.80 \text{ m/s}^2) (1.3 \text{ s})^2$$

$$= 1.0 \text{ m}$$

3. إذا أثرت القوة 0.40 N في العربة عن طريق ربط خيط بالعربة، ومُرّر طرف الخيط الآخر فوق بكرّة عديمة الاحتكاك، ثم ربط بكتلة تعليق m ، فما مقدار كتلة التعليق m ؟


$$F_g = m_{\text{كتلة التعليق}} g$$

$$m_{\text{كتلة التعليق}} = \frac{F_g}{g} = \frac{0.40 \text{ N}}{9.80 \text{ m/s}^2} = 4.1 \times 10^{-2} \text{ kg}$$

4. اشتق معادلة الشد في الخيط بدلالة كل من كتلة العربة M ، وكتلة التعليق m ، وتسارع الجاذبية الأرضية g .

$$T = mg = Ma$$

65. يبين الشكل 21-4 الرسم البياني لمنحنى (الموقع-الزمن) لحركة سيارتين على الطريق.



الشكل 21-4

a. عند أية لحظة تتجاوز إحدى السيارتين الأخرى؟

3 s, 8 s

b. أي السيارتين كانت تتحرك أسرع عند الزمن 7.0 s ؟

السيارة A

c. ما الزمن الذي تتساوى عنده السرعتان المتجهتان للسيارتين؟

5 s

d. ما الفترة الزمنية التي تتزايد خلالها سرعة السيارة B؟

لا توجد؛ لأن ميل المنحنى يتناقص باستمرار.

e. ما الفترة الزمنية التي تتناقص خلالها سرعة السيارة B؟

من 3 s إلى 10 s تقريباً.

66. بالرجوع إلى الشكل السابق، احسب السرعة اللحظية لكل مما يأتي:

a. السيارة B عند اللحظة 2.0 s .

0 m/s

b. السيارة B عند اللحظة 9.0 s .

0 m/s

c. السيارة A عند اللحظة 2.0 s .


1 m/s تقريباً

الفصل الرابع

4. أعاد شخص ترتيب بعض أثاث منزله، فدفَع الخزانة بقوة 143 N، وكانت هناك قوة احتكاك مقدارها 112 N تعيق حركة الخزانة، فما مقدار القوة المحصلة؟

$$F_{\text{المحصلة}} = 143 \text{ N} - 112 \text{ N} = 31 \text{ N}$$

5. تحتاج إحدى عربات العرض المخصصة للاحتفالات إلى أربعة أشخاص لشد الحبال المربوطة بها؛ للمحافظة على سرعة ثابتة للعربة مقدارها 3.0 km/h. وقد شدَّ شخصان منهما حبلين بقوة 210 N لكل منهما، وشدَّ الشخصان الآخران الحبلين الآخرين بقوة 140 N لكل منهما.



a. ارسم مخطط الجسم الحر.




b. ما مقدار قوة الاحتكاك بين العربة ووسط الأرض؟

$$F_{\text{المحصلة}} = 210 \text{ N} + 210 \text{ N} + 140 \text{ N} + 140 \text{ N} - f_k$$

$$= 0 \quad \text{وذلك لأن السرعة ثابتة}$$

$$f_k = 7.0 \times 10^2 \text{ N}$$

6. يلعب خمسة أشخاص لعبة شد الحبل؛ فيشد كل من عمر وخالد إلى اليمين بقوة مقدارها 45 N و35 N على الترتيب، ويشد كل من محمد وعلي إلى اليسار بقوة مقدارها 53 N و38 N على الترتيب. فإذا تعادل الفريقان، فما القوة التي يشد بها سامي؟ وفي أي اتجاه؟




حدّد نظام الإحداثيات بحيث تكون القوى الموجبة هي القوة المتجهة إلى اليمين.
بما أن الحبل لا يتسارع فإن:

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{سامي}} + F_{\text{علي}} + F_{\text{محمد}} + F_{\text{خالد}} + F_{\text{عمر}}$$

الفيزياء

1. ارسم مخطط الجسم الحر لمكوك فضاء بعد مغادرته سطح الأرض مباشرة، وحدد القوى التي تؤثر في المكوك. تأكد من عدم إهمال مقاومة الهواء، وتأكد أيضًا من أنك حددت اتجاه التسارع واتجاه القوة المحصلة.



اتجاه كل من القوة المحصلة والتسارع إلى أعلى.

2. ارسم مخطط الجسم الحر لسמكة ذهبية عديمة الحركة في وسط حوض سمك. وحدد القوى التي تؤثر في السمكة، واتجاه القوة المحصلة المؤثرة فيها، واتجاه تسارعها أيضًا.



القوة المحصلة والتسارع كلاهما يساوي صفرًا.

3. ارسم مخطط الجسم الحر لكرة مغمورة في الماء في أثناء ارتفاعها إلى السطح بعد إفلاتها مباشرة. وحدد القوى التي تؤثر في الكرة، واتجاه القوة المحصلة، واتجاه التسارع أيضًا.



متجها القوة المحصلة والتسارع كلاهما إلى أعلى.

a. ارسم مخطط الجسم الحر للصاروخ بعد عملية الإنطلاق مباشرة.



b. ما القوة المحصلة التي تؤثر في نموذج الصاروخ لحظة مغادرته سطح الأرض؟

$$\begin{aligned} F_{\text{المحصلة}} &= F_{\text{الدفع}} + F_g \\ &= 12.0 \text{ N} + (0.288 \text{ kg})(-9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 9.2 \text{ N} \quad \text{إلى أعلى} \end{aligned}$$

c. ما التسارع الابتدائي للصاروخ؟

$$\begin{aligned} F_{\text{المحصلة}} &= ma \\ a &= \frac{F_{\text{المحصلة}}}{m} \\ &= \frac{12.0 \text{ N} + (0.288 \text{ kg})(-9.80 \text{ m/s}^2)}{(0.288 \text{ kg})} \\ &= 31.8 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

9. يستقل محمود مصعداً ويضغط على أحد أزراره للنزول. وعندما بدأ المصعد حركته تسارع إلى أسفل بمقدار 2.5 m/s^2 . فإذا كانت كتلة محمود والمصعد معاً تساوي 1250 kg ، فأجب عما يلي:

a. ارسم مخطط الجسم الحر للمصعد.



b. ما مقدار قوة الشد في سلك المصعد الذي ينتج قوة إلى أعلى تؤثر في غرفة المصعد؟

$$\begin{aligned} F_{\text{المحصلة}} &= F_{\text{الشد}} + F_g = ma \\ F_{\text{الشد}} &= ma - F_g \\ &= (1250 \text{ kg})(2.5 \text{ m/s}^2) - (1250 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 9100 \text{ N} \quad \text{إلى أعلى} \end{aligned}$$


$$0 \text{ N} = 45 \text{ N} + 35 \text{ N} - 53 \text{ N} - 38 \text{ N} + F_{\text{سامي}}$$

$$0 \text{ N} = -11 \text{ N} + F_{\text{سامي}}$$

$$F_{\text{سامي}} = 11 \text{ N}$$

يشد سامي إلى اليمين لأن $F_{\text{سامي}}$ موجبة

7. يتعارك كلبان على عظمة؛ فيسحب الكلب الأكبر العظمة في اتجاه اليمين بقوة مقدارها 42 N ، في حين يشدها الكلب الأصغر في اتجاه اليسار بقوة مقدارها 35 N .



a. ارسم مخطط الجسم الحر للعظمة.




b. ما القوة المحصلة المؤثرة في العظمة؟

$$F_{\text{المحصلة}} = 42 \text{ N} - 35 \text{ N} = 7 \text{ N} \quad \text{إلى اليمين}$$

c. إذا كانت كتلة العظمة تساوي 2.5 kg ، فما مقدار تسارعها؟

$$\begin{aligned} F_{\text{المحصلة}} &= ma \\ a &= \frac{F_{\text{المحصلة}}}{m} = \frac{(7 \text{ N})}{(2.5 \text{ kg})} = 3 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

8. يستطيع نموذج ضخيم لمحرك صاروخ توليد قوة دفع مقدارها 12.0 N عند لحظة الاشتعال. وبعد هذا المحرك جزءاً من صاروخ كتلته الكلية تساوي 0.288 kg لحظة انطلاقه.



الفصل 4 (تابع)

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{(الظاهري, g)}} + F_g = ma$$

$$\begin{aligned} F_{\text{(الظاهري, g)}} &= ma - F_g \\ &= (80.0 \text{ kg})(3)(-9.80 \text{ m/s}^2) \\ &\quad - (80.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= -3140 \text{ N} \end{aligned}$$

13. قام كل من عبد الله وطارق برحلة تحليق في الجو. وكانت كتلة عبد الله 88 kg، وكتلة طارق 66 kg. وعندما سقطا معاً سقوطاً حراً دفع عبد الله طارقاً أفقياً بقوة مقدارها 12.3 N.



a. ما التسارع الأفقي لعبد الله؟

$$F_{\text{عبد الله في طارق}} = F_{\text{طارق في عبد الله}}$$

$$F_{\text{عبد الله في طارق}} = m_{\text{عبد الله}} a$$

$$\begin{aligned} a_{\text{عبد الله}} &= F_{\text{طارق في عبد الله}} / m_{\text{عبد الله}} \\ &= \frac{(12.3 \text{ N})}{(66 \text{ kg})} = 0.19 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

b. ما التسارع الأفقي لطارق؟

$$F_{\text{طارق في عبد الله}} = F_{\text{عبد الله في طارق}}$$

$$= m_{\text{طارق}} a_{\text{طارق}}$$

$$\begin{aligned} a_{\text{طارق}} &= F_{\text{عبد الله في طارق}} / m_{\text{طارق}} \\ &= \frac{12.3 \text{ N}}{88 \text{ kg}} = 0.14 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

14. أطلقت رصاصة كتلتها 7.25 g من فوهة بندقية بسرعة 223 m/s. افترض أن الرصاصة تتسارع بمقدار ثابت خلال حركتها داخل ماسورة البندقية قبل أن تخرج منها بسرعة ثابتة. إذا كان طول ماسورة البندقية 0.203 m، فما متوسط القوة التي تؤثر بها الرصاصة في البندقية؟ استناداً إلى القانون الثالث لنيوتن فإن

$$F_{\text{الرصاصة في البندقية}} = F_{\text{البندقية في الرصاصة}}$$

الفيزياء

10. إذا كان وزن خالد على سطح المريخ 314.5 N، ووزنه على سطح الأرض 833.0 N، فأوجد:
a. كتلة خالد على سطح المريخ.

$$F_{g, \text{الأرض}} = mg_{\text{الأرض}}$$

$$m = \frac{F_{g, \text{الأرض}}}{g_{\text{الأرض}}} = \frac{833.0 \text{ N}}{9.80 \text{ m/s}^2} = 85.0 \text{ kg}$$

b. التسارع الناشئ عن جاذبية المريخ على سطحه؛
g_{المريخ}.

$$F_{\text{المريخ}} = mg_{\text{المريخ}}$$

$$\begin{aligned} g_{\text{المريخ}} &= \frac{F_{\text{المريخ}}}{m} \\ &= \frac{314.5 \text{ N}}{85.0 \text{ kg}} \end{aligned}$$

$$= 3.70 \text{ m/s}^2$$

11. إذا كانت كتلة علي 85.3 kg ويلعب ضمن فريق للمصارعة. وهو بارع في الفيزياء؛ لذا يدرك أن وزنه يتجاوز الوزن 830.0 N المسموح به للمشاركة في فئة وزنه. فإذا استطاع إقناع المدربين بقياس وزنه في المصعد، فكم يجب أن يكون تسارع المصعد ليعطي قياس وزن جديد لعلني يناسب فئة الوزن المسموح به للمشاركة؟

$$F_{\text{المحصلة}} = F_{\text{(الظاهري, g)}} + F_g = ma$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{F_{\text{(الظاهري, g)}} + F_g}{m} \\ &= \frac{830.0 \text{ N} + (85.3 \text{ kg})(-9.80 \text{ m/s}^2)}{(85.3 \text{ kg})} \end{aligned}$$


$$= -0.0696 \text{ m/s}^2$$

$$= 0.0696 \text{ m/s}^2 \quad \text{إلى أسفل}$$

12. يؤثر تسارع مقداره 3 g في رائد فضاء في أثناء إطلاق المركبة الفضائية؛ وهذا يعادل ثلاثة أضعاف تسارع الجاذبية الأرضية. فكم يكون الوزن الظاهري لرائد فضاء كتلته 80.0 kg يخضع لتسارع مقداره 3 g عند الإقلاع؟


افتراض أن الاتجاه إلى أعلى هو الاتجاه السالب.

ثم علق في أسفله جسمًا آخر كتلته 2.5 kg بخيط آخر. وأخيرًا، ربط خيطًا ثالث في أسفل الجسم الثاني ليشده منه بقوة متزايدة حتى ينقطع أحد هذه الخيوط. فإذا علمت أن الخيط ينقطع عندما تبلغ قوة الشد فيه 156 N، فأجب عما يلي:



a. أي خيط من الخيوط الثلاثة ينقطع أولاً؟

يمكن رسم مخطط الجسم الحر للجسم الذي كتلته 2.5 kg، m_1 ، ورسم مخطط آخر يأخذ الكتلتين معًا، $m_1 + m_2$. افترض أن F_{T1} تمثل قوة الشد في الخيط العلوي، و F_{T2} تمثل قوة الشد في الخيط الأوسط، و F_{T3} تمثل قوة الشد التي يؤثر بها معلم الفيزياء في الخيط السفلي.



$$F_{T2} - F_{T3} - F_g = 0$$

$$F_{T2} = (2.5 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) + F_{T3}$$

$$= 24.5 \text{ N} + F_{T3}$$

$$F_{\text{البنديقية في الرصاصة}} = m_{\text{الرصاص}} a_{\text{الرصاص}}$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2 a_{\text{الرصاص}} (d_f - d_i)$$

$$a_{\text{الرصاص}} = \frac{(223 \text{ m/s})^2}{(2)(0.203 \text{ m})}$$

$$= 1.22 \times 10^5 \text{ m/s}^2$$

$$F_{\text{البنديقية في الرصاصة}} = m_{\text{الرصاص}} a_{\text{الرصاص}}$$

$$= (0.00725 \text{ kg})(1.22 \times 10^5 \text{ m/s}^2)$$

$$= 888 \text{ N}$$

لذا فإن القوة التي تؤثر بها الرصاصة في البنديقية تساوي 888 N.

15. يستخدم عناصر الشرطة أداة خاصة لاقتحام أبواب المنازل. فإذا كانت كتلة تلك الأداة 15.2 kg، وأثرت بقوة متوسطة مقدارها 125 N في باب كتلته 10.0 kg، فأوجد:

a. التسارع المتوسط للباب.

استنادًا إلى القانون الثالث لنيوتن فإن

$$F_{\text{الأداة في الباب}} = F_{\text{الباب في الأداة}}$$

$$F_{\text{الباب}} = m_{\text{الباب}} a_{\text{الباب}}$$

$$a_{\text{الباب}} = F_{\text{الأداة في الباب}} / m_{\text{الباب}}$$

$$= \frac{125 \text{ N}}{10.0 \text{ kg}}$$

$$= 12.5 \text{ m/s}^2$$

b. التسارع المتوسط لأداة الاقتحام.


$$F_{\text{الباب في الأداة}} = m_{\text{الأداة}} a_{\text{الأداة}}$$

$$a_{\text{الأداة}} = F_{\text{الباب في الأداة}} / m_{\text{الأداة}} = \frac{(125 \text{ N})}{(15.2 \text{ kg})}$$

$$= 8.22 \text{ m/s}^2$$

16. في عرض عملي، علق معلم الفيزياء جسمًا كتلته 7.5 kg في سقف الغرفة بخيط مهمل الكتلة تقريبًا،

للمخطط الأيمن



$$F_{T1} - F_{T3} - F_g = 0$$

$$F_{T1} = (10.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) + F_{T3}$$

$$= 98.0 \text{ N} + F_{T3}$$

وبغض النظر عن مقدار قوة الشد التي يؤثر بها المعلم في الخيط السفلي، فإن:

$$F_{T1} > F_{T2} > F_{T3}$$

لذا فإن الخيط العلوي ينقطع أولاً.

b. ما أكبر قوة رأسية إلى أسفل يستطيع معلم الفيزياء التأثير بها قبل أن ينقطع الخيط؟

$$F_{T1} = 156 \text{ N} \quad \text{ينقطع الحبل عندما تكون}$$

$$F_{T1} = 98.0 \text{ N} + F_{T3}$$

$$F_{T3} = F_{T1} - 98.0 \text{ N} = 156 \text{ N} - 98.0 \text{ N}$$

$$= 58 \text{ N}$$

17. علّق جسم كتلته 10.0 kg في نهاية خيط، بحيث ينقطع الخيط عندما تزيد قوة الشد فيه عن $1.00 \times 10^2 \text{ N}$. عند أي تسارع إلى أعلى سينقطع الخيط عند رفع الجسم بواسطته؟

$$F_{\text{المحصلة}} = F_T + F_g = ma$$

$$a = \frac{F_T + F_g}{m}$$

$$= \frac{1.00 \times 10^2 \text{ N} + (10.0 \text{ kg})(-9.80 \text{ m/s}^2)}{10.0 \text{ kg}}$$

$$= 0.200 \text{ m/s}^2$$

18. أنزلت رافعة مجسّمًا كبيرًا كتلته 2225 kg. وفي اللحظة التي لامس فيها المجسّم الأرض تناقصت قوة الشد في حبل الرافعة، وفي هذه الأثناء شرع العمال يضبطون الموضع النهائي للمجسّم على الأرض.

a. ارسم مخطط الجسم الحر للمجسّم لحظة ملامسته الأرض مع بقاء الحبل مشدودًا، بينما يضبط العمال الموضع النهائي للمجسّم على الأرض.



b. ما القوة العمودية المؤثرة في المجسّم عندما تكون قوة الشد في الحبل 19250 N؟

$$F_{\text{المحصلة}} = F_T + F_N + F_g = 0$$

$$F_N = -F_g - F_T$$

$$= -(2225 \text{ kg})(-9.80 \text{ m/s}^2) - 19250 \text{ N}$$

$$= 2560 \text{ N}$$

$$= 2555 \text{ N} \quad \text{إلى أعلى}$$