

شكراً لتحميلك هذا الملف من موقع المناهج العمانية



شرح درس دورية الخصائص الكيميائية

[موقع المناهج](#) ← [المناهج العمانية](#) ← [الصف الحادي عشر](#) ← [كيمياء](#) ← [الفصل الثاني](#) ← [الملف](#)

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر



روابط مواد الصف الحادي عشر على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر والمادة كيمياء في الفصل الثاني

نموذج إجابة الامتحان النهائي الرسمي	1
إجابة الاختبارات النهائية الجديدة بمحافظة ظفار	2
اختبارات نهائية جديدة بمحافظة ظفار	3
نموذج إجابة الامتحان التحريبي النهائي الجديد بمحافظة ظفار	4
امتحان تحريبي نهائي نموذج جديد بمحافظة ظفار	5

تم تدوين هذا الوثائق من

موقع المناهج العمانية


دورية الخصائص الكيميائية .

alManahj.com/om

تغيرات فيزيائية



تغير في مظهر و شكل المواد ويمكن إعادتها إلى طبيعتها السابقة



إضافة الملح أو السكر إلى الماء

قص الشعر

الضغط على التربة

تغيرات كيميائية



تغير في فصائص العادة وتكون مادة جديدة ولا يمكن إعادتها إلى طبيعتها الأصلية




تغير في الرائحة



تغير في اللون



خروج غاز أو فقاعات



تغير في درجة الحرارة




خروج شرارة أو اشتعال أو انفجار

التغير الكيميائي

تتكون مواد جديدة نتيجة حدوث تفاعل كيميائي

احتراق ورقة
طهي الطعام



التغير الفيزيائي

لا ينتج عنه مواد جديدة

تقطيع ورقة
انصهار الزبدة




هذا الملف من
موقع مناهج العمانية

alManhaj.com/om


تفاعلات عناصر الدورة الثالثة مع الأكسجين

قد يقوم معلمك بإجراء بعض هذه التجارب؛ لذا راقب بعناية لتشاهد ما يحدث ودون ملاحظاتك.

١. يتفاعل الصوديوم (Na)، بشدة عند تسخينه في وعاء يحتوي على كمية محدودة من غاز الأكسجين (O₂). فيحترق منتجاً لهباً أصفر ساطعاً (الصورة ٦-٢)، ومكوناً مادة صلبة بيضاء من أكسيد الصوديوم (Na₂O) وفقاً للمعادلة الآتية:




٢. يتفاعل الماغنيسيوم (Mg)، بشدة عند تسخينه بوجود الأكسجين، ويحترق منتجاً لهباً أبيض ساطعاً، ومكوناً مادة صلبة بيضاء من أكسيد الماغنيسيوم (MgO) وفقاً للمعادلة الآتية:



٣. وقد درست في الصف العاشر (الوحدة الثانية) أن فلز الألومنيوم (Al)، يكون محمياً بطبقة من أكسيد الألومنيوم

التي تمنع تفاعله المباشر مع الأكسجين. ولكن مسحوق الألومنيوم يتفاعل بشكل جيد مع الأكسجين، ويحترق منتجاً لهباً أبيض ساطعاً، ومكوناً مادة صلبة بيضاء من أكسيد الألومنيوم (Al₂O₃) وفقاً للمعادلة الآتية:



الصورة ٦-٢ تفاعل الصوديوم بشدة مع غاز الأكسجين.


تابع

٧. لا يتفاعل كلٌّ من الكلور (Cl₂) والأرغون (Ar)، مع الأكسجين.




الصورة ٦-٣ احتراق الكبريت بلطف بوجود غاز الأكسجين.


٤. يتفاعل السيليكون (Si)، ببطء مع الأكسجين لتكوين أكسيد السيليكون (IV) (SiO₂) ثنائي أكسيد السيليكون، وفقاً للمعادلة الآتية:




٥. يتفاعل الفوسفور (P)، بشدة مع الأكسجين. وينتج من ذلك لهب أصفر وسُحب بيضاء من أكسيد الفوسفور (V) (P₄O₁₀)، وفقاً للمعادلة الآتية:



٦. بمجرد إشعال مسحوق الكبريت (S)، فإنه يحترق بلطف مع لهب أزرق عند وضعه في وعاء يحتوي على غاز الأكسجين. وينتج من ذلك أبخرة سامة من غاز ثنائي أكسيد الكبريت (SO₂)، (الصورة ٦-٣) وفقاً للمعادلة الآتية:




وإذا استمرت عملية أكسدة ثنائي أكسيد الكبريت (بوجود عامل حفاز (V₂O₅))، يتكوّن ثلاثي أكسيد الكبريت (SO₃)، وفقاً للمعادلة الآتية:




1 الصوديوم

مع الأكسجين بقوة




مع الماء البارد بقوة




قاعدة قوية PH = 12-14

مع الكلور بقوة



4 السيليكون

مع الأكسجين ببطء شديد




مع الماء البارد لا يتفاعل



سيليكون


كوريد السيليكون (IV)

مع الكلور ببطء شديد




2 الماغنيسيوم

مع الأكسجين بقوة



أكسيد الماغنيسيوم

مع الماء البارد ببطء




هيدروكسيد الماغنيسيوم

PH = 10-11

+ H₂(g)


قاعدة ضعيفة



مع الماء بالتسخين

5 الفسفور


مع الأكسجين بشدة



مع الماء البارد لا يتفاعل





مع الكلور ببطء شديد






6 الكبريت

مع الأكسجين بلطف




مع الماء البارد لا يتفاعل

مع الكلور




مع الكلور بشدة




3 الألمنيوم


مع الأكسجين متوسط



مع الماء البارد يتكون طبقة من الأكسيد تمنع التفاعل



مع الكلور بشدة



7 الكلور و الأرجون

مع الأكسجين لا يتفاعلان


11 Na SODIUM	12 Mg MAGNESIUM	13 Al ALUMINUM	14 Si SILICON	15 P PHOSPHORUS	16 S SULFUR	17 Cl CHLORINE	18 Ar ARGON
فلزات		شبه فلز		فلزات		غازات	

مع الماء البارد لا يتفاعلان



مع الكلور لا يتفاعلان

تفاعلات عناصر الدورة الثالثة مع الكلور


عند تسخين فلز الصوديوم، في وعاء يحتوي على غاز الكلور، يحدث تفاعل شديد ينتج منه كلوريد الصوديوم (NaCl)، وفقاً للمعادلة الآتية:




ويتفاعل الماغنيسيوم والألمنيوم بشدة أيضاً مع غاز الكلور، وفقاً للمعادلتين الآتيتين:



ويتفاعل السيليكون ببطء مع غاز الكلور، فينتج من ذلك كلوريد السيليكون (IV) (SiCl_4)، وفقاً للمعادلة الآتية:



كما يتفاعل الفوسفور ببطء أيضاً مع فائض من غاز الكلور، وفقاً للمعادلة الآتية:




ويكوّن الكبريت كلوريدات، مثل (SCl_2) و (S_2Cl_2)، أما غاز الأرجون فلا يتفاعل مع غاز الكلور.

١. تفاعلات الصوديوم والماغنيسيوم مع الماء


قد يقوم معلمك بإجراء بعض هذه التجارب؛ لذا راقب بعناية لتشاهد ما يحدث ودون ملاحظاتك.

١. يتفاعل الصوديوم بشدة مع الماء البارد، فينصهر ويتحول إلى كرة من الفلز المصهور (الصورة ٦-٤). ويتحرك عبر سطح الماء مطلقاً غاز الهيدروجين (H₂). وسرعان ما يقل حجم فلز الصوديوم تدريجياً حتى يختفي، مكوناً محلولاً قلوياً قوياً من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH)، (يكون رقمه الهيدروجيني pH، يساوي نحو 12 إلى 14). ويتم التفاعل وفقاً للمعادلة الآتية:



الصورة ٦-٤ تفاعل الصوديوم بشدة مع الماء.

٢. يتفاعل الماغنيسيوم ببطء شديد مع الماء البارد، ويستغرق عدة أيام لإنتاج كمية بسيطة من غاز الهيدروجين. ويكون المحلول المتكوّن قلوياً ضعيفاً (حيث إن رقمه الهيدروجيني pH يساوي نحو 10 إلى 11). وسبب ذلك أن هيدروكسيد الماغنيسيوم المتكوّن يمتلك ذوبانية منخفضة جداً في الماء، الأمر الذي يعني وجود تركيز أقل من أيونات (OH) في المحلول مقارنة بما نحصل عليه عند إضافة الصوديوم إلى الماء. وذلك لأن ذوبانية هيدروكسيد الصوديوم في الماء تكون أكبر من ذوبانية هيدروكسيد الماغنيسيوم. ويتم تفاعل الماغنيسيوم مع الماء وفقاً للمعادلة الآتية:



أمّا عند التسخين، فيتفاعل الماغنيسيوم بقوة مع بخار الماء لتكوين أكسيد الماغنيسيوم وغاز الهيدروجين وفقاً للمعادلة الآتية:




يقل النشاط الكيميائي في الدورة بزيادة العدد الذري

11 Na SODIUM	12 Mg MAGNESIUM	13 Al ALUMINUM	14 Si SILICON	15 P PHOSPHORUS	16 S SULFUR	17 Cl CHLORINE	18 Ar ARGON
فلزات		شبه فلز		لا فلزات		خامل	




العنصر	التفاعل مع الأكسجين	التفاعل مع الماء	التفاعل مع الكلور	الترتيب من حيث النشاط
Na	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	1
Mg	✓✓	✓	✓✓	2
Al	✓✓	×	✓✓	3
Si	✓	×	✓	4
P	✓	×	✓	5
S	✓	×	✓	6
Cl	×	×	×	7
Ar	×	×	×	خامل

أ. يتفاعل الليثيوم (Li) الموجود في المجموعة (I) بالطريقة نفسها التي يتفاعل بها عنصر الصوديوم، اكتب المعادلات الكيميائية الرمزية الموزونة للتفاعلين الآتيين:



ب. ١. يتفاعل فلز الكالسيوم الموجود في المجموعة 2 (II) مع الماء البارد بشدة أكثر من تفاعل المغنيسيوم، مكوّنًا محلولًا قويًا. اكتب المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة لهذا التفاعل، متضمنة رموز الحالة الفيزيائية.

٢. تفاعلت كميات متساوية من الكالسيوم والمغنيسيوم مع الماء، وقيس الرقم الهيدروجيني pH للمحلولين الناتجين. بالنسبة إلى التفاعل مع الكالسيوم، كانت قيمة pH للمحلول تساوي 13، أمّا بالنسبة إلى التفاعل مع المغنيسيوم، فكانت قيمة pH للمحلول تساوي 11. فسر سبب اختلاف الرقم الهيدروجيني بين المحلولين.



2. هيدروكسيد المغنيسيوم قليل الذوبان في الماء لذلك تركيز أيون الهيدروكسيد سيكون أقل من تركيز أيونات الهيدروكسيد الناتجة من هيدروكسيد الكالسيوم

ملخص

عند الانتقال عبر دورة ما، من اليسار إلى اليمين، في الجدول الدوري، يكون هنالك تغييرات في الخصائص الفيزيائية مثل أنصاف الأقطار الذرية، وأنصاف الأقطار الأيونية، ودرجات الانصهار، والتوصيل الكهربائي.

تقل قيم أنصاف الأقطار الذرية عبر دورة ما، من اليسار إلى اليمين، بسبب ازدياد الشحنة النووية. يقل نصف القطر الأيوني للأيونات الموجبة من الصوديوم إلى السيليكون. وبدءًا من الفوسفور، ثمة زيادة كبيرة في نصف القطر الأيوني حيث إن الأيونات تصبح سالبة ويكتمل مستوى الطاقة الثالث بالإلكترونات. ثم يعود نصف القطر الأيوني إلى التناقص بعد الفوسفور وصولاً إلى الكلور مترافقًا مع انخفاض الشحنة السالبة على الأيون.

عبر الدورة، تتغير تركيب العناصر من فلزي ضخم، مرورًا بجزيئي ضخم، وصولاً إلى جزيئي بسيط؛ أما عناصر المجموعة 18 (VIII) فتتكون من ذرات منفردة.

عبر الدورة، من اليسار إلى اليمين، تتغير أكاسيد وهيدروكسيدات عناصر الدورة الثالثة من مركبات قاعدية ذات روابط أيونية، مرورًا بروابط جزيئية ضخمة في منتصف الدورة (المجموعة 14 (IV)) مع السيليكون، وصولاً إلى جزيئات بسيطة حمضية مرتبطة تساهميًا للأكاسيد اللافلزية. ويسلك كل من أكسيد الألومنيوم وهيدروكسيد الألومنيوم (III) سلوكًا متذبذبًا (مترددًا)، حيث إنه يُظهر كلا السلوكين الحمضي والقاعدي.

عبر الدورة، من اليسار إلى اليمين، تتغير كلوريدات عناصر الدورة الثالثة من مركبات أيونية تذوب في الماء إلى مركبات تساهمية تتحلل في الماء، مطلقة أبخرة من غاز كلوريد الهيدروجين ومكوّنة محلولًا حمضيًا.

ملخص ماسبق دراسته

تفاعل الصوديوم والمغنيزيوم مع الماء

مغنيزيوم Mg		صوديوم Na		العنصر
مشاهدات التجربة	طبيعة التفاعل	مشاهدات التجربة	طبيعة التفاعل	
<ul style="list-style-type: none"> يلزمه عدة أيام لإعطاء ملء أنبوب اختبار من غاز الهيدروجين. المحلول المتكون ضعيف القلوية. لأن $Mg(OH)_2$ ضئيل الذوبان في الماء لذلك ثمة عدد أقل من أيونات $(OH^-)_{aq}$ بالمقارنة مع ما هو متشكل من NaOH الذواب في الماء. PH=11. $Mg_{(s)} + 2H_2O_{(l)} \xrightarrow{\text{بطيء}} Mg(OH)_{2(aq)} + H_{2(g)}$ 	يحدث ببطء.	<ul style="list-style-type: none"> يميع مشكلاً كرة من المعدن المنصهر. تتحرك قطعة الصوديوم على سطح الماء مطلقاً غاز الهيدروجين. يتناقص حجم كرة المعدن بسرعة حتى تتلاشى مخلقةً محلولاً قلويًا قويًا. PH=14 من NaOH. $2Na_{(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow 2NaOH_{(aq)} + H_{2(g)}$ 	عنيف	مع الماء البارد
<p>يتفاعل المغنيزيوم الساخن بعنف مع بخار الماء لإعطاء أكسيد المغنيزيوم والهيدروجين.</p> $Mg_{(s)} + H_2O_{(g)} \rightarrow MgO_{(s)} + H_{2(g)}$				

تفاعلات عناصر الدور الثالث مع الكلور

Na Mg

Al Si P S Cl Ar

العنصر	تفاعله مع الكلور	طريقة العمل	طبيعة التفاعل
الصوديوم	$2Na_{(s)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2NaCl_{(s)}$	يسخن معدن الصوديوم ثم يلقى في دورق يحوي غاز الكلور	شديد
المغنزيوم	$Mg_{(s)} + Cl_{2(g)} \rightarrow MgCl_{2(s)}$	_____	عنيف
الألمنيوم	$2Al_{(s)} + 3Cl_{2(g)} \rightarrow Al_2Cl_{6(s)}$	_____	عنيف
السيليكون	$Si_{(s)} + 2Cl_{2(g)} \rightarrow SiCl_{4(l)}$	_____	بطيء
الفوسفور	$2P_{(s)} + 5Cl_{2(g)} \rightarrow 2PCl_{5(l)}$	يتفاعل الفوسفور ببطء مع زيادة من غاز الكلور	بطيء

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية
alManahj.com/om

يشكل الكبريت كلوريدات S_2Cl_2 و S_2Cl_2 ولا يشكل الأرجون كلوريداً.

دورية الخواص الكيميائية

تفاعلات عناصر الدور الثالث مع الأوكسجين

العنصر	تفاعله مع الأوكسجين	طريقة العمل	طبيعة التفاعل	لون اللهب
Na	$4Na_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2Na_2O_{(s)}$	يسخن الصوديوم ثم يوضع في قارورة غاز مليئة بالأوكسجين.	عنيف جداً يعطي ناتج أبيض صلب	أصفر
Mg	$2Mg_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(s)}$	يسخن في الأوكسجين.	عنيف	أبيض لامع
Al	$4Al_{(s)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2Al_2O_{3(s)}$	إذا كان مسحوق يتفاعل. إذا كان معدن تقيه طبقة قاسية من أوكسيد الألمنيوم.	شديد لا يحدث	أبيض لامع
Si	$Si_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SiO_{2(s)}$	_____	بطيء	_____
P	$4P_{(s)} + 5O_{2(g)} \rightarrow P_4O_{10(s)}$	تشكل غمامة بيضاء من أوكسيد الفسفور الخماسي.	عنيف	أبيض أو أصفر
S	$S_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$	يحترق مسحوق الكبريت بلطف في وعاء مليء بالهواء أو الأوكسجين حيث تتحرر أبخرة سامة من SO_2 .	لطيف	أزرق

يعطي الإمعان بعد وقت في أكسدة ثنائي أوكسيد الكبريت ثلاثي أوكسيد الكبريت SO_3 :



(الكلور والأرغون لا يتفاعلان مع الأوكسجين).