

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية



موقع المناهج المنهاج السعودي

* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://www.almanahj.com/sa>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى السادس اضغط هنا

<https://almanahj.com/sa/15>

* للحصول على جميع أوراق المستوى السادس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا

<https://almanahj.com/sa/15math>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى السادس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني اضغط هنا

<https://www.almanahj.com/sa/15math2>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى السادس اضغط هنا



<https://www.almanahj.com/sa/grade15>

للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا



<https://t.me/sacourse>

تهيئة الفصل السادس

ارسم كلاً من الزاويتين المعطى قياسهما فيما يأتي في الوضع القياسي:



أوجد زاوية بقياس موجب، وأخرى بقياس سالب مشتركتين في ضلع الانتهاء مع كل من الزوايا الآتية، ومثلهما في الوضع القياسي:



(3)

165°, 525°, -195°





التالي



الصفحة الرئيسية

السابق



تهيئة الفصل السادس



$$350^\circ, -370^\circ \quad -10^\circ \quad (4)$$



$$\frac{10\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3} \quad \frac{4\pi}{3} \quad (5)$$



$$-\frac{\pi}{4} \quad (6)$$

$$\frac{7\pi}{4}, -\frac{9\pi}{4}$$



التالي

الصفحة الرئيسية

السابق

تهيئة الفصل السادس

حول قياس الزاوية المكتوبة بالدرجات إلى الرadian، والمكتوبة بالراديان إلى درجات في كل مما يأتي:

$$-\frac{\pi}{3} \quad -60^\circ \quad (7)$$

$$270^\circ \quad \frac{3\pi}{2} \quad (8)$$

(9) أوجد القيمة الدقيقة لـ $\sin 15^\circ$ باستعمال متطابقة الفرق بين زاويتين.

$$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$




التالي

الصفحة الرئيسية

السابق

(10) أوجد طول الצלع AC في المثلث المرسوم أدناه (قرب إلى أقرب جزء من عشرة).




3.6m

الإحداثيات القطبية

يتكون الإحداثيات الديكارتية من المحوران x , y هما المحوران الأفقي الرأسي ، وتسمي نقطة تقاطعها نقطة الأصل ، ويرمز لها بالحرف O .

يتكون الإحداثيات القطبية من النقطة O وهي نقطة الأصل وهي نقطة ثابتة وتسمي القطب والمحور القطبي وهو مستقيم يمتد أفقيا من القطب إلى اليمين .


يمكن تعين موقع نقطة P في نظام الإحداثيات القطبية باستعمال الإحداثيات (r, θ) ، حيث r المسافة المتجهة (أي تتضمن قيمة واتجاهها ، فمن الممكن أن تكون r سالبة) من القطب إلى النقطة P ، و θ الزاوية المتجهة (أي تتضمن قيمة واتجاهها) من المحور القطبي إلى \overrightarrow{OP} .




المحور القطبي إلى

مثل كل نقطة مما يأتي في المستوى القطبي.


تدريب المسائل




$$R(1, 120^\circ) \quad (1)$$



$$T(-2.5, 330^\circ) \quad (2)$$




$$F\left(-2, \frac{2\pi}{3}\right) \quad (3)$$




$$A\left(3, \frac{\pi}{6}\right) \quad (4)$$


$$D\left(-1, -\frac{5\pi}{3}\right) \quad \text{(6)}$$




$$B(5, -60^\circ) \quad \text{(5)}$$




$$C(-4, \pi) \quad (8)$$




$$G\left(3.5, -\frac{11\pi}{6}\right) \quad (7)$$



$W(-1.5, 150^\circ)$ (10)




$M(0.5, 270^\circ)$ (9)



١١) رماية: يتكون هدف في منافسة للرمادية من 10 دوائر متحدة المركز. ويترادج عدد النقاط المكتسبة من 1 إلى 10 من الحلقة الدائرية الخارجية إلى الدائرة الداخلية على الترتيب. افترض أن راميًا يستعمل هدفًا نصف قطره 120 cm ، وأنه قد أطلق ثلاثة أسلهم، فأصابت الهدف عند النقاط $(30, 240^\circ)$, $(82, 315^\circ)$, $(114, 45^\circ)$. إذا كان لجميع الحلقات الدائرية السمك نفسه، ويساوي طول نصف قطر الدائرة الداخلية. (المثلثان ١, ٢)



(a) فمثّل النقاط التي أصابها الرّامي في المستوى القطبي.



(b) ما مجموع النقاط التي حصل عليها الرّامي؟

13 نقطة.

إذا كانت $-360^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ ، فـأوجـد ثـلـاثـة أـزـواـج مـخـتـلـفـة كـلـمـنـهـا يـمـثـلـ إـحـدـاـثـيـن قـطـبـيـن لـلـنـقـطـة فـي كـلـمـا يـأـتـي: (مثال 3)

$$(-1, 330^\circ), (1, 210^\circ), (-1, -30^\circ) \quad (1, 150^\circ) \quad (12)$$

$$(2, 120^\circ), (2, -240^\circ), (-2, -60^\circ) \quad (-2, 300^\circ) \quad (13)$$

$$\left(4, \frac{5\pi}{6}\right), \left(-4, \frac{11\pi}{6}\right), \left(-4, -\frac{\pi}{6}\right) \quad \left(4, -\frac{7\pi}{6}\right) \quad (14)$$

$$\left(3, \frac{5\pi}{3}\right), \left(3, -\frac{\pi}{3}\right), \left(-3, -\frac{4\pi}{3}\right) \quad \left(-3, \frac{2\pi}{3}\right) \quad (15)$$

$$\left(5, \frac{-\pi}{6}\right), \left(-5, \frac{5\pi}{6}\right), \left(-5, -\frac{7\pi}{6}\right) \quad \left(5, \frac{11\pi}{6}\right) \quad (16)$$

$$(2, -30^\circ) \quad \mathbf{(18)}$$

$$\left(-5, -\frac{4\pi}{3}\right) \quad \mathbf{(17)}$$


$$(2, 330^\circ), (-2, 150^\circ), (-2, -210^\circ)$$

$$(5, \frac{5\pi}{3}), (5, \frac{-\pi}{3}), (-5, \frac{2\pi}{3})$$


$$(-1, -240^\circ) \quad \mathbf{(19)}$$

$$(1, 300^\circ), (1, -60^\circ), (-1, 120^\circ)$$


مَثُل كُل مُعَادِلَة مِن الْمُعَادِلَات الْقَطْبِيَّة الْأَتِيَّة بِيَانِيًّا:



$$r = 1.5 \quad (20)$$





$$\theta = 225^\circ \quad (21)$$



$$\theta = -\frac{7\pi}{6} \quad (22)$$

$$r = -3.5 \quad (23)$$






(24) القفز بالمظلات: في مسابقة لتحديد دقة موقع الهبوط، يحاول مظلي الوصول إلى «مركز الهدف المحدد»؛ ومركز الهدف عبارة عن دائرة حمراء طول قطرها 2 m. كما يشمل الهدف دائرتين طولاً نصفياً قطريهما 10 m و 20 m.

(a) اكتب 3 معادلات قطبية تمثل حدود المناطق الثلاث للهدف.

$$r = 1, r = 10, r = 20$$

(b) مَثَّلْ هذه المعادلات في المستوى القطبي.



أوجد المسافة بين كل زوج من النقاط فيما يأتي.

5. 39 $(2, 30^\circ), (5, 120^\circ)$ **(25)**

10. 70 $\left(3, \frac{\pi}{2}\right), \left(8, \frac{4\pi}{3}\right)$ **(26)**

5. 97 $(6, 45^\circ), (-3, 300^\circ)$ **(27)**

8 $\left(7, -\frac{\pi}{3}\right), \left(1, \frac{2\pi}{3}\right)$ **(28)**

1 $\left(-5, \frac{7\pi}{6}\right), \left(4, \frac{\pi}{6}\right)$ **(29)**

3. 05 $(4, -315^\circ), (1, 60^\circ)$ **(30)**

7. 21 $(-2, -30^\circ), (8, 210^\circ)$ **(31)**

$$\left(1, -\frac{\pi}{4}\right), \left(-5, \frac{7\pi}{6}\right) \quad \text{(33)}$$

≈ 4.84

$$\left(-3, \frac{11\pi}{6}\right), \left(-2, \frac{5\pi}{6}\right) \quad \text{(32)}$$

5

$$\left(8, -\frac{2\pi}{3}\right), \left(4, -\frac{3\pi}{4}\right) \quad \text{(35)}$$

≈ 4.26


$$(7, -90^\circ), (-4, -330^\circ) \quad \text{(34)}$$

≈ 6.08

≈ 5.35

$$(-5, 135^\circ), (-1, 240^\circ) \quad \text{(36)}$$


(37) مساحون: أراد مساح تحديد حدود قطعة أرض، فحدد أثراً يبعد 223 ft بزاوية 45° إلى يسار المركز ، وأثراً آخر على بعد 418 ft بزاوية 67° إلى يمين المركز، كما في الشكل أدناه، أوجد المسافة بين الأثيرين. (مثال 5)



$$\approx 542.5 \text{ ft}$$

(38) مراقبة : تراقب آلة تصوير مثبتة في منطقة جبلية تمثل جزءاً من دائرة، وتحدد بالمتباينين $0 \leq r \leq 40$ ، $-60^\circ \leq \theta \leq 150^\circ$ ، حيث r بالأمتار.

(a) مثل في المستوى القطبي المنطقة التي يمكن لآلة التصوير مراقبتها.



(b) أوجد مساحة المنطقة (مساحة القطاع الدائري تساوي:

حوالى 2932.2 m^2

$$\frac{\text{قياس زاوية القطاع بالدرجات}}{360^\circ} \times \text{مساحة الدائرة}.$$

إذا كانت $180^\circ \leq \theta \leq 0$ ، فأوجد زوجا آخر من الإحداثيات القطبية لكل نقطة مما يأتي:

$$(-5, 60^\circ)$$

$$(5, 960^\circ) \quad (39)$$

$$(-2.5, \frac{\pi}{2})$$

$$\left(-2.5, \frac{15\pi}{6}\right) \quad (40)$$

$$(4, \frac{3\pi}{4})$$

$$\left(4, \frac{33\pi}{12}\right) \quad (41)$$

$$(1.25, 160^\circ)$$

$$(1.25, -920^\circ) \quad (42)$$

$$(1, \frac{3\pi}{8})$$


$$\left(-1, -\frac{21\pi}{8}\right) \quad (43)$$

$$(6, 160^\circ)$$

$$(-6, -1460^\circ) \quad (44)$$

(45) مسرح: يلقي شاعر قصيدة في مسرح. ويمكن وصف المسرح بمستوى قطبي، بحيث يقف الشاعر في القطب باتجاه المحور القطبي. افترض أن الجمهور يجلس في المنطقة المحددة بالمتباينتين $240^\circ \leq r \leq 270^\circ$ ، $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$ ، حيث r بالأقدام.

a) مثل المنطقة التي يجلس بها الجمهور في المستوى القطبي.




ـ 8906 مقاعد تقربياً

ـ 10 ft تقربياً

(b) إذا كان كل شخص بحاجة إلى 5 ft^2 ، فكم مقعداً يتسع المسرح؟

(46) **أمن:** يضيء مصباح مراقبة مثبت على سطح أحد المنازل منطقة على شكل جزء من قطاع دائري محدود بالمتباينتين $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ، $x \leq r \leq 20$ ، حيث r بالأقدام. إذا كانت مساحة المنطقة 314.16 ft^2 ، كما هو مبين في الشكل أدناه، فأوجد قيمة x .



أوجد الإحداثي المجهول الذي يحقق الشروط المعطاة في كل مما يأتي:

$$r = 6 \text{ أو } r = -1.40 \quad P_1 = (3, 35^\circ), P_2 = (r, 75^\circ), P_1P_2 = 4.174 \quad (47)$$

$$P_1 = (5, 125^\circ), P_2 = (2, \theta), P_1P_2 = 4, 0 \leq \theta \leq 180^\circ \quad (48)$$


$$\theta \approx 75.5^\circ \text{ أو } \theta \approx 174.46^\circ$$

$$\theta \approx \frac{5\pi}{18} \quad P_1 = (3, \theta), P_2 = \left(4, \frac{7\pi}{9}\right), P_1P_2 = 5, 0 \leq \theta \leq \pi \quad (49)$$

$$r \approx 5.13 \text{ أو } r \approx 1 \quad P_1 = (r, 120^\circ), P_2 = (4, 160^\circ), P_1P_2 = 3.297 \quad (50)$$

51 **تمثيلات متعددة:** في هذه المسألة، سوف تستقصي العلاقة بين الإحداثيات القطبية والإحداثيات الديكارتية.

(a) **بيانياً:** عِين $A\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ في المستوى القطبي، وارسم نظام الإحداثيات الديكارتية فوق المستوى القطبي بحيث تنطبق نقطة الأصل على القطب ، والجزء الموجب من المحور x على المحور القطبي. وبالتالي سينطبق المحور y على المستقيم $\theta = \frac{\pi}{2}$. ارسم مثلثاً قائماً بوصل A مع نقطة الأصل، وارسم منها عموداً على المحور x .




$$x = r \cos \frac{\pi}{3} = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

$$y = r \sin \frac{\pi}{3} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

b) عددياً: احسب طولي ضلعي الزاوية القائمة باستعمال طول الوتر والمتطابقات المثلثية.

يمثل طولاً الضلعين الأفقي والرأسي القيمة المطلقة للإحداثيين x, y على الترتيب.

٤) بيانياً: عين $B\left(4, \frac{5\pi}{6}\right)$ على المستوى القطبي نفسه، وارسم مثلثاً قائماً بوصل نقطة B مع نقطة الأصل، وارسم منها عموداً على المحور x ، واحسب طولي ضلعي الزاوية القائمة.



$$x = r \cos \frac{\pi}{3} = 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

$$y = r \sin \frac{\pi}{3} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$


d) تحليلياً: كيف ترتبط أطوال أضلاع المثلث بالإحداثيات الديكارتية لكل نقطة؟

يمثل طولاً الضلعين الأفقي والرأسي القيمة المطلقة للإحداثيين x, y على الترتيب.


e) تحليلياً: اشرح العلاقة بين الإحداثيات القطبية (r, θ) والإحداثيات الديكارتية (x, y) .

إذا كانت إحداثيات النقطة القطبية (r, θ) ، فإن إحداثياتها الديكارتية هي $(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

اكتب المعادلة لكل تمثيل قطبي مما يأتي:



(53)



(52)


$$r = -2.5 \text{ أو } r = 2.5$$

$$\theta = \frac{\pi}{12}$$

الصورة القطبية و الصورة الديكارتية للمعادلات

أولا :- تحويل الإحداثيات القطبية الى إحداثيات الديكارتية ويعطى بالقاعدة الآتية :-

إذا كان للنقطة P الإحداثيات القطبية (r, θ) ، فإن الإحداثيات الديكارتية



للنقطة P هي :

$$x = r \cos \theta , \quad y = r \sin \theta$$

أي أن $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$

مثال تحويل الإحداثيات القطبية إلى إحداثيات الديكارتية

حول الإحداثيات القطبية إلى إحداثيات ديكارتية لكل نقطة مما يأتي :

$$P\left(4, \frac{\pi}{6}\right) \text{ (a)}$$

بما أن إحداثيات النقطة $r = 4, \theta = \frac{\pi}{6}$ ، فإن $(r, \theta) = \left(4, \frac{\pi}{6}\right)$

حول الإحداثيات القطبية إلى إحداثيات ديكارتية لكل نقطة مما يأتي:

$$\left(0, \frac{1}{4}\right) \quad \left(\frac{1}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \quad (2, (\sqrt{2}, \sqrt{2})) \quad \left(2, \frac{\pi}{4}\right) \quad (1$$

$$(-2.5 - 2.5\sqrt{3}) \text{ أو } (-2.5 - 4.33) \quad (5, 240^\circ) \quad (3$$

$$(-0.86, -2.35) \quad (2.5, 250^\circ) \quad (4$$

$$(-0.86, -2.35) \quad \left(-2, \frac{4\pi}{3}\right) \quad (5$$

$$(-4.45, -12.22) \quad (-13, -70^\circ) \quad (6$$

$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right) \quad \left(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \quad (7$$

$(-2\sqrt{3}, -2)$ $(4, 210^\circ)$ **(9)**

(0, 2) $(-2, 270^\circ)$ **(8)**

$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ $\left(-1, -\frac{\pi}{6}\right)$ **(10)**

أو جد زوجين مختلفين كل منهما يمثل إحداثيين قطبيين لكل نقطة معطاة بالإحداثيات الديكارتية في كل مما يأتي: (مثال 2)

$$(12.21, 0.96), (-12.21, 4.1) \quad (7, 10) \quad (11)$$

$$(13.6, 2.84), (-13.6, 5.98) \quad (-13, 4) \quad (12)$$

$$(13.42, 4.25), (-13.42, 1.11) \quad (-6, -12) \quad (13)$$

$$(12.65, 5.03), (-12.65, 1.89) \quad (4, -12) \quad (14)$$

$$(3.61, 5.30), (-3.61, 2.16) \quad (2, -3) \quad (15)$$

$$(173, \frac{3\pi}{2}), (-173, \frac{\pi}{2}) \quad (0, -173) \quad (16)$$

$$(3.16, 1.25), (-3.16, 4.39) \quad (1, 3) \quad (17)$$

$$(52, -31) \quad \text{(19)}$$

$$\approx (60.54, 0.54), \approx (-60.54, 2.61)$$

$$\approx (60.54, 31^\circ), \approx (-60.54, 150^\circ) \quad \text{أو}$$

$$(-14, 14) \quad \text{(18)}$$

$$\approx (19.8, 0.75\pi), \approx (-19.8, 1.75\pi)$$

$$\approx (19.8, 135^\circ), \approx (-19.8, 315^\circ) \quad \text{أو}$$

$$(1, -1) \quad \text{(21)}$$

$$(3, -4) \quad \text{(20)}$$

$$\approx \left(1.41, -\frac{\pi}{4}\right), \approx \left(-1.41, \frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\approx (1.41, -45^\circ), \approx (-1.41, 135^\circ) \quad \text{أو}$$

$$\approx (5, -0.93), \approx (-5, 2.21)$$


$$\approx (5, 53^\circ), \approx (-5, 127^\circ) \quad \text{أو}$$

$$(2, \sqrt{2}) \quad \text{(22)}$$

$$(2.45, 0.62), (-2.45, 3.76)$$

$$\approx (2.45, 36^\circ), \approx (-2.45, 216^\circ) \quad \text{أو}$$

(23) مسافات: إذا كانت مدرسة نواف تبعد 1.5 mi عن منزله، وتتصنّع زاوية مقدارها 53° شمال الشرق كما في الشكل أدناه، فأجب عن الفرعين a, b. (مثال 3)




(a) إذا سلك نواف طريقةً للشمال ثم للشمال؛ كي يصل إلى المدرسة، فكم ميلاً يتحرك في كل اتجاه؟

1.2mi شرقاً و 0.90mi شمالاً

(b) إذا كان الملعب على بعد 2 mi غرباً، و 0.5 mi جنوباً، و منزلي نواف يمثل القطب، فما إحداثيات موقع الملعب على الصورة القطبية؟

(2.06, 194.04°)


اكتب كلًّ معادلة مما يأتي على الصورة القطبية:




$$r = -2 \sec \theta, \quad x = -2 \quad (24)$$

$$(x + 5)^2 + y^2 = 25 \quad (25)$$

$$r = -10 \cos \theta, \quad \text{دائرة}$$



$$r = -3 \sec \theta, \quad y = -3 \quad (26)$$



$$(x - 2)^2 + y^2 = 4 \quad \text{(28)} \qquad x = 5 \quad \text{(27)}$$

$$r = 4 \cos \theta \qquad r = 5 \sec \theta$$


$$y = \sqrt{3}x \quad \text{(30)} \qquad x^2 + (y + 3)^2 = 9 \quad \text{(29)}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \qquad r = -6 \sin \theta$$

$$x^2 + (y + 1)^2 = 1 \quad \text{(31)}$$


$$r = -2 \sin \theta$$

اكتب كل معاوّلة قطبيّة مما يأتي على الصورة الديكارتية:




$$x^2 + y^2 - 3y = 0 \quad r = 3 \sin \theta \quad (32)$$

$$y = -\sqrt{3}x \quad \theta = -\frac{\pi}{3} \quad (33)$$



$$x^2 + y^2 = 100 \quad r = 10 \quad (34)$$



اكتب كل معاادة قطبية مما يأتي على الصورة الديكارتية:

$$\tan \theta = 4 \quad (36)$$

$$y = 4x$$

$$r = -4 \quad (38)$$

$$x^2 + y^2 = 16$$

$$r = 4 \cos \theta \quad (35)$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$r = 8 \csc \theta \quad (37)$$

$$y = 8$$

$$\theta = \frac{3\pi}{4} \quad (40)$$

$$y = -x$$

$$\cot \theta = -7 \quad (39)$$

$$-\frac{1}{7}x = y \text{ أو } x = -7y$$

$$r = \sec \theta \quad (41)$$

$$x = 1$$

42) زلزال: تُنمدَّج حركة أمواج الزلزال بالمعادلة $r = 12.6 \sin \theta$ حيث r مقاسه بالأميال. اكتب معادلة أمواج الزلزال على الصورة الديكارتية. (مثال 5)

$$x^2 + y^2 - 12.6y = 0$$

اكتب كل معايير قطبية مما يأتي على الصورة الديكارتية:

$$r = 10 \csc\left(\theta + \frac{7\pi}{4}\right) \quad (44)$$

$$r = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta} \quad (43)$$

$$y = x + 10\sqrt{2} \text{ أو } \frac{\sqrt{2}}{2}y - \frac{\sqrt{2}}{2}x = 10$$

$$y = 1 - x \text{ أو } x + y = 1$$

$$r = -2 \sec\left(\theta - \frac{11\pi}{6}\right) \quad (46)$$

$$r = 3 \csc\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \quad (45)$$

$$y = \sqrt{3}x + 4 \text{ أو } \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y = -2$$

$$x = -3$$

$$r = \frac{5 \cos \theta + 5 \sin \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} \quad (48)$$

$$r = 4 \sec\left(\theta - \frac{4\pi}{3}\right) \quad (47)$$

$$y = x - 5 \text{ أو } x - y = 5$$

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{8\sqrt{3}}{3} \text{ أو } -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y = 4$$

$$\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 1 \quad \text{أو} \quad x^2 + y^2 - \sqrt{3}x - y = 0 \quad r = 2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) \quad (49)$$

$$x^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad \text{أو} \quad x^2 + y^2 + 4y = 0 \quad r = 4 \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \quad (50)$$

اكتب كلًّ معاًدلة مما يأتي على الصورة القطبية:


$$r = \frac{4}{6 \cos \theta - 3 \sin \theta} \quad 6x - 3y = 4 \quad (51)$$

$$r = \frac{12}{2 \cos \theta + 5 \sin \theta} \quad 2x + 5y = 12 \quad (52)$$

$$r = 12 \cos \theta + 16 \sin \theta \quad (x-6)^2 + (y-8)^2 = 100 \quad (53)$$


$$r = -6 \cos \theta + 4 \sin \theta \quad (x+3)^2 + (y-2)^2 = 13 \quad (54)$$

(55) جولف: في أحد ملاعب الجولف، يحيط بثقب الهدف منطقة خضراء محاطة بمنطقة رملية، كما في الشكل أدناه. أوجد مساحة المنطقة الرملية على فرض أن الثقب يمثل القطب لكلا المعادلتين، وأن المسافات تُقاس بوحدة الياردة.



$$39\pi yd^2 \approx 122.52 yd^2$$

(56) عجلة دوّارة: إذا كانت إحداثيات أدنى نقطة في عجلة دوّارة $(0, 0)$ ، وأعلى نقطة فيها $(0, 20)$.



(a) فاكتب معادلة العجلة الدوّارة الموضحة بالشكل المجاور على الصورة الديكارتية.


$$x^2 + (y - 10)^2 = 100$$

(b) اكتب المعادلة في الفرع **a** بالصيغة القطبية.

$$r = 20 \sin \theta$$


٥٧ تمثيلات متعددة: في هذه المسألة سوف تكتشف العلاقة بين الأعداد المركبة والإحداثيات القطبية.

(a) **بيانياً:** يمكن تمثيل العدد المركب $a + bi$ في المستوى الديكارتي بالنقطة (a, b) . مثل العدد المركب $8 + 6i$ في المستوى الديكارتي.




b) عددياً : أوجد الإحداثيات القطبية للعدد المركب باستعمال الإحداثيات الديكارتية التي أوجدها في الفرع a . $(10, 53.13^\circ)$ أو $(10, 0.93)$

٤) بيانياً: عزّز إجابتك في الفرع b بتمثيل الإحداثيات القطبية في المستوى القطبي.




d) بيانياً: مثل بيانياً العدد المركب $3 + 3i$ في المستوى الديكارتي.



e) بيانياً: أوجد الإحداثيات القطبية للعدد المركب باستعمال الإحداثيات الديكارتية التي أوجدها في الفرع d. ومثل الإحداثيات القطبية في المستوى القطبي.

$$\left(4.24, \frac{3\pi}{4}\right) \text{ أو } (4.24, 135^\circ)$$



f) تحليلياً: أوجد العبارات الجبرية التي تبيّن كيفية كتابة العدد المركب $a + bi$ بالإحداثيات القطبية.

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} ,$$


$$\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a} ,$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a} + \pi$$

الأعداد المركبة

الصيغة القطبية للأعداد المركبة :- ويعطى بالصيغة $a + bi$ حيث هو الجزء الحقيقي ai هو الجزء التخييلي .


وهو يمثل على المستوى المركب بالنقطة (a, b) . ويكون المستوى من محورين المحور الحقيقي ويرمز له بالرمز R ، والمحور التخييلي ويرمز له بالرمز i .



القيمة المطلقة لعدد مركب

مفهوم أساسى


القيمة المطلقة للعدد المركب $z = a + bi$ هي :



$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$


تدريب وحل المسائل

مَثَل كُل عدد ممَا يَأْتِي فِي الْمَسْتَوِي الْمَرْكَب، وَأَوْجَدْ قِيمَتَه الْمَطلَقَة:




$$\approx 5.66$$

$$z = 4 + 4i \quad (1)$$



$$z = -3 + i \quad (2)$$

$$\approx 3.16$$




$$z = -4 - 6i \quad (3)$$

$$\approx 7.21$$


$$z = -7 + 5i \quad (5)$$

≈ 8.60




$$z = 2 - 5i \quad (4)$$

≈ 5.39




$$\approx 8.25 \quad z = 8 - 2i \quad (6)$$



7) متجهات: تُعطى القوة المؤثرة على جسم بالعلاقة $z = 10 + 15i$ حيث تُقاس كل مركبة للقوة بالنيوتن (N). (مثال ١)

(a) مثل z كمتجه في المستوى المركب.



(b) أوجد طول المتجه واتجاهه.

قياسه $18.03N$ ، اتجاهه محدد بالزاوية 56.31°

عُبِّر عن كل عدد مركب مما يأتي بالصورة القطبية:

$$4\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \quad 4 + 4i \quad (8)$$

$$\sqrt{5} (\cos 2.68 + i \sin 2.68) \quad -2 + i \quad (9)$$

$$3\sqrt{2} (\cos -0.034 + i \sin -0.34) \quad 4 - \sqrt{2}i \quad (10)$$

$$2\sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) \quad 2 - 2i \quad (11)$$


$$\sqrt{41} (\cos 0.09 + i \sin 0.09) \quad 4 + 5i \quad (12)$$

$$2 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) \quad -1 - \sqrt{3}i \quad (13)$$

مَثُلْ كُل عدد مركب مما يأْتِي فِي الْمَسْتَوِيِّ الْقَطْبِيِّ، ثُمَّ عَبَّرْ عَنْهُ بِالصُّورَةِ الْدِيكَارِتِيَّةِ:


$$2 + 2\sqrt{3} i$$

$$4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \quad (14)$$




$$\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) \quad (15)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$




$$-1 - \sqrt{3}i$$

$$2\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right) \quad (16)$$



$$\frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2} (\cos 360^\circ + i \sin 360^\circ) \quad (17)$$



أوجد الناتج في كلٌّ مما يأتي على الصورة القطبية، ثم عَبَرَ عنه بالصورة الديكارتية:

$$6 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \cdot 4 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \quad (18)$$

$$24 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right), -12\sqrt{2} + 12\sqrt{2}i$$

$$5(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ) \cdot 2(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ) \quad (19)$$

$$10(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ), -10$$

$$3\left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right) \div \frac{1}{2}(\cos \pi + i \sin \pi) \quad (20)$$

$$6\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right], 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}i$$

$$2(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) \cdot 2(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ) \quad (21)$$

$$4(\cos 360^\circ + i \sin 360^\circ), 4$$

$$3\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right) \div 4\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right) \quad (22)$$

$$\frac{3}{4} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right], -\frac{3}{4}i$$

$$4\left(\cos \frac{9\pi}{4} + i \sin \frac{9\pi}{4}\right) \div 2\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right) \quad (23)$$

$$2\left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}\right), -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

$$\frac{1}{2}(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) \cdot 6(\cos 150^\circ + i \sin 150^\circ) \quad (24)$$

$$3(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ), -\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i$$

$$6 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \div 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \quad (25)$$

$$3 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right), 3i$$

$$5(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ) \cdot 2(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ) \quad (26)$$

$$10(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ), 5\sqrt{2} - 5\sqrt{2}i$$

$$\frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \div 3 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \quad (27)$$

$$\frac{1}{6} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right), \frac{\sqrt{3}}{12} + \frac{1}{12}i$$

أوجد الناتج لكل مما يأتي بالصورة القطبية، ثم عبّر عنه بالصورة الديكارتية: (مثال 6)

4096 $(2 + 2\sqrt{3}i)^6$ (28)


256 $\left[4\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)\right]^4$ (29)

-0.03 - 0.07i $(2 + 3i)^{-2}$ (30)

$\left[2\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)\right]^4$ (31)

-16

(32) تصميم: يعمل سالم في وكالة للإعلانات. ويرغب في تصميم لوحة مكونة من أشكال سداسية منتظمّة كما هو مبيّن أدناه. ويستطيع تعين رؤوس أحد هذه الأشكال السداسية بتمثيل حلول المعادلة $x^6 - 1 = 0$ في المستوى المركب. أوجد رؤوس أحد هذه الأشكال السداسية. (مثال 7)



$$1, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -1,$$

$$-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

أوجد جميع الجذور المطلوبة للعدد المركب في كل مما يأتي:

(33) الجذور السداسية للعدد i

$$\approx 0.97 + 0.26i, \approx 0.26 + 0.97i, \approx -0.71 + 0.71i,$$

$$\approx -0.97 - 0.26i, \approx -0.26 - 0.97i, \approx 0.71 - 0.71i$$

(34) الجذور الرابعة للعدد $i\sqrt{3} - 4i$

$$\approx 0.22 + 1.67i, \approx -1.67 + 0.22i,$$

$$\approx -0.22 - 1.67i, \approx 1.67 - 0.22i$$

(35) الجذور التربيعية للعدد $i\sqrt{3} - 4i$

(36) كهرباء: تُعطى معاوقة أحد أجزاء دائرة كهربائية موصولة على التوالى بالعبارة $\Omega(5\cos 0.9 + j\sin 0.9)$ ، وتُعطى في الجزء الآخر من الدائرة بالعبارة $\Omega(8\cos 0.4 + j\sin 0.4)$.

(a) حَوْلَ كَلَّا من العبارتين السابقتين إلى الصورة الديكارتية.

$$3.11+3.92j, 7.37+3.12j$$


(b) اجمع الناتجين في الفرع a؛ لإيجاد المعاوقة الكلية في الدائرة.

$$(10.48+7.04j)\Omega$$

(c) حَوْلَ المعاوقة الكلية إلى الصورة القطبية.

$$\approx 12.63(\cos 0.59 + j\sin 0.59)\Omega$$


(37) كسريات: الكسريات شكل هندسي يتكون من نمط مكرر بشكل مستمر، وتكون الكسريات ذاتية التشابه؛ أي أن الأجزاء الصغيرة للشكل لها الخصائص الهندسية نفسها للشكل الأصلي، كما في الشكل أدناه.



في هذا السؤال سوف تنتج كسريات من خلال تكرار $f(z) = z^2$, حيث
 $z_0 = 0.8 + 0.5i$

، $z_1 = f(z_0)$ حيث $z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6$ احسب (a)
وهكذا. $z_2 = f(z_1)$

$$z_1 \approx 0.39 + 0.8i, z_2 \approx -0.49 + 0.62i, \\ z_3 \approx -0.14 - 0.61i, z_4 \approx -0.35 + 0.17i, \\ z_5 \approx 0.09 - 0.12i, z_6 \approx -0.0063 - 0.0216i$$



(b) مثل كل عدد في المستوى المركب.

(c) صِف النمط الناتج.

إجابة ممكنة: عند تطبيق $f(z) = z^2$ العدد المركب الناتج يقترب من نقطة الأصل وتقرب قيمته المطلقة من الصفر.

(38) أوجد العدد المركب z إذا علمت أن $(i - 1)^{-1}$ هو أحد جذوره الرباعية، ثم أوجد جذوره الرباعية الأخرى.

إجابة ممكنة: أوجد الصورة القطبية

للجذر $(-1 - i)$

فستكون $\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right)$
 ثم أوجد $\left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) \right]^4$

تحصل على العدد المركب z ، ثم أوجد جذوره الأخرى، وتكون الإجابة النهائية

: هي

$-4; 1 + i, -1 + i, -1 - i, 1 - i$

حُلّ كُلًّا من المعادلات الآتية باستعمال صيغة الجذور المختلفة:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -i \quad x^3 = i \quad (39)$$

$$2.77 + 1.15i, -1.15 + 2.77i, \quad x^4 = 81i \quad (40) \\ \approx -2.77 - 1.15i, 1.15 - 2.77i$$

$$x^3 + 1 = i \quad (41)$$


$$0.79 + 0.79i, -1.08 + 0.29i, \\ 0.29 - 1.08i$$

اختبار الفصل


الفصل
6

أوجد ثلاثة أزواج مختلفة يمثل كل منها إحداثيات قطبية للنقطة P في كل من التمثيلين 1، 2، حيث $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$.

$$\left(2.5, \frac{\pi}{3}\right), \left(2.5, -\frac{5\pi}{3}\right), \left(-2.5, \frac{4\pi}{3}\right)$$



$$\left(4, \frac{19\pi}{12}\right), \left(4, -\frac{5\pi}{12}\right), \left(-4, \frac{7\pi}{12}\right)$$




التالي

الصفحة الرئيسية



السابق

مَثَّلَ بِيَانِيًّا فِي الْمَسْطُوِيِّ الْقَطْبِيِّ كُلُّا مِنَ الْمُعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةِ:



$$r = 1 \quad (4)$$


$$\theta = \frac{5\pi}{3} \quad (6)$$



التالي

الصفحة الرئيسية

السابق



7) رادار: يقوم مراقب الحركة الجوية بتتبع مسار طائرة موقعها الحالي عند النقطة $(66, 115^\circ)$ ، حيث ٦٦ بالأميال.

(a) عِّين الإحداثيين الديكارتيين للطائرة. مقرّباً الناتج إلى أقرب ميل.

(-28, 60)

(b) إذا وُجدت طائرة عند نقطة إحداثياتها الديكارتية $(50, -75)$ ، فعِّين الإحداثيين القطبيين لها مقرّباً المسافة إلى أقرب ميل، والزاوية إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.

إجابة ممكنة : $(90, 303.7^\circ)$

(c) ما المسافة بين الطائرتين؟ قرّب الناتج إلى أقرب ميل.

156mi




التالي

الصفحة الرئيسية

السابق

٨) عُبّر عن المعادلة $(x - 7)^2 + y^2 = 49$ ، بالصورة القطبية.

$$r = 14 \cos \theta ,$$



٩) كهرباء : إذا كان فرق الجهد V في دائرة كهربائية 135V، وكانت شدة التيار المار بها I هو $(3 - 4j)$ أمبير، فأوجد معافقة الدائرة Z بالإحداثيات الديكارتية مستعملاً المعادلة $V = I \cdot Z$.

$$(16.2 + 21.6)\pi$$




التالي

الصفحة الرئيسية


السابق

١٠) اختيار من متعدد: أي مما يأتي يبين تمثيل العدد المركب الذي إحداثياته الديكارتية $(1, -\sqrt{3})$ في المستوى القطبي؟


C




A



D



B



التالي

الصفحة الرئيسية

السابق

أوجد كل قوة مما يأتي على الصورة الديكارتية، وقرب إلى أقرب عدد صحيح إذا لزم الأمر:

$$47 - 52i$$

$$(-1 + 4i)^3 \quad (11)$$

$$1081 + 840i$$

$$(6 + i)^4 \quad (12)$$



التالي

الصفحة الرئيسية

السابق